

807506

2252124

HORIZON

Medicamenta
homocopathica et isopathica
omnia,

ad id tempus a medicis aut examinata aut usu
recepta.

Auctore


Dr. **H. Hagero.**




Lesnae.


Sumptibus et typis Ernesti Güntherl.

MDCCCLXI.









Pharmacopoea
homoeopathica nova.

Pharmacopoeia

Homoeopathica Nov.

807506

2252124

HORIZON

Medicamenta
homoeopathica et isopathica
omnia,

ad id tempus a medicis aut examinata aut usu
recepta.

Auctore

Dr. **H. Hagero.**



Lesnae.

Sumptibus et typis Ernesti Güntheri.

MDCCCLXI.

Jus librum in alias linguas convertendi auctor sibi vindicat.

Xf20080^{8°}



Praefatio.

Permultos fore intelligo, qui nova hac pharmacopoea homoeopathica numerum earum, quae hodie exstant, augeri supervacaneum esse censeant. Itaque haud alienum videtur explicare, quibus auctor rationibus ad hunc librum scribendum adductus sit. Movebatur potissimum ea re, quod videbat pharmaciam homoeopathicam, qualis nunc est, ab artis legibus multum abhorrere. Auctor artis homoeopathicae Hahnemannus praeceperat, ut ternae fierent contritiones, quarum tertia ad quartam potentiam efficiendam in formam liquidam redigeretur. Haec ratio magno consilio excogitata et usu longo probata nihil habet, quod reprehendendum esse videatur. Recentiore tempore loco centuplicis, quam Hahnemannus jusserat, dilutionis, fere decuplex, tamquam legitima et ad usum therapeuticum accommodatissima, recepta est; retinuerunt autem consuetudinem trium contritionum efficiendarum et tertiae contritionis in quartam dilutionem liquidam transducendae, nihil curantes, num haec ratio legibus pharmaceuticis satisfaciat. Ipse Grunerus, quem arti homoeopathicae singularem operam navavisse constat, falsam istam viam ingressus est, id quod ejus pharmacopoea comprobatur, quam mandato societatis centralis medicorum homoeopathicorum edidit. Multae videlicet substantiae tertia contritione peracta nondum solubiles factae sunt, ita ut ad quartam liquidam dilutionem transductae simula-

tam praebeant solutionem, quum substantia medicamentaria in breve tempus suspensa teneatur. Permultae vero substantiae, ut metallicae, vix in pauca temporis momenta ista dilutione suspensae tenentur, et tum maxime, quum quinta dilutio efficitur, sedimentum demittunt, ita ut satis incertum sit, quantum substantiae illa dilutione contineatur. Homoeopathica ratio quamdiu dilutiones potentiatas quoddam ipsius artis fundamentum esse censebit, tamdiu hanc legem retinebit, ut in contritione divisio quantum fieri possit maxima, in dilutione liquida solutio ipsa effecta esse debeat. Itaque substantiae secundum naturam suam inter se distinguendae sunt. Quarum aliae post tertiam contritionem, aliae post sextam demum ita affectae erunt, ut in dilutione liquida solvantur. Neque ea solutio semper plena et perfecta est, substantia tamen in liquore ita est suspensa, ut oculo scrutanti soluta esse videatur.

Dilutio quarta, ut in dilutione decemplici fieri solet, ope aquae efficitur, tum ad quintam dilutionem instituendam adhibetur, denique, quia facile corrumpitur, abjicitur. Quoniam vero pharmacia homoeopathica requirit, ut sola ea contritio in formam liquidam transducatur, in qua substantia medicamentaria aut soluta sit, aut esse videatur, quodam quasi vehiculo opus est ad dilutionem liquidam primam, quae contritionem subsequitur, conservandam. Hujus vehiculi loco fungitur Aqua spiritiosa.

Praeceptum illud, de quo modo diximus, si non observatur, saepissime vel in quinta aut sexta dilutione substantia nondum soluta est, qua re potentiatio aut difficilis redditur, aut omnino effici non potest.

Alia causa, qua ad novam hanc pharmacopoeam homoeopathicam scribendam auctor adductus est, in ea re est posita, quod reliqui pharmacopoeorum auctores naturam singulorum medicamentorum non satis accurate explicuerunt. Exempla praebet quum pharmacopoea Gruneri, ubi de Aristolochia, de Caladio, de Carbone animali agitur, tum pharmacopoea Hartmanni, potissimum eo loco, quo Zincum sulphuricum describitur; nam pleraque, quae ibi dicta sunt, ad Zincum sulphuratum pertinent.

Accedit, quod in multis pharmacopoeis homoeopathicis inter nomina medicamentorum non satis diligenter distinctum est. Ita, ut exempla afferantur, commutata reperiuntur Manganesium et Magnesium, Stibium tartaricum et Stibiokali tartaricum. Deinde multa praecepta pharmacopoeae homoeopathicae aut vitiosa sunt aut manca, aut arti, qualis nunc est, parum accommodata. Ceterum copia medicamentorum homoeopathicorum recentiore tempore ita aucta est, ut id in hoc opere non neglegendum esse videretur.

Reliquum est, ut paucis verbis moneamus, cur medicamenta isopathica sive homopathica in hanc pharmacopoeam recepta sint. Auctor libri, tametsi non ignorabat plerosque artis doctores a medicamentis isopathicis abhorrere, neque sperandum esse fore, ut magna illorum pars unquam adhiberetur, tamen usum eorum non plane abolitum esse intelligebat, praesertim quum medicina veterinaria, quae dicitur, eum nequaquam spernat. Hujus autem libri quum ea instituta esset ratio, ut thesaurus medicamentorum quantum fieri posset uberrimus exhiberetur, omnia placuit recipi medicamenta, quorum vis et efficacia lege artis explorata esset. Hoc nimirum pharmacopoeae auctori debet esse propositum, ut non modo medicamenta usu pervulgata afferat, sed etiam omnia, quae vel unquam adhibita vel commendata sint, recipiat. Nam, ut res aliae, ita etiam remedia sua fata habent, nec raro eadem spernuntur, quae paulo ante laudata fuerint. Pleraque autem medicamenta isopathica a medico ipso colligenda esse pharmaceuta concedet.

Quoniam haec pharmacopoea non hominibus artis homoeopathicae imperitis, sed medicis et pharmaceutis scripta est, brevitatis dictionis neminem offendet. Eodem brevitatis studio factum est, ut nova vox potentiare adhiberetur, cujus vim ac potestatem nemo artis peritus ignorabit.


Auctor quum in hoc libro scribendo id potissimum spectaret, ut pharmaciae homoeopathicae suam qualemcunque operam navaret, quo majora illa ars caperet incrementa, longe se ab ea, quam animo conceptam habet, pharmacopoeae omnibus numeris

absolutae specie abesse intelligit. Sed quia in rebus arduis etiam voluisse aliqua laus est, opus suum aequis iudicibus commendari voluit.

Carolottoburgi mense Augusto MDCCCLXI.


Auctor.

Sectio prima.



Praemonenda.





§ 1. Pharmacopolium homoeopathicum vel locus, quo medicamina homoeopathica efficiuntur, asservantur et dispensantur, a pharmacopolio allopathico separatus*) sit necesse est. Locus hic sit clarus, sed a radiis solis directis, a pulvere, a fumo, ab odoribus suavioribus foetoribusque plane tutandus est. Omnia purgata, lauta ac bene tersa sint. Calor aëris in pharmacopolio homoeopathico cubiculorum nostrorum temperiem nunquam superet, itidem frigus prohibeatur. Temperies pharmacopolii, quantum potest, exaequet calorem graduum + 15 ad 20 thermometri Celsiusiani.

Utensilia et vasa.

§ 2. Pharmacopolium sit omnibus rebus utensilibusque instructum, quae opus sunt, ut pharmacopoeus iis, quae et medicina homoeopathica et ars pharmaceutica requirunt, satisfaciat.

Utensilia et vasa vel praeparandis vel conservandis medicamentis destinata, his rebus apta sint.

Vasa inscriptione perspicua, medicamenti inclusi nomen declarante, sint instructa.

Varii generis medicamenta (contritionibus dilutionibusque potentiatis medicamenti ejusdem exceptis) in eodem vase servare nefas est.

In promptu sint mortaria porcellanea, lapidea, ferrea, cochlearia cornea vel ossea, spathulae corneae, cucurbitae vitreae lageniformes, patellae vel paterae parvae vitreae, infundibula vitrea, prelum pelvi porcellanea (tincturas e vegetabilibus in pelvi stannea exprimere licet) instructum, instrumenta incisoria chalybea, trutinae diligentissime constructae et variae magnitudinis,

*) Praeparationem chemicam urgente necessitate etiam in laboratoriiis officinae allopathicae efficere licebit.

pondera,*) colatoria lintea cum signaturis, epistomia suberea optimi generis et magnitudinis variae, forceps ad epistomia premenda, capsulae e charta alba pura complicatae, batilla cornea ad pulveres etc., ad efficiendas dilutiones potentiatas vasa cylindrica ad mensurandas guttas 90, 180, 270, 360, 450 etc. Aquae et Spiritus vini, vascula et vasa vitrea dispensatoria.

Abstinentum est, quantum fieri potest, mortariis et vasis cupreis vel ex orichalco factis, nec minus vasis e vitro arsenum, plumbum, manganum etc. continente confectis. Vitrum sit siliceas calicus vel natricus.

Modus vasa purgandi.

§ 3. Omnia vasa tam recentia, quam ea, quae jam saepius adhibita sunt, optime purganda sunt. Primum aqua et Spiritu vini eluantur, tum exsiccentur calore hypocausti, ut odores forte adhaerentes plane diffugiant. Eodem modo mortaria, in quibus contritiones effectae sunt, purgentur, primum tamen aquae arenaeque ope extergantur. Mortaria, in quibus metallica vel contrita vel laevigata sunt, primum Acidis, dein aqua purgentur.

Semper observatur, ne in lagena vel vase vitreo, quod medicamentum continuerit, postea aliud medicamentum asservetur.

Operationes pharmaceuticae.

§ 4. Modus pharmaceutico-homoeopathicas operationes efficiendi etsi in multis rebus modo allopathico aequalis est, tamen nonnulla notanda et monenda sunt.

Conquassatio. Substantiae humidae, uti vegetabilia recentia et animalia viventia, saepe conquassando et contundendo in pulvem redigendae sunt. Operatio conquassandi in mortariis porcellaneis vel lapideis semper fiat, ita tamen, ut primum pistilli ope conteratur, dein tundatur. Ne succus prosiliendo et spargendo inter conquassationem perdatur, mortarium disco ligneo e ligno duro confecto et in medio perforato interdum tegere opus erit.

*) Medici homoeopathici pondus Noricum sive Norimbergicum adhibere solent et guttam liquoris alicujus Grano uni ejusdem ponderis aequalem saepius aestimant. Alia pondera, quae divisione et gravitate illi ponderi Norico satis aequiparant, adhibere licet; si vero pondera ejus modi in promptu non habentur, gutta ad pondus examinanda est.

Pulveratio vario modo efficitur. Substantiae duriores et tenaciores, antequam pulverentur, conscindantur, tunc loco tepido (25 ad 30° C.) caute siccentur, ne partes earum efficiores diffugiant. Substantiae resinosae et multae resinoso-gummosae, quae calore mollescunt, loco frigido vel hieme in pulverem redigendae sunt. Eae substantiae e genere animali et vegetabili, quae corpora medicamentosa subtilia volatilia, atque simul humorem continent (uti Moschus, Castoreum, Lactucarium, Opium), comminutae in vesicam vitulinam siccam ingerantur et vesica funiculo obligata, ut siccentur, loco sicco seponantur. Substantia, cujus quidem textura tam varia est, ut alia ejus pars facilius, alia difficilius in pulverem redigi possit, tota in pulverem redigatur et pulvis obtentus postea bene misceatur.

Pulveres vegetabilium in mortario ferreo purgato efficere licet, salia autem, metallica praeparata, corpora acidula in mortario porcellaneo vel lapideo terantur et laevigentur.

Mortaria lapidea vel porcellanea ferreis semper praefenda sunt.

Contritio exacta substantiarum siccaram in mortario porcellaneo non vitreato, contritio autem substantiae pulvereae cum substantia liquida in mortario porcellaneo vitreato plerumque efficitur.

Maceratio, calore non adhibito, temperatura media, quae calorem 20 graduum thermometri Celsiusi nunquam egreditur, efficienda est.

Divisio medicamenti aut pondere, aut volumine, aut numero efficitur.

Dilutio est diversi generis, aut mechanica aut potentiata. Dilutio mechanica est ea, quae sine judicio singulari efficitur et ad augendum volumen medicamenti alicujus tantum spectat; dilutio potentiata autem est ea, qua substantiae alicujus vis medicamentosa confirmatur et augetur. Haec dilutio requirit modum proprium medicamina potentiandi, qui dilutionem certam limitatam et diligentem substantiae medicamentosae ope vehiculi alicujus (Sacchari lactis, Aquae, Spiritus vini) comprehendit. Nunc vulgo dilutio potentiata sic dicta decimalis rata habetur, quae commiscendo substantiam medicamentosam cum novemplici quantitate vehiculi efficitur, ita ut partes decem mixtionis contineant partem unam substantiae medicamentosae.

De dilutione sic dicta centesimali, antea usitata, in nota § 11. mentio facta est.

Modus diluendi, qui contritione efficitur.

§ 5. Stadia tria contritionis distinguuntur.

a) Stadium primum contritionis. Substantiae medicamentosae siccae pars una et Sacchari lactis grosso modo pulverati partes duae in mortarium porcellaneum injiciantur et tamdiu pistillum non imprimendo terantur, interdum corradendo et pistillum ope spatulae corneae abradendo, donec pulveris subtilissimus aequabilisque, itaque mixtio perfecta sit. Hujus modi contritio minimum horam dimidiam requirit.

b) Stadium secundum contritionis. Contritione prima peracta, stadium secundum sequitur. Mixtioni contritionis primariae adisceantur Sacchari lactis subtilissime pulverati partes tres et continuetur contritio ratione supra indicata per horae quadrantem.

c) Stadium tertium contritionis. Contritione secunda peracta, Sacchari lactis subtilissime pulverati partes quatuor adjiciantur et iterum per horae quadrantem conterendo miscantur.

Modus contritionis substantiae medicamentosae fluidae est similis, ita tamen, ut stadia duo tantum distinguantur.

Stadium primum nempe intendit mixtionem substantiae partis unius cum Sacchari lactis partibus quinque, et stadium secundum admixtionem Sacchari lactis partium quatuor. Solent semper guttam unam substantiae liquidae cum Granis (pond. medic. Norici) quinque et quatuor Sacchari lactis conterere. Gutta et Granum ponderis aequalis aestimantur.

Quaevs contritio uno tenore semper efficienda est.

Contritiones potentiatae

vel

dilutiones potentiatae conterendo efficiendae.

§ 6. Contritio (potentiata) prima. Mixtio pulverea post stadia illa aut tria aut duo (confer § 5) obtenta praebet contritionem primam potentiata, quae signetur numero Arabico 1.

Haec contritio continet substantiae medicamentosae part. $\frac{1}{10} = 0,1$.

Contritio (potentiata) secunda, signanda numero 2, paratur (modo § 5 notato) conterendo miscendoque partem

unam contritionis potentiatae primae cum partibus novem Sacchari lactis subtilissime pulverati. Spatium temporis, quo mixtio efficienda est, adaequet horae tres quadrantes.

Haec contritio continet substantiae medicamentosae part. $\frac{1}{100}=0,01$.

Contritio (potentiata) tertia, signanda numero **3**, efficitur miscendo et conterendo partem unam contritionis secundae cum partibus novem Sacchari lactis subtilissime pulverati. Spatium temporis, quo mixtio efficienda est, adaequet horam dimidiam.

Haec contritio continet substantiae medicamentosae part. $\frac{1}{1000}=0,001$.

Usu frequentissimo venit, contritionem tertiam in Aquae vel Aquae spirituosae quantitate novemplici solvere, quo modo dilutio potentiata quarta, signanda **4**, obtinetur. Conferatur § 10.

Haec dilutio quarta continet substantiae medicamentosae part. $\frac{1}{10000}=0,0001$.

Contritio (potentiata) quarta (**4**), quinta (**5**), sexta (**6**), septima (**7**), octava (**8**), nona (**9**), decima (**10**), undecima (**11**), duodecima (**12**), decima tertia (**13**), decima quarta (**14**), decima quinta (**15**), decima sexta (**16**), decima septima (**17**), decima octava (**18**), decima nona (**19**), vicesima (**20**), vicesima prima (**21**), vicesima secunda (**22**), vicesima tertia (**23**), vicesima quarta (**24**), vicesima quinta (**25**), vicesima sexta (**26**), vicesima septima (**27**), vicesima octava (**28**), vicesima nona (**29**), tricesima (**30**), si poscuntur, simili ratione efficiantur. Contritio prior semper diluatur vel commisceatur quantitate novemplici Sacchari lactis subtilissime pulverati ad efficiendam contritionem subsequentem.

Nota. Omnes substantiae in Aqua parum aut minime solubiles usque ad contritionem quintam vel sextam rediguntur, quae solvendo in Aquae vel Aquae spirituosae novemplici quantitate praebent dilutiones potentiatas subsequentes. Conferatur § 11.

De modo dilutionis potentiatae, quem Hahnemannus praecipit, *nota* § 10 conferatur.

Modus dilutiones liquorum efficiendi.

§ 7. Dilutio potentiata efficitur commiscendo guttas (vel partes) decem substantiae medicamentosae liquidae in lagenula cum Spiritus vini vel Aquae guttis (vel partibus) nonaginta. Agitatione, brachii jactationibus decem effecta, fiat mixtio in lagenula epistomio clausa. Ad perfectam mixtionem efficiendam lagenula ne ultra partes tres e quatuor repleta sit.

Dilutio vehiculo talis generis semper efficiatur, ut liquorem perfecte limpidum praebeat. Dilutio quaevis turbida vel sedimentum demittens rejicienda est.

Dilutiones potentiatae.

§ 8. Dilutio (potentiata) prima, signanda numero Arabico **1**, efficitur ratione § 7. notato commiscendo guttas (partes) decem substantiae medicamentosae liquidae (uti Liquoris alicujus, Olei aetherei, Tincturae) cum guttis (partibus) nonaginta Spiritus vini rectificatissimi.

Si substantia medicamentosa est Essentia (primitiva s. fortis) ad hanc dilutionem sumatur Spiritus vini rectificatus, ne sedimentum exoriat.

Si substantia liquida est solubilis in Spiritu vini rectificatissimo, quocum solutionem plane limpidam praebet, hic ipse Spiritus etiam ad dilutionem potentiatae semper sumatur.

Si substantia liquida in Aqua solubilis, in Spiritu vini parum vel minime solubilis est, sumatur ad dilutionem primam aut Aqua aut Aqua spirituosa.

Dilutio (potentiata) secunda, signanda **2**, modo § 7. notato efficitur commiscendo guttas (partes) decem dilutionis potentiatae primae cum guttis (partibus) nonaginta Spiritus vini rectificatissimi.

Dilutio prima aquosa autem diluatur Aqua spirituosa, dilutio prima Aqua spirituosa parata diluatur Spiritu vini diluto, dilutio prima Spiritu vini diluto parata diluatur Spiritu vini rectificato ad efficiendam dilutionem secundam.

Dilutio (potentiata) tertia, signanda **3**, efficitur commiscendo guttas (partes) decem dilutionis secundae cum guttis (partibus) nonaginta Spiritus vini rectificatissimi.

Dilutio autem secunda Aqua spirituosa parata diluatur Spiritu vini diluto, eadem dilutio Spiritu vini diluto parata diluatur Spiritu vini rectificato ad efficiendam dilutionem tertiam.

Dilutio (potentiata) quarta, signanda **4**, efficitur commiscendo guttas (partes) decem dilutionis tertiae cum guttis (partibus) nonaginta Spiritus vini rectificatissimi.

Dilutio autem tertia Spiritu vini diluto parata diluatur Spiritu vini rectificato ad efficiendam dilutionem quartam.

Dilutio (potentiata) quinta (**5**), sexta (**6**), septima (**7**), octava (**8**), nona (**9**), decima (**10**), undecima (**11**), duodecima

(12), decima tertia (13), decima quarta (14), decima quinta (15), decima sexta (16), decima septima (17), decima octava (18), decima nona (19), vicesima (20), vicesima prima (21), vicesima secunda (22), vicesima tertia (23), vicesima quarta (24), vicesima quinta (25), vicesima sexta (26), vicesima septima (27), vicesima octava (28), vicesima nona (29), tricesima (30) simili ratione efficiuntur. Dilutio potentiata prior diluatur vel commisceatur novemplici quantitate Spiritus vini rectificatissimi ad efficiendam dilutionem potentiata subsequentem.

Quaevis dilutio potentiata sit plane limpida. Dilutio turbida vel sedimentum demittens semper rejiciatur.

Dilutiones solvendo efficiendae.

§ 9. Dilutio (potentiata) prima (1) salium vel substantiarum in Aqua plane solubilem, in Spiritu vini autem parum aut minime solubilem, solvendo in Aqua, sed in Spiritu vini plus minusve solubilem solvendo aut in Aqua spirituosae, aut Spiritu vini diluto, aut rectificato, aut rectificatissimo efficiatur. Pars una salis vel substantiae solvitur in partibus novem Aquae vel Spiritus vini.

Salia, quae plus quam partes decem Aquae requirunt, ut solvantur, in Aquae 20 et, si opus fuerit, in 30, 40, 50 etc. partibus solvenda sunt. Dilutiones potentiatae tunc ea ratione efficiuntur, ut dilutio potentiata 2 contineat $\frac{1}{100}$, dilutio 3 contineat $\frac{1}{1000}$, dilutio 4 contineat $\frac{1}{10000}$ salis etc.

Solutio salis, aut agitando aut macerando, semper temperatura media (15—20° C.) efficiatur, et asservatio solutionis fiat eo loco, qui calorem 15 ad 20° C. exhibet.

Dilutio (potentiata) secunda (2), si sal Spiritu vini non solvitur, Aquae spirituosae ope, et commiscendo quidem guttas (partes) decem dilutionis primae cum guttis (partibus) nonaginta Aquae spirituosae efficitur. Saepius interdum dilutionem secundam Aqua iterum efficere opus erit, si substantia salina in Aqua difficilius, in Spiritu vini minime solubilis est. Si substantia in Spiritu vini solubior est, efficiatur dilutio secunda Spiritu vini rectificato vel diluto.

Dilutio (potentiata) tertia aut Spiritu vini diluto, aut rectificato, aut rectificatissimo, pro solubilitate substantiae, efficienda est.

Dilutio **4, 5, 6, 7** etc. ad **30** Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Quaevis dilutio sit ita composita, ut substantia ab solutione se secernere non possit.

Nota. Ordo solventium, quae ad dilutiones **1, 2, 3, 4, 5** adhibenda sunt, plerumque hic est:

Dilutio	1 Aqua	Aqua	Aq. spirit.	Sp. v. dilut.	Sp. v. rect.
	2 Aqua	Aq. spirit.	Sp. v. dil.	Sp. v. rect.	Sp. v. rfss.
	3 Aq. spirit.	Sp. v. dil.	Sp. v. rect.	Sp. v. rfss.	Sp. v. rfss.
	4 Sp. v. dil.	Sp. v. rect.	Sp. v. rfss.	Sp. v. rfss.	Sp. v. rfss.
	5 Sp. v. rect.	Sp. v. rfss.	Sp. v. rfss.	Sp. v. rfss.	Sp. v. rfss.

Dilutiones potentiatae, quae contritiones potentiatas subsequuntur.

§ 10. Secundum rationem medicamina potentiandi plerumque contritio potentiata tertia (**3**) in formam liquoris solvendo in Aqua pura vel Aqua spirituosa traducitur. Solutio aquosa, quia mox corrumpitur, non asservatur, solutio ope Aquae spirituosae effecta per longius tempus asservari potest.

Modus solvendi est hic: in lagenulam ingeruntur contritionis potentiatae tertiae partes decem, tum caute affunduntur Aquae purae vel Aquae spirituosae partes nonaginta. Lagenula, epistomio vel digiti ope clausa, tamdiu tum agitur et ad macerationem seponatur, donec solutio facta sit. Haec solutio est dilutio potentiata quarta, signanda numero **4**.

Quia gutta Grano ponderis medicinalis aequalis aestimatur, Grana decem contritionis tertiae (**3**) in guttis nonaginta Aquae vel Aquae spirituosae solvere solent.

Dilutio (potentiata) quinta (**5**), prout substantia medicamentosa in Aqua vel Spiritu plus minusve solubilis est, efficitur aut Spiritu vini diluto aut, ut consuetudo fert, Spiritu vini rectificato. Partes (guttae) decem dilutionis potentiatae quartae diluuntur partibus (guttis) nonaginta vehiculi spirituosi.

Dilutio **6, 7, 8** etc. ad **30** Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur. Dilutionis prioris guttae decem semper diluantur et commisceantur cum guttis nonaginta Spiritus vini rectificatissimi ad efficiendam dilutionem subsequentem.

§ 11. Contritio potentiata, quae substantiam medicamentosam in Aqua minime solubilem, continet, de regula § 10. excipienda est. Contritio hujus generis usque ad contritionem sextam (modo § 6. notato) progreditur, quae tandem in formam

liquoris traducenda est. Dilutio septima Aqua spirituosa, octava Spiritu vini rectificato, nona et subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Substantia in Aqua parum solubilis ad contritionem potentiata quintam interdum progreditur et dein in dilutionem potentiata sextam et sequentes traducitur.

Nota. Hahnemannus, praeceptorum et institutorum medicinae homoeopathicae parens, modum alium medicamina potentiandi praecipit.

Hic modus est dilutio centuplex s. centesimalis, ita ut

Dilutio potentiata	contineat substantiae medicamentosae	signanda	Numerus signaturae secundum usum prio- rem
prima	0,01	1	1
secunda	0,0001	2	2
tertia	0,000001	3	I
quarta	0,00000001	4	¹ /I
quinta	0,0000000001	5	² /I
sexta	0,000000000001	6	II
septima	0,00000000000001	7	¹ /II
octava	0,0000000000000001	8	² /II
nona	0,000000000000000001	9	III
decima	0,00000000000000000001	10	¹ /III
undecima	0,0000000000000000000001	11	² /III
duodecima	0,000000000000000000000001	12	IV
decima tertia	0,00000000000000000000000001	13	¹ /IV
decima quarta	0,0000000000000000000000000001	14	² /IV
decima quinta	0,00000000000000000000000000000001	15	V
decima sexta	0,0000000000000000000000000000000001	16	¹ /V
decima septima	0,000000000000000000000000000000000001	17	² /V
decima octava	0,00000000000000000000000000000000000001	18	VI
decima nona	0,0000000000000000000000000000000000000001	19	¹ /VI
vicesima	etc.	20	² /VI
vicesima prima	etc.	21	VII
vicesima secunda	etc.	22	¹ /VII
vicesima tertia	etc.	23	² /VII
vicesima quarta	etc.	24	VIII
vicesima quinta	etc.	25	¹ /VIII
vicesima sexta	etc.	26	² /VIII
vicesima septima	etc.	27	IX
vicesima octava	etc.	28	¹ /IX
vicesima nona	etc.	29	² /IX
tricesima	etc.	30	X

Substantiae medicamentosae usque ad contritionem tertiam

potentiata, quae $\frac{1}{1000000}$ substantiae continet, tantum perducuntur, et haec contritio tertia solvendo in 99 vel 100plici quantitate Spiritus vini diluti ad dilutionem quartam transducitur. Dilutiones potentiatae subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Recentiore tempore plurimi medici homoeopathici modum alterum, dilutionem decemplicem s. decimalem institunt, qui normalior et regulis arithmetice magis consentaneus videtur, quem etiam in hanc pharmacopoeam recepimus.

Medico libertas non praecisa est, aut hunc aut illum modum potentiandi efficere, modus dilutionis decemplicis autem est frequentissimus. Ratio inter hos modos est haec:

modus decimalis vel novus		modus centesimalis vel Hahnemanni	
dilutio	2	aequal. est dilutioni	1
—	4	—	2
—	6	—	3
—	8	—	4
—	10	—	5
—	12	—	6
—	14	—	7
—	16	—	8
—	18	—	9
—	20	—	10
—	22	—	11
etc.		etc.	

Signatio.

§ 12. Quaevis dilutio potentiata vel contritio potentiata statim numero suo signanda est. Lagenula, in qua illa asservatur, epistomio suberino statim obturetur. Etiam epistomio numerus dilutionis vel contritionis inscribatur.

Essentiae et Tincturae.

§ 13. Essentia et Tinctura in medicina homoeopathica eandem potestatem habent, et medicus loco vocis „Essentia“ ponit vocem „Tinctura“, in arte pharmaceutica autem distinguuntur.

Essentiae e partibus animalium, plantarum recentium et e succo partium plantarum recentium ope Spiritus vini, Tincturae plerumque e substantiis medicamentosis siccis macerando

cum Spiritu vini parantur. Hae essentiae et tincturae nominantur fortes vel primitivae.

Essentiarum genera sunt duo, prout illae e plantis succosis aut e plantis succi egentibus parantur.

Modus parandi Essentias.

§ 14. Plantae vel partes earum succosae, recens collectae et bene purgatae primum conciduntur, tum in mortario lapideo ad pulvem contunduntur, dein preli ope exprimuntur. Succus expressus seponitur loco frigido. Residuum expressum iterum contusum cum ea quantitate (pondere), quae quantitati (ponderi) succi obtenti aequalis est, Spiritus vini rectificatissimi, vase clauso, loco umbroso per diem maceratur, dein iterum exprimitur. Liquor expressus spirituosus cum succo seposito statim commiscetur, in lagenam infunditur et, lagena obturata, per decem dies loco frigido seponitur, postremo filtrando colatur. Colatura a luce remota asservanda Essentia primitiva vel fortis est.

§ 15. Plantae recentes vel partes earum succi egentes incidendo contundendoque quam maxime comminuuntur et in cucurbitam vitream ingestae cum quantitate duplici Spiritus vini rectificatissimi optime commiscentur. Tum fit maceratio loco umbroso per quatuordecim dies. Dein exprimitur et liquor per aliquot dies sepositus filtratur. Maceratio calore ne adjuvetur. Colatura a luce remota asservanda Essentia primitiva vel fortis est.

Modus parandi Tincturas.

§ 16. Tincturae sunt extractiones spirituosae e substantiis plerumque siccis, praecipue ex herbis, foliis, radicibus, corticibus, seminibus siccatis. Substantiae aut contusae aut grosso modo pulveratae *pars una* in cucurbitam vitream immittitur, tum affunduntur Spiritus vini rectificatissimi (rarius rectificati) *partes decem*. Mixtae, cucurbita obturata, per dies quatuordecim loco umbroso, cujus temperatura media (15 ad 20° C.) est, seponuntur et saepius agitantur. Dein, si opus fuerit, exprimuntur et filtrantur.

Substantiae vegetabiles difficile in Spiritu vini solubiles, textus densioris vel valde duri adhibeantur subtilius pulveratae et maceratae per tres hebdomades.

Colatura a luce remota asservanda Tinctura primitiva vel fortis est.

De substantiis medicamentosis eligendis, colligendis, exsiccandis, depurandis, asservandis, renovandis.

§ 17. Omnes substantiae medicamentosae, quibus Pharmacopoeus indiget, sint sincere et optimae. Vegetabilia, quando sanandi vis in iis maxime viget, colligendae adhibendaeque sint satis evolutae, sed non nimium adultae. Plantae incultae, paucis exceptis, cultis praeferendae. Opportunitas temporis et locorum, quibus plantae laetissime crescunt, bene observetur et notetur.

Flores, folia vel herbae tempestate sicca, si effici potest, ante tempus meridianum vel sub meridiem, quum non amplius rore sparsae sunt, colligantur. Planta, cujus partes (uti flores, folia, herba) colliguntur, sit vegeta, laetissime crescens, integra. Planta, quae mutilata vel laesa est, vel marcescit, est rejicienda.

Radices succi plenae colligendae sunt integrae, nec laesae vel corrosae. Brevissima lotionem ope aquae frigidissimae et defricando ope scoparum sordibus liberentur, tum linteo detergentur et desiccentur. Deinde, nisi praeceptum medici vel pharmacopoeae obstat, reliquiae foliorum, basis caulium, fibrae fibrillaeque desecentur. Radices siccandae magnae et carnosae in frustulas vel taleolas ope resticulae annexae loco sicco eodemque tepido suspendantur.

Semina sint matura, a granis laesis vel cassis, paleis stipitibusque plane liberata.

Cortices tempore verno ante foliorum florumque evolutionem colliguntur. Ne sumantur a ramis aut nimis novellis, aut aegrotantibus vel laesis.

Siccatio vegetabilium variorum, si praescripta est, fiat semper loco sicco, aëri pervio, calore gradus 35 Celsiani thermometri nunquam excedente, seminibus oleosis exceptis, quae temperatura media siccanda sunt. Vegetabilia recens collecta purgata mox ad siccandum dispergenda sunt. Pleraque vegetabilia recentia coarcevata brevi tempore in fermentationem abeunt et corrumpuntur.

Asservanda sunt vegetabilia sicca loco sicco plerumque

in cistis ligneis, bene clausis, vegetabilia odoris acrioris vel olei aetherii plena, atque omnia narcotica in lagenis bene obturatis et a luce remotis. Semina narcotica et oleo pingui vacua eodem modo, semina autem olei pinguis plena in ollis ligneis obturatis asservanda sunt.

Omnia vegetabilia, quae in lagenas ingeruntur, ut asserventur, sint talis siccitatis, qualis calore supra notato efficitur. Vegetabilia sicca, quae humorem ex aëre hauserunt, in vasis vitreis clausis asservata mucescunt.

Tempus, usque ad quod vegetabilia asservare liceat, non praestitutum est. Quamdiu illa vim plenam medicamentosam retinent, tamdiu asserventur et adhibeantur. Vegetabilia indigena, quae quotannis recentia comparari possunt, aut quae inter asservationem naturam ipsam mutant, praesertim nimium exsiccantur, singulis annis recolligantur; substantias medicamentosas, e duris tantummodo massis constantes et efficaces, diutius licet asservari, nisi alio quodam modo deperdantur.

Asservatio aliarum substantiarum, uti salium, metallorum, resinarum, extractorum siccorum, liquorum, praecipue substantiarum pulveratarum, fiat in lagenis aut vasis vitreis et porcellaneis bene obturatis, a luce remotis. Obturentur plerumque ope epistomiorum suberinorum. Lagenae fluidis corrosivis, Jodo etc. repletae epistomiis vitreis claudantur.

Asservatio medicamenti, ratione homoeopathica praeparati, cum suis contritionibus dilutionibusque potentiatis, quarum quaeque in lagenula continetur et suo numero distinguitur, fiat in scatulis vel cistulis clausis, e ligno vel lamina ferrea vel zinca confectis, quae vernice et lacca obductae sunt.

Dilutiones potentiatae, quae sunt solutiones aquosae, ultra horas triginta sex asservari non possunt.

De modo medicamenta dispensandi.

§ 18. Modus dispensandi homoeopathicus a modo dispensandi pharmaceutico allopathico non discrepat. Quod medicus praecipit, id semper accuratissime efficiatur.

De aspergendo Saccharum granulatum vel globulos Sacchari hoc notandum est. Globuli Sacchari in patellulam vitream (vitrum horologii portabilis) vel porcellaneam ingesti dilutione potentiata, Spiritum vini rectificatissimum continente,

superinfundantur. Exacta parte sexagesima horae fluidum defundatur. Globuli tum in charta purissima expandendo et seponendo per horae quadrantem vel horam dimidiam siccentur. Globuli forte cohaerentes disjungendi sunt. Globuli adpersi, quos asservare vis, seponendo per horam unam ad duas siccentur.

Dispensatio globulorum horum inspersionum in Saccharo lactis pulverato saepe praecipitur. Tum numerus globulorum integrorum Saccharo lactis pulverato addatur, neu conterendo admisceatur.

Contritiones potentiatae et mixtiones pulvereae in lagenulis vel ollulis, quas homoeopathicas nominant, plerumque dispensantur, rarius in capsulis e charta alba complicando effectis.

Saccharum lactis in contritionibus potentiatis est substantia, cujus ope modus dilutione potentiandi efficitur. Saccharum lactis autem, quod cum dilutione jam potentiata praecepta ad usum aegroti commiscendum est, tantum volumen portionis (dosis) auget. In hac re mixtio per spatium temporis brevissimum et pistillum minore impressione gerendo finiatur.

Formae compendiariae,

quas medici in praeceptis (receptis) adhibere solent.

§ 19. *M.* significat *misce* vel *misceatur*.

M. ex. " *misce exacte*.

Gtt. " *gutta*.

Gtt.β " *gutta dimidia*.

Gtt.p. " *gutta parva*, quae exaequat quadrantem guttae (guttae $\frac{1}{4}$).

Gtt.m. " *gutta minima*, quae exaequat partem centesimam guttae unius.

Gr. " *granum*, partem sexagesimam drachmae pond. medicinalis.

Gr.β " *granum dimidium*.

Gr.m " *granum minus*, quod exaequat vel magnitudinem vel volumen lentis dimidia.

θ " *scrupulum* pond. medicinalis.

δ " *drachmam* pond. medicinalis.

ζ " *unciam* pond. medicinalis.

Explicatio praeceptorum nonnullorum.

§ 20. **Rp.** *Belladonnae* 30,
Sacchari globulorum No. IV,
Sacchari lactis Gr. jii.

M. D. S. etc.

Globuli Sacchari quatuor in patellam vitream ingesti guttis nonnullis dilutionis potentiatae tricesimae Belladonnae (Essentiae) superfunduntur, tum, spatio partis sexagesimae horae exacto, fluidum non suctum a globulis defunditur. Globuli seponendo (calore non adhibito) siccati Sacchari lactis pulverati granis tribus ope spatulae minoris insperguntur et in capsulam chartaceam vel ollulam vitream immissi dispensantur.

Rp. *Tinct. Veratri albi* 8 Gtt.ß,
Sacchari lactis Gr. V.

M. ex. D. S. etc.

Sacchari lactis pulverati granis decem in mortarium ingestis instillatur gutta una dilutionis potentiatae octavae Veratri albi (Tincturae). Mixtione circiter spatio partis tricesimae horae conterendo peracta, miscela in partes duas dividitur, quarum altera dispensatur, altera autem rejicitur.

Rp. *Aconiti* 6, Gtt. $\frac{1}{10}$,
Globul. saccharin. No. 10.

M. D.

Ad metiendam partem decimam guttae Globuli Sacchari centum gutta una dilutionis sextae potentiatae Aconiti (Essentiae Aconiti) humectantur, quibus tum decem ad dispensationem demuntur, globuli autem nonaginta reliqui rejiciuntur.

Rp. *Pulsatilla* 10. 3j.

D.

Drachma una dilutionis potentiatae decimae Essentiae Pulsatillae in lagenulam infusa dispensatur.

Rp. *Belladonnae* X, *Globul. Vjjj,*
Aquae destillatae Unc. jj.

S.

Globuli Sacchari octo in patellam vitream ingesti dilutionis potentiatae tricesimae modo Hahnemanni effectae (confer

§ 11 *Notam*) guttis nonnullis superfunduntur, tum, spatio partibus sexagesimae horae exacto, dilutionis pars non sucta a globulis defunditur, et globuli agitando in Aqua destillata frigida solvuntur.

Rp. Platinae X, 3j.

D.

Dilutionis potentiatae tricesimae, modo Hahnemanni effectae, Drachma una ad lagenam datur. (Confer. § 11. *Notam*).

De ponderibus.

§ 21. Pondus medicinale Norimbergense s. Noricum, in pharmacopoliis homoeopathicis usitatissimum, dividitur in Libram, Uncias, Drachmas, Scrupulos, Grana.

Libra continet Uncias duodecim,

Uncia „ Drachmas octo,

Drachma „ Scrupulos tres,

Scrupulus „ Grana viginti.

Pondus Librae paulum variat. Aequat 357,6639, modo aequat 357,5668 vel 357,8436 vel 357,854 Grammata ponderis Gallici normae systematis decimalis.

Hoc pondus Gallicum ad Gramma conformatum est. Myriagramma continet 10000 Grammata; Kilogramma cont. 1000 Grammata; Hectogramma cont. 100 Grammata; Decagramma cont. 10 Grammata; Gramma cont. 10 Decigrammata; Decigramma cont. 10 Centigrammata; Centigramma cont. 10 Milligrammata.

Ratio

variorum ponderum medicinalium ad pondus Grammatum.

Pondus medicinale	Libra	Uncia	Drachma	Scrupu- lus	Granum	Gramma aequat Grana
	aequat Grammata					
Americae septentrionalis, Angliae et Scotiae	373,2460 372,9986 372,96 420,0090	31,1038 31,0832 31,08 35,0007	3,8880 3,8854 3,88 4,3751	1,2960 1,2951 1,29 1,4583	0,0648 0,0647 0,064 0,0729	15,432 15,432 13,714
Austriae Bavariae, Bremae, Bruns- vigae, Bueckeburgi, Ham- burgi, Hannoverae, Lip- piae, Lubecae, Oldenburgi.	360,0000	30,0000	3,7500	1,2500	0,0625	16,000
Belgii (pond. pristinum), et Neerlandiae	375,0000	31,2500	3,9062	1,3020	0,0651	15,360

Pondus medicinale	Libra	Uncia	Drachma	Scrupu- lus	Granum	Gramma aequat Grana
	aequat Grammata					
Badensis ducatus	357,7800	29,8150	3,7269	1,2423	0,0621	16,099
Bernae	356,5780	29,7148	3,7144	1,2381	0,0619	16,223
Borussiae, Saxoniae, Asca- niae, Schwarzburgi, Go- thae, Vinariae, Meinun- gae, Waldeccae, Nassov- iae, Megalopolis (Mec- lenburgi), Birkenfeldae. Lex expectatur, qua hoc pondus aboletur.)	350,7835	29,2320	3,6540	1,2180	0,0609	16,420
Daniae, Slesvico-Holsatiae, Finniae, Hassiae.)	357,6639	29,8053	3,7257	1,2419	0,0621	16,104
Norvegiae	357,8452	29,8204	3,7275	1,2425	0,0621	16,103
Poloniae	358,5106	29,8759	3,7345	1,2448	0,0622	16,000
Russiae	358,3270	29,8606	3,7326	1,2442	0,0622	16,103
Sardiniae (pond. pristinum)	331,9610	27,6634	3,4579	1,1526	0,0480	20,815
Sueciae (pond. pristinum)	356,2470	29,6872	3,7109	1,2369	0,0618	16,168
Wurtembergae	357,6337	29,8028	3,7252	1,2417	0,0621	16,100

Libra ponderis medicinalis harum terrarum habet 5760 Grana. Quaevis Libra dividitur in Uncias 12; Uncia in Drachmas 8; Drachma in Scupulos 3; Scrupulus in Grana 20. Continentur igitur 480 Grana in Uncia, 60 Grana in Drachma, 20 Grana in Scrupulo.

Britanni liquores plerumque mensurare solent. Mensura maxima pharmaceutica est Congius (Gallon), qui continet 8 Octarios et aequat volumen circiter 3790 Grammatum aquae. Quivis Octarius (Pint) dividitur in 20 Fluiduncias, Fluiduncia in 8 Fluidrachmas, Fluidrachma in 60 Minima (vel Grana), Minimum aequat volumen guttae.

Ratio

aliorum variorum ponderum medicinalium ad pondus Grammatis.

Pondus medicinale	Libra	Uncia	Drachma	Scrupu- lus	Granum	Gramma aequat Grana
	aequat Grammata					
Florentiae (Hetruriae)	339,520	28,293	3,536	1,179	0,049	20,3
Mediolani	326,760	27,233	3,404	1,134	0,047	21,15
Mutinae (Modenae)	340,456	28,371	3,546	1,182	0,049	20,3
Parmae	327,960	27,333	3,416	1,139	0,047	21,07
Romae	339,191	28,255	3,532	1,177	0,049	20,37
Venetiarum	301,224	25,102	3,138	1,046	0,043	22,21

Libra ponderis medicinalis harum regionum habet 6912 Grana. Quaevis Libra dividitur in Uncias 12; Uncia in Drachmas 8; Drachma in Scrupulos 3; Scrupulus in Grana 24. Continentur igitur 576 Grana in Uncia, 72 Grana in Drachma, 24 Grana in Scrupulo.

Libra ponderis medicinalis regni Neapolitani habet 7200 Grana (=320,760 Grammata). Quaevis Libra dividitur in Uncias 12; Uncia in Drachmas 10; Drachma in Scrupulos 3; Scrupulus in Obolos 2, Obolus in Acina (Grana) 10. Continentur igitur 600 Acina in Uncia, 60 Acina in Drachma, 20 Acina in Scrupulo, 10 Acina in Obolo.

Libra ponderis medicinalis pristini Galliae habebat 9216 Grana (=489,5058 Grammata), et dividebatur in Uncias 16, Uncia in Drachmas 8, Drachma in Scrupulos 3, Scrupulus in Grana 24. Continebantur igitur 576 Grana in Uncia, 72 Grana in Drachma.

Libra ponderis medicinalis Hispaniae habet Grana 4608 (=229,88 Grammata) et dividitur in Uncias 8, Uncia in Drachmas 8, Drachma in Scrupulos 3, Scrupulus in Obolos 2, Obolus in Characteres 3, Character in Grana 4. Continentur igitur 576 Grana in Uncia, 72 Grana in Drachma, 24 Grana in Scrupulo, 12 Grana in Obolo.

Libra ponderis medicinalis novi (et communis) Sueciae dividitur in Orta 100 et Ortum in Grana 100. Continentur 10000 Grana (=425,0369 Grammata) in Libra.

Relatio Guttarum ad pondus.

Ubi vel per exiguitatem vel per evanescentiam liquoris dispensandi pondus trutina examinare non licet, mensurare potes. Censeas liquorum aethereorum, aqua leviorum, Guttas tres, Tincturarum Guttas duas, Essentiarum Sesquiguttam, liquorum aqua graviorum Guttam unam aequalem Grano

ponderis medicinalis Norici. Guttae septem liquoris aquosi
aequant Grana quinque ponderis ejusdem. Hydrargyrum
semper trutina examinandum est. Liquorum, qui potentiantur,
Gutta semper Grano illius ponderis Norici aequalis aestimatur.

Pondera specifica


liquorum, in hac pharmacopoea proposita, calore graduum +17,5
thermometri Celsiusi vel graduum +14 thermometri Reaumu-
riani determinata sunt.

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..


Fundus speciosus

... ..
... ..
... ..

Sectio secunda.



Pharmaca simplicia et praeparata, atque
ea corpora, quae vehiculorum vice
funguntur.



Section second.

Pharmacies, hospitals, and
in hospitals, and in hospitals,
in hospitals.

Absinthium.

Wermuth. Wormwood. Absinthe.

Artemisia Absinthium L. vel *Absinthium* vulgare Gaertn., planta perennis e familia Compositarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis utrinque sericio-incanis, pinnatifidis, laciniis obtusis; capitulis subglobosis nutantibus.

Herba florens recens, caulibus crassioribus et radice resectis. Colligitur mensibus Julio et Augusto.

Essentia Absinthii paretur modo § 15. notato.

Acidum arsenicosum.

Arsenicum. Arsenicum album. Geffium. Arjenif. *Arsenic.* *Arsenious acid.*
Acide arsenieux.

Massa in frustis duris, vitriformis nitida vel porcellanea nivea, primum plus minusve pellucida, posterius opaca, contundendo dissiliens, fracturae conchoideae politae, in Aquae partibus 120, in Spiritu vini vix solubilis, constans ex Arsenio et Oxygenio ($=AsO^3$). Acidum arsenicosum pulveratum empticum nunquam adhibeatur.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 10. notatis efficiuntur.

Nota. **Tinctura Geffii** est nomen dilutionum potentiatarum Acidi arsenicosi.

Acidum benzoicum.

Flores Benzoës. Benzoësflore. *Benzoic acid.* *Acide benzoïque;*
Fleurs de Benjoin.

Crystallula alba subpellucida, splendoris sericei, acicularia vel floccosa, tenerrima, odoris suavis benzoini, saporis dulciusculi, demum aciduli acris pungentis, calefacta primum liquescentia, tum vaporibus pulmones irritantibus volatilia et in igne residuum carbonaceum non relinquuntia, solubilia in Aquae partibus ducentis nec non in partibus tribus Spiritus vini rectificatissimi. Sit praeparatum e Benzoë sublimando effectum.

Dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Acidum hydrochloricum.

Acidum muriaticum. Salzfäure. Chlorwasserstoffsäure. *Hydrochloric acid; Muriatic acid. Acide hydrochlorique; Acide muriatique.*

Liquor limpidus, calefactus volatilis, coloris expers, odoris pungentis acidi, saporis caustici peracidi, e part. 75 circiter Aquae et part. 25 Acidi hydrochlorici constans ($=\text{HCl} + 12,16\text{HO}$). Pond. specif. 1,120—1,122. Serva in lagenis epistomio vitreo obturatis.

Dilutio prima Spiritu vini diluto, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Acidum hydrocyanicum.

Acidum cyanhydricum; Acidum borussicum; Acidum zooticum. Cyanwasserstoffsäure; Blausäure. *Hydrocyanic acid; Prussic acid. Acide hydrocyanique; Acide prussique.*

Liquor limpidus, calore balnei aquae perfecte volatilis, coloris expers, odoris spirituosus, Amygdalas amaras valde redolens. Constet e part. 98 Spiritus vini rectificatissimi et part. duabus Acidi hydrocyanici (HCy) anhydri. Caute servetur in lagenulis plane repletis et charta nigra velatis.

Dilutiones potentiatæ Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur, non autem per longius tempus asservari licet.

Acidum hydrocyanicum.

Rp. *Ferro-Kalii cyanati flavi crystallisati* P. quinque (5),
Spiritus vini rectificatissimi P. triginta sex (36),
Aquae destillatae P. viginti (20),
Acidi sulphurici concentrati puri P. quinque (5).

Ferro-Kalium cyanatum contusum immitte in retortam tubulatam vitream amplitudinis quadruplicis substantiarum volumine et collo breviori instructam. Tum infunde Acidum sulphuricum Aqua destillata commixtum et Spiritum vini. Tubulo retortae, suberis perforati ope, tubum vitreum securitatis ita insere, ut apertura ejus inferior usque ad fundum retortae porrecta sit; collo retortae vero, qui parum elevatum sit, ut guttae forsan transilientes in retortam refluant, suberis perforati ope tubum alterum incurvum ita applica, ut pars superior paulum in collum retortae immineat, inferior autem in excipulum (lagenam) vitreum appositum porrigatur. Apertura excipuli vesica acu leviter perforata, ut aëri atmosphaerico exitus pateat,

juncturisque bene clausis, fiat destillatio ex balneo arenae excipulum bene refrigerando, donec circiter partes quadraginta (40) transierint.

Liquor destillatus tanta quantitate Spiritus vini rectificatissimi diluatur, ut partes ejus centum contineant partes duas Acidi hydrocyanici anhydri. Hoc sequenti modo investigatur. Liquoris partibus centum, Aqua destillata dilutis, Argentum nitricum aqua solutum tamdiu instillatur, quamdiu inde praecipitatum efficitur. Praecipitatum filtri ope separatum calore balnei aquae bene exsicceatur. Partes decem praecipitati sicci partibus duabus Acidi hydrocyanici anhydri respondent.

Acidum hydrofluoricum.

Acidum fluorium. *Fluorwasserstoffsäure; Flußsäure. Hydrofluoric acid; Fluoric acid. Acide hydrofluorique.*

Liquor limpidus, coloris expers, peracidus, e part. 75 Aquae et part. 25 Acidi hydrofluorici anhydri constans ($=\text{HFl} + 6,67\text{HO}$). Partes 100 liquoris saturare possis partibus 125 Kali bicarbonici crystallisati. In cylindris e Gutta Percha confectis, epistomiis similibus bene obturandis, asservatur.

Dilutio prima Aqua, dilutio secunda Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur. Dilutio, quae turbida forsan evaserit, filtretur.

Acidum hydrofluoricum.

Rp. *Fluoris spathosi optimi (Calcii fluorati nativi)*

P. quatuordecim (14).

Pulveratis et in ollam plumbeam immissis admisce

Acidi sulphurici concentrati P. viginti sex (26).

Alembico plumbeo ollae adaptato et juncturis luto (e farina secalina, placenta seminis Lini pulverata et aqua parato) clausis, excipulum plumbeum,

Aquae destillatae P. duodeviginti (18)

continens ita adjuuge, ut colli orificium alembici in Aquam paululum immersum sit. Tum evolutio gasis hydrofluorici leni calore et paulatim fiat, excipulum bene refrigerando. Excipulum leviter lamina plumbea obtectum per diem loco frigido seponatur, dein liquor filtretur. Tum recipe liquoris P. tres (3), quas Kali carbonico puro exacte saturatas liquori residuo iterum admisce. Sepone per diem dimidium. Sedimentum exor-

tum (Kalium silicio-fluoratum) filtrando separa et liquorem in cylindris supra notatis bene asserva.

Olla, alembicus et excipulum sint e plumbo purissimo (melius e platino) confecta. Infundibula, quibus ad filtrationes liquoris acidi utuntur, sint lacca mastichina obducta. Olla destillatoria et excipulum tantum ad partes duas (e tribus) capacitatis replenda sunt. Orificium colli alembici sit satis amplum. Cave, ne gas hydrofluoricum haurias. Est valde perniciosum.

Acidum molybdaenicum.

Molybdänsäure. *Molybdic acid. Acide molybdique.*

Pulvis albus levior, saporis nauseosi acidi, in Aquae circiter partibus 600, in Spiritu vini rectificatissimo vix solubilis.

Contritones et dilutiones modis § 6. et 10. notatis efficiuntur.

Acidum nitricum.

Acidum Nitri s. azoticum; Aqua fortis. Salpetersäure. Scheidewasser. *Nitric acid; Acid of salpeter. Acide azotique.*

Liquor limpidus, coloris expers, odoris acidi ingrati, peracidus, calefactus plane volatilis, e part. 72 Aquae et part. 28 Acidi nitrici anhydri constans ($=\text{NO}^5 + 15,5 \text{HO}$). Pond. specif. 1,200—1,201.

Dilutio prima Aqua, secunda Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Acidum oxalicum.

Äpfelsäure. *Oxalic acid. Acid oxalique.*

Crystalla prismatica alba, parum pellucida, odoris nullius, saporis peracidi, in Aquae part. 11, in Spiritu vini rectificatissimi part. 26 solubilia, ex Acido oxalico et Aqua constantis ($=\text{Ox}, \text{HO} + 2\text{HO}$). Crystallisatione iterata ex Acido oxalico venali parantur.

Dilutio prima solvendo partem unam (1) Acidi oxalici in Aquae partibus 19 efficiatur. Solutionis hujus modi partes 20 diluuntur Spiritu vini rectificatissimi partibus 80 ad efficiendam dilutionem secundam. Dilutiones subsequentes eodem Spiritu vini parantur.

Acidum phosphoricum.

Phosphorsäure. *Phosphoric acid. Acide phosphorique.*

Liquor coloris et odoris expers, limpidus, saporis grati acidi,

e part. Aquae 84 et part. 16 Acidi phosphorici anhydri constans ($=\text{PO}_5 + 41,7 \text{ HO}$). Pond. spec. 1,130. Oxydatione Phosphori puri ope Acidi nitrici paratur.

Dilutio prima Spiritu Vini rectificato, dilutiones sequentes rectificatissimo efficiuntur. Hoc Acidum plerumque Acidum silicium solutum continet, quam ob rem dilutiones paulum turbidae evadunt. Dilutio turbida filtretur.

Acidum sulphuricum.

Schwefelsäure. Acidum s. Oleum Vitrioli. *Sulphuric acid.* *Acide sulphurique.*

Liquor coloris et odoris expers, consistentiae olei fluidi, corrosivus, peracidus, perfecte volatilis, e part. 81 ad 82 Acidi sulphurici anhydri et partibus 18 ad 19 Aquae constans ($=\text{SO} + \text{HO}$). Pond. specif. 1,840–1,842. Ex Acido sulphurico venali destillando paratur. Servetur in lagenis, epistomiis vitreis obturatis.

Dilutio prima Aqua, dilutio secunda Spiritu vini rectificato dilutiones subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Acidum tartaricum.

Weinsteinssäure. *Tartaric acid.* *Acide tartrique.*

Crystalla coloris expertia, pellucida, prismatica vel tabuliformia, saporis peracidi, in aëre non humescentia, in Aquae pondere duplo, in Spiritu vini facile solubilia.

Dilutio prima solvendo partem unam Acidi in partibus novem Spiritus vini diluti efficitur. Ad dilutiones sequentes Spiritus vini rectificatissimus sumitur.

Aconitum.

Herba Aconiti. *Eijenhut.* *Sturmhut.* *Monkshood.* *Aconit.*

Aconitum Neomontanum Willd., Aconitum Stoerkeanum Reichenbachii, Aconitum Cammarum Haynei, Aconitum Napellus L., plantae perennes Europae e familia Ranunculacearum. Praeferantur plantae floribus violaceis vel coerulescentibus et herba colore viridi vigente.

Planta tota florens, recens, a speciebus illis praesertim montanis, in pratis editioribus et collibus crescentibus collecta, caulibus crassioribus resectis. Planta in pratis uliginosis crescens rejicienda est.

Essentia Aconiti paretur modo § 14. notato.

Actaea s. Christophoriana.

Actaea spicata. Christophsfrant. *Christophoriane. Herbe Saint-Christophe.*

Actae spicata Linn., planta in locis nemorosis montosis Europae frequens, e familia Ranunculacearum. Haec species ne permutetur Actaea spicata Mich. s. Actaea brachypetala D. C. Actaea spicata L. differt ab aliis plantis similibus: racemo ovato; calice quadriphylo caduco; petalis quatuor; bacca subglobosa molli nigra nitente; radice e nigro fusca subspongiosa, ligno flavo, undique radiculis fibrillisque ramosis nitidis tenacioribus, intus lignosis, obsita.

Radix ante florescentiam collecta (mense Majo).

Essentia Actaeae paretur modo in § 15. notato.

Nota. Baccae (fructus) maturae nigrae (ad finem mensis Augusti) collectae praebent modo § 14. notato Essentiam Actaeae baccarum.

Actaea racemosa.

Traubenartiges Christophsfrant.

Actaea racemosa s. Cimicifuga racemosa L., planta perennis Americae borealis, e familia Ranunculacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis racemis longissimis; foliis ternato-pinnatis, segmentis oblongo-lanceolatis inciso-serratis; floribus monogynis foetidis albis et capsula ovata sicca (carpello).

Planta tota florescens, caulibus crassioribus rejectis.

Essentia Actaeae racemosae paretur modo § 15. notato.

Aether.

Aether sulphuricus. Aether. *Aether. Ether.*

Liquor neuter limpidissimus, volatilis, coloris expers, valde inflammabilis, odoris proprii flagrantis pond. spec. 0,725, in Aquae partibus decem solubilis. Cum Spiritu vini rectificatissimo omnibus in proportionibus commisceri potest. Ad usum pharmaceuticum in vitris optime obturatis inclusus in promptu habetur.

Aethusa.

Cynapium. Hundspeterfilie; Gartengleise. *Fools Pfarsley; Lesser Hemlock. Petite Cigue.*

Aethusa Cynapium L. (Coriandrum Cynapium Roth.) planta annua Europae, e familia Umbelliferarum. Differt ab aliis plantis similibus glabritie; involucellis (dimidiatis,

reflexis) longioribus quam umbellulae; calice obsoleto; foliis supradecompositis, utrinque lucidis, laciniis lanceolatis breviter acutatis.

Planta tota florens (aestate collecta).

Essentia Aethusae s. Cynapii paretur modo § 14. notato.

Agaricus.

Amanita. Fliegenſchwamm. Toatstoot. Champignon de mouches; Amanite fausse orange.

Agaricus muscarius L. s. Amanita muscaria Persoon, fungus in pinetis habitans, e familia Hymenomycetum. Differt ab aliis speciebus sui generis pileo stipitato, margine striato, supra coccineo vel aurantiaco et verruculis albidis asperso, subtus lamellis candidis; stipite fere bulboso; volva (peridio) squamosa oblitterata.

Fungi toti recentes juniores pileo convexo, diligenter ab epidermide et pilei et stipitis liberati. Mense Augusto colliguntur.

Essentia Agarici s. Amanitae paretur modo § 15. notato.

Agnus castus.

Reuschbaum; Mönchspfeffer. Chaste-tree. Agnus-castus.

Vitex Agnus castus L., arbor Europae australis, saepius in hortis culta, e familia Verbenacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis digitatis, foliolis 5—7 petiolatis lanceolatis integerrimis, subtus cano-tomentosis; floribus in spicis interruptis; corollis coeruleis limbo obliquo, 5—6lobo; drupa sicca 4loculari.

Folia et flores recentes. Mensibus Augusto et Septembri colliguntur.

Drupae maturae recentes. Mense Octobri colliguntur.

Essentia Agni casti paretur e foliis cum floribus, rarius e drupis, modo § 14. notato.

Albinum.

Albin. Graecum album.

Excrementa alba sicca canum alvo astricta aegrotantium.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiuntur.

Allium.

Knoblauch. *Garlick. Ail.*

Allium sativum L., planta Europae meridionalis, in hortis culta, e familia Liliacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: bulbo composito s. aggregato, bulbulis ovato-oblongis membrana involutis; caule tereti; foliis planis latis linearibus; umbella bulbifera; spatha longissima rostrata.

Planta tota, mensibus Julio vel Augusto collecta, recens.

Bulbuli recentes, a membrana liberati.

Essentia Allii aut e planta tota aut e bulbo modo § 14. notato paretur.

Aloë.

Aloë lucida. *Aloe. Aloe.*

Aloë Soccotrina, purpurascens, spicata et variae species Aloës, plantae Africae meridionalis, Indiae orientalis et occidentalis, e familia Asphodelearum.

Succus solis calore induratus, referens massas siccas difformes, irregulariter angulosas, nitentes, coloris e subviridi vel e rubicundo fusci, in schidiis tenuibus diaphanas, fractura nitente conchoidea, tritura pulverem aureo-luteum praebentes, calore emollientes, saporis nauseosi peramari.

Tinctura Aloës modo § 16. notato paretur.

Alumen.

Alumina-Kali sulphuricum crystallisatum. *Alaun. Alum. Alun.*

Crystalla regularia octoëdrica suppelucida, coloris expertia subfatiscentia, saporis dulciusculi styptici, in Aquae partibus quindecim solubilia, in Spiritu vini insolubilia. Constant e Kali, Alumina, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{K}_2\text{O}, \text{SO}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3, 3\text{SO}_3 + 24\text{HO}$). Crystallisatione iterata e Alumine venali, Kali continente, efficienda sunt. Cave ne Ferro inquinata sint.

Dilutio prima et secunda Aqua, tertia Spiritu vini diluto, quarta Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Alumina.

Argilla. *Thonerde. Maunerde. Alumine.*

Pulvis albus levior insipidus, odoris nullius, et in Aqua et in Spiritu vini insolubilis, constans ex Alumina et Aqua hydratica.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiuntur.

Alumina.

Rp. *Aluminis a ferro plane liberi* P. quinque (5).

Solve in

Aquae destillatae fervidae P. centum et viginti (120).

Solutioni filtratae sensim inter agitandum instilla

Natri carbonici crystallisati

quantitatem sufficientem, antea solutam in

Aquae destillatae quadruplo,

donec Natrum paulum praevaleat. Post digestionem per horam unam praecipitatum in filtrum collige et sedulo aqua elue. Tum praecipitatum solve in

Acidi hydrochlorici puri P. quinque (5),

Aquae destillatae P. quindecim (15),

dilutis, et denuo praecipita affundendo

Ammoni caustici liquidi

tantum, ut Ammonum paulum praevaleat. Praecipitatum perfecte aqua elotum inter chartam bibulam exprime et loco tepido sicca.

Alveolinum.

Zahnölsteineiter.

Materia purulenta ex alveolo dentis hominis exempta.

Contritio prima constat ex Alveolini parte (Gutta, Grano) una et Sacchari lactis partibus (Granis) undeviginti (19), et paretur contritione per stadia tria modo § 5. notato, nisi quod in stadio primo Sacchari partes undecim (11) adhibentur. Contritio haec signetur $2\frac{1}{2}$. Contritio secunda commiscendo et conterendo contritionis primae partem unam cum Sacchari lactis partibus quatuor, contritio tertia et dein dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur.

Ambra.

Ambra grisea. Ambra. Ambergris. Ambra gris.

Frustula variae magnitudinis, cerae consistentiae, e nigro cinerea vel e fusco cinerea, maculis striisque albidis aut flavescens aut nigrescentibus variegata, fracturae granosae, odoris pergrati, in Aethere et Spiritu vini absoluto fere omni ex parte solubilia.

Tinctura Ambrae ope Spiritus vini absoluti modo § 16. notato paretur.

Nonnulli homoeopathici contritiones et dilutiones modo § 11. notato effectas praeferunt.

Ammoniacum.

Gummi ammoniacum. Ammoniakgummi. *Gum ammoniac. Ammoniaque gomme.*

Dorema Armeniacum s. Dorema Ammoniacum Don., planta Africae orientalis, Persiae etc., e familia Umbelliferarum.

Gummi-resina in granis variae magnitudinis, opacis, extus e fusco flavescens, intus albidis, splendore pingui, saepe inter se conglutinatis (Ammoniacum electum s. amygdaloides).

Tinctura Ammoniaci ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato paretur.

Ammonium carbonicum.

Ammonium carbonicum. Kohlenfaures Ammon. *Sesqui-carbonate of ammonia. Sesqui-carbonate d'ammoniaque.*

Sal in massis crystallinis diaphanis albis duris, odoris valde ammoniacalis. Sit in igne plane volatile, et in Aquae part. 2 ad 3 solubile, in Spiritu vini fere insolubile.

Dilutio prima solvendo partem unam salis in Aquae partibus novem, dilutio secunda Spiritu vini diluto, sequentes dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Ammonum.

Ammonium; Ammonum causticum liquidum; Liquor Ammoni causticus. *Ammonium. Salmiageist. Ammonia. Ammoniaque.*

Liquor limpidus, coloris expers, odoris penetrantis caustici, saporis valde caustici, calore balnei aquae plane volatilis, pond. spec. 0,959—0,960. Constat e parte una Ammoni gasiformis et partibus novem Aquae. Servetur in lagena vitrea, epistomio vitreo munita.

Dilutio prima Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Ammonium chloratum.

Ammonium muriaticum; Sal ammoniacum. *Salmiak; Chlorammonium. Sal ammoniac. Hydrochlorate d'ammoniaque.*

Sal albissimum pulvereum crystallinum, saporis salini, ex-candefactum perfecte volatile, in Aquae partibus tribus, in Spiritu vini rectificatissimo parum solubile, constans ex Ammonio et Chloro ($=\text{NH}^+\text{Cl}$). Solvendo sal sublimatum in Aqua, filtrando et evaporando solutionem ad siccum paretur.

Dilutio prima Aqua, secunda Spiritu vini diluto, tertia Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Ammonum phosphoricum.

Ammonium phosphoricum, Ammonphosphat. *Phosphate of ammonia.*
Phosphate d'ammoniaque.

Sal pellucidum, coloris expers, odorem ammoniacalem redolens, valde fatiscens, in Aquae partibus novem, in Spiritu vini vix solubile, ex Ammono, Acido phosphorico et Aqua constans.

Dilutio prima Aqua, secunda Aqua spirituosus, tertia Spiritu vini diluto, quarta Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Ammonum phosphoricum (basicum).

Rp. *Ammoni caustici liquidi, pond. spec. 0,959—0,960.*

P. triginta (30).

In ollam immissis guttatim affunde

Acidi phosphorici puri, pond. spec. 1,130,

P. viginti quinque (25).

Sepone per diem, loco frigido, olla tecta. Tum collige crystallam exorta, et inter chartam bibulam premendo ab humore libera. Statim solvantur in partibus novem Aquae ad dilutionem (potentiatam) primam efficiendam.

Anacardium.

Anacardium orientale. *Östindische Elephantenlaus. Anacard; Malacca bean.*
Anacarde.

Semecarpus Anacardium L., Anacardium longifolium Lamark., arbor Indiarum orientalium, e familia Terebinthinacearum.

Fructus s. Anacardium est nux compressa globoso-cordiformis, longitudine circiter 25 centim., nigra vel e cinereo nigra, nitens, cum receptaculo adhaerente incrassato rugoso. Nux est succo acri nigricante unguinoso vel oleoso et semine amygdaloideo repleta.

Tinctura Anacardii e fructu toto pulverato ope Spiritus vini rectificatissimi modo § 16. notato paretur.

Contritiones e succo nigro fructus interdum efficiuntur.

Anagallis.Gauchheil. *Brooklime. Mouron.*

Anagallis arvensis L., *Anagallis phoenicea* Lamark, planta in agris hortisque Germaniae frequens, e familia Primulacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: laciniis corollae glanduloso-ciliatis; flore phoeniceo vel puniceo.

Planta tota florescens. Mense Julio colligitur.

Essentia Anagallidis modo § 14. notato paretur.

Angelica.Angelika. *Garden-Angelica. Angélique.*

Angelica Archangelica L., *Archangelica officinalis* Hoffm., planta biennis alpestris, saepius culta, Europae et Asiae septentrionalis, e familia Umbelliferarum.

Radix recens, rhizomate carnosio fusiformi, radículas tenuiores emittente, epidermide e fusco albida, annulata, cicatrizzata, intus alba, transversatim persecta striis excentricis notata, succum lacteum, aëris attactu flavescentem, exsudans, odoris graveolentis, saporis aromatici acris. Vere secundi anni colligitur.

Essentia Angelicae modo § 15. notato paretur.

Angustura.Angustura vera. Angusturarinde. *Angustura bark. Angusture vraie.*

Bonplandia trifoliata Willd., *Angostura Cuspare* Roemer et Schultes, *Galipea febrifuga* St. Hilaire, arbor Americae meridionalis, e familia Rutacearum.

Cortex in frustis planiusculis aut convexis, 1—3 millim. crassis, 5—12 centim. longis, 1—3 centim. latis; extus epidermide e cinereo albida, rugis minutis aspera; superficie interna coloris cinnamomei; fractura transversali splendente coloris fulvi et resinosa, nunquam fibrosa; odoris subfoeniculacei subnauseosi; saporis amari, dein acris. Infusum aquosum corticis affuso Ferro sulphurico crystallisato soluto praebet sedimentum e luteo album.

Nota. Ne substituatür cortex spurius, Angustura spuria. Hic cortex venenosus differt epidermide verrucis albis lichenoidis et maculis rubiginosis; fractura albida subcinerascens, non resinosa; superficie interna laevi e cinereo nigrescente; odore fere carente. Infusum aquosum affuso Ferro sulphurico soluto praecipitatum viride demittit, quod a fluido separatum in aëre nigrescit. Cortex spurius cortici vero admixtus interdum occurrit.

Tinctura Angusturae (verae) modo 16 notato paretur.

Anisum stellatum.

Badiana. Sternanis. Staranise. Anis étoilé; Badiane.

Illicium anisatum L., arbor Asiae orientalis et insularum Philippinarum, e familia Magnoliacearum.

Carpella (fructus) sejugia vel octojugia, in stellae formam disposita, paulum compressa, extus rugosa, intus laevissima, e fulvo fusca, semina nitida includentia, saporis subdulcis anisati, odoris aromatici grati.

Tinctura Anisi stellati modo § 16. notato paretur.

Anthracinum.

Anthrakinum. Karbunkfeleiter.

Materia purulenta mucosa carbunculorum.

Potentiatur eodem modo quo Alveolinum (Pag. 33).

Anthracinum in medicina veterinaria. Milzbrandeiter.

Materia purulenta ex abcessibus in Anthrace boum exempta. Aequali modo potentiatur.

Anthrakokali.

Anthrakokali simplex; Lithanthrakokali. Steinkohlentkali.

Pulvis niger, alkalinus, in aëre humescens. Servetur in lagenulis vitreis optime obturatis.

Contritiones potentiatae cum Saccharo lactis in mortario calefacto efficiantur et statim in lagenulas siccas ingerantur. Dilutiones modo § 10. notato parentur.

Anthrakokali.

Rp. *Kali caustici sicci* P. septem (7).

In vase ferreo calore sufficiente liquefactis agitando admisceantur

Lithanthracis nigerrimi puri laevigati P. quinque (5).

Massa refrigerata in mortario calefacto optime conteratur et statim in lagenulas bene obturandas ingeratur.

Anthrakokali sulphuratum.

Lithanthrakokali sulphuratum. Geschwefeltes Steinkohlentkali.

Pulvis niger, alkalinus, in aëre humescens. Servetur in lagenulis vitreis optime obturatis.

Contritiones et dilutiones eodem modo, quo Anthrakokali, efficiuntur.

Anthrakokali sulphuratum

paretur uti Anthrakokali, eo quidem discrimine, ut Kali caustico liquato

Lithanthracis P. quinque (5) et

Sulphuris sublimati loti P. una (1),

antea conterendo bene mixtae addantur.

Apisinum.

Apis. Biene. Bee. Abeille.

Apis mellifica L., insectum e familia Hymenopterorum. Insectum vivens, genere carens vel mellificans.

Tinctura Apis s. Apisinum paretur conterendo insecta Aqua adspersa et macerando pulvem in Spiritus vini diluto ita tamen, ut insecta aequent partem unam atque quantitas Aquae et Spiritus partes decem.

Interdum contritio praefertur. Insectum vivens unum conteratur cum Sacchari lactis Granis 47 aequali ratione § 5. notata, cui contritioni ad efficiendam contritionem secundam admisceas lege artis Sacchari lactis Grana 50. Contritionem quintam modo § 10. notato diluendo potentiare pergass.

Apocynum.

Apocynum androsemaifolium L., planta annua Americae borealis, in hortis Europae rarius culta, e familia Apocynearum, insignis: calice tubo corollae duplo brevior; corolla rosea campanulata tubo denticulis quinque inclusis; squamis quinque hypogynis irritabilibus; cymis terminalibus; foliis ovatis subtus tenuissime tomentosis; caule saepe rubente; radice succo lacteo repleta carnosa.

Radix recens ante florescentiam (vere) collecta.

Essentia Apocyni modo § 14. notato paretur.

Aqua.

Wasser. Water. Eau.

Non nisi Aqua pura destillata ad solutiones et dilutiones adhibeatur. Destillatio Aquae lente fiat aut ex apparatu e stanno puro confecto aut ex apparatu vitreo, ita tamen, ut pars destillans prima e partibus sex Aquae et partes duae ad finem destillationis in apparatu destillatorio remanentes rejiciantur. Servetur Aqua destillata in lagenis vitreis plane repletis et bene

obturatis. Sit limpida, odoris ac saporis expers, nec quiete, nec lucis influxu turbetur.

Aqua spirituosa.

Weingeisthaltiges Wasser. *Spirituos water. Eau spiritueuse.*

Liquor limpidus, coloris expers, constans e partibus 15 Spiritus vini anhydri et partibus 85 Aquae. Pond. spec. 0,977—0,979. Ad contritiones potentiatas solvendas inservit.

Aqua spirituosa.

Rp. *Spiritus vini rectificatissimi* Volumen unum (1),

Aquae destillatae Volumina quatuor (4).

Misce et in lagenis obturatis serva.

Aranea.

Aranea diadema. Krenzspinne. *Crooss spider. Araignée porte-croix.*

Aranea diadema L. s. *Epeira diadema* Walck., insectum e familia Araneoidium.

Aranea, quae ad justam magnitudinem pervenit, vivens, abdomine subgloboso e rubro fusco et cruce e flavo albida punctata (mensibus Augusto et Septembri capta).

Tinctura *Araneae* paretur ex abdomine, pectore cum pedibus rejecto. Abdomina secta modo § 16. notato macerentur in Spiritus vini diluti quantitate decuplice.

Interdum contritio praefertur. Contritio prima Guttam unam materiae, ex abdomine acu transfixo effluentis, cum Sacchari lactis Granis 49, simili ratione in § 5. notata, conterendo efficiatur, quae mixtio ad contritionem potentiata secundam efficiendam cum Granis 50 Sacchari lactis lege artis conteratur. Modis §§ 6. et 10. notatis potentiare pergās.

Argentum.

Silber. *Silver. Argent.*

Argentum foliatum aut *Argentum praecipitatum.* *Argentum foliatum* sit purum, penitus Acido nitrico puro solubile, et solutio nec Ammono caustico liquido superante nec Ferro-Kalio cyanato vestigia Cupri inquinantis indicet. Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiendae.

Argentum praecipitatum.

Rp. *Argenti nitrici* P. quinquaginta (50).
Solve in

Aquae destillatae P. quinque millibus (5000),
Acidi sulphurici concentrati P. una (1),

antea diluta

Aquae destillatae P. quatuor (4).

Solutis admisce solutionem filtratam, e

Ferri sulphurici crystallisati P. ducentis (200),

Kali acetici sicci P. sex (6),

Aquae destillatae P. mille (1000)

paratam. Praecipitatum inde enatum primum Aqua addito Acido sulphurico paulum acidulata, postea Aqua, tandem Spiritu vini rectificatissimo perfecte abluatur et leni calore siccetur. Sit pulvis e cinereo albus, compressus et contritus in mortario splendorem metallicum exhibens.

Argentum nitricum.

Salpetersaures Silberoxyd. *Nitrate of silver. Nitrate d'argent;*
Azotate d'argent.

Sal in crystallis albis vel coloris expertibus, plus minusve pellucidis, tabularibus, in Aqua et Spiritu vini facile solubile, constans ex Argento oxydato et Acido nitrico ($=\text{AgO}, \text{NO}^5$). Servetur a luce remotum.

Dilutio prima et secunda Aqua, tertia Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur. A luce remotae sollicitae ac non per longius tempus servantur.

Argentum nitricum crystallisatum.

Rp. *Argenti puri* quantum vis.

Solve lenissimo calore in

Acidi nitrici puri quantitate sufficiente.

Liquorem limpidum in patinam porcellaneam ingestum primum igne libero, tum in balneo arenae inter agitationem ope bacilli vitrei evaporando ad siccum redige. Sal remanens solve in

Aquae destillatae aequali quantitate

et solutionem calore balnei arenae diminue, donec dimidia circiter pars Aquae evaporata sit. Tum sepone loco frigido, ut crystalli prodeant. Liquor a crystallis defusus evaporando et

seponendo in crystallâ redigatur. Crystallâ omnia collecta, supra discum porcellaneum dispersa, loco tepido siccentur. Serventur in vitris obturatis a luce remotis.

Aristolochia.

Österluzei. *Upright birthwort. Aristolochie clématide.*

Aristolochia Clematidis L., planta perennis Germaniae et Galliae, e familia Aristolochiarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: radice repente; stolonibus repentibus; caule erecto, plerumque simplice; foliis reniformi-cordatis glabris; floribus fasciculato-congestis s. aggregatis axillaribus; tubo corollae recto, limbo vel labio oblongo.

Planta florescens tota recens (collecta mensibus Majo et Junio).

Essentia *Aristolochiae* paretur modo § 14. notato.

Aristolochia longa.

Range Österluzei. *Long-rooted birthwort. Aristolochie longue.*

Aristolochia longa L., planta perennis Europae australis, e familia Aristolochiarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: radice longa cylindrico-fusififormi tuberosa; caule prostrato subscandente ramoso flexuoso; floribus solitariis pallide virentibus striis purpureis; tubo corollae recto, labio lanceolato acuto; foliis triangulari-cordatis acutis.

Radix recens (mense Aprili vel Septembri collecta).

Essentia *Aristolochiae longae* paretur modo § 15. notato.

Armoracia.

Raphanus rusticanus. Meerrettig. *Horse radish. Raifort; Passe-rage.*

Cochlearia Armoracia L., planta perennis Europae meridionalis, praesertim in hortis culta, e familia Cruciferarum, insignis: radice subcylindrica carnosa succulenta, plerumque multiceps, ad tria centim. crassa, nodulis subrotundis aspersa, rugis transversis annulata, (e fusco) albida, intus alba, saporis acris pungentis.

Radix recens.

Essentia *Armoraciae* paretur e radice rasa modo § 14. notato. Sit e fusco flavida. In lagenis plane repletis et optime obturatis, neve ultra annum dimidium servetur.

Arnica.

Boßwörter; Falschfraut. *Mountain arnica*; *Leopard's bane*. *Doronic d'Allemagne*.

Arnica montana L., planta perennis Europae, e familia Compositarum, trib. Asteroidearum. Differt ab aliis similibus plantis: caule paucifloro; phyllis peranthodii (calycis) aequalibus, in duplici serie dispositis; pedunculis et peranthodiis glanduloso-pubescentibus; foliis caulinis paucis oppositis, foliis radicalibus subquinqvinnerviis subintegerrimis, oblongo-obovatis; radice subpraemorsa, fibris unilateralibus, cum epidermide e fusco nigrescente, cortice flavo ductibus succifluis praedito et medulla sordide alba.

Radix recens et siccata. Radice recenti cum foliis radicalibus caulisque et floribus a calycibus liberatis utuntur.

Essentia Arnicae e radice recente modo § 15. notato, Tinctura e radice siccata modo § 16. notato parentur. Nonnulli homoeopathici Essentiam poscunt, quae e radicis recentis partibus 2, foliorum et florum recentium singulorum parte una modo § 15. notato parata est.

Arsenium trisulphuratum.

Auripigmentum. Arsenium sulphuratum (flavum). Sulphuretum Arsenici flavum. Auripigment. *Yellow arsenic*. *Orpiment*.

Pulvis siccus citrinus, odoris saporisque expers, calore fortiore avolans, in Ammono caustico liquido plane, in Spiritu vini vix solubilis, in Aqua insolubilis, constans ex Arsenio et Sulphure ($=AsS^3$). Praeparatum venale nunquam adhibeatur.

Contritiones et dilutiones parentur modis §§ 6. et 11. notatis.

Arsenium trisulphuratum.

Rp. *Acidi arsenicosi pulverati* P. unam (1).

In cucurbitam vitream immissam solve coquendo in

Aquae destillatae P. centum (100).

Liquori semirefrigerato admisce

Acidi hydrochlorici P. duas (2).

Tum filtra, si opus fuerit. Liquori limpido, interdum agitando,

Gas Acidi hydrosulphurici

tamdiu inducatur, quamdiu praecipitatum citrinum inde producit, quod Aqua destillata bene ablutum inter strages chartae bibulae premendo et loco tepido quam celerrime siccetur. Serva in lagenulis obturatis.

Artemisia.Beifuß. *Mugwort.* *Armoise.*

Artemisia vulgaris L., planta perennis Europae, e familia Compositarum, trib. Helichrysearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis tantum subtus albo-tomentosis, pinnatifidis, summis integris, laciniis lanceolatis acutis; floribus in capitulis oblongis erectis tomentosis; radice (rhizomate) subcylindrica, crassitie pennae anserinae usque ad digitum, et longitudine digiti manus, ubicunque radiculis ramosis flexuosis densis obsessa, epidermide e griseo fusca, intus ligno albo.

Radix tempore verno effossa, sine ablutione purgata et calore tepido (25 ad 30° C.) quam celerrime siccata, tum statim pulverata. Servetur in vitris obturatis.

Tinctura Artemisiae paretur modo § 16. notato.

Arum.Aron. *Common arum;* *Wacke robin.* *Arum tacheté;* *Verge d'Aron.*

Arum maculatum L., planta perennis Europae meridionalis et australis in locis sylvosis humidis, e familia Aroidearum. Acaulis est et insignis: foliis hastato-sagittatis, saepe fuscis maculis; radice tuberosa subrotunda, inferius fibrillis obsita, compacta, crassitie 1,5 ad 2,5 centim., epidermide e fusco lutescente, intus alba, succo lacteo acri praedita.

Radix recens. Mense Aprili ante florescentiam plantae colligitur.

Essentia Ari paretur modo § 15. notato.

Asa foetida.Stinkender Mand. *Stinking assa.*

Species variae *Ferulae*, plantae Asiae meridionalis et australis, e familia Umbelliferarum.

Gummi-resina, venalis in glebis granisve plerumque conglutinatis, extus e roseo fuscis, intus albidis demum purpurascens, splendore pingui, odoris gravissimi alliacei, saporis amariusculi acris.

Tinctura Asae foetidae paretur modo § 16. notato.

Asarum.Haselwur. *Asaraback;* *Haselwort.* *Asaret;* *Cabaret.*

Asarum Europaeum L., planta perennis, in nemoribus

umbrosis Europae habitans, e familia Aristolochiarum, insignis: caule repente; foliis binis reniformibus obtusissimis pubescentibus, supra saturate viridibus nitescens; pedunculis solitariis; floribus erectis atropurpureis; peregonii phyllis apice parum inflexis; radice repente, calamus corvinum circiter crassa, quadrangulari subgeniculata, fibrillis multis obsessa, coloris e cinereo fuscis, intus ex albido flavicantis, odoris cascarillaceo-camphorati, saporis ex amaro acris.

Planta tota florens.

Radix recens, mensibus Martio et Aprili inter florescentiam plantae collecta.

Essentia Asari aut e planta tota aut e radice modo § 15. notato paretur.

Ascaridinum.

Mastwurm. Springwurm. Small worms. Ascarides.

Ascaris vermicularis L., vermiculus intestinalis ex ordine Nematoideorum (Enthelminthium). In stercore recente humano, praesertim infantium, saepe reperitur. Insignis: cauda subulata et cute ad latera corporis subtilissime crenata.

Vermiculus totus vivus.

Contritio prima et secunda aequali modo, quo illae Alveolini, contritio tertia et quarta modo § 6. notato, dilutio quinta ope Aquae spirituosae, sexta ope Spiritus vini rectificati, dilutiones subsequentes Spiritu vini rectificatissimo modo § 10. notato efficiuntur.

Asparagus.

Spargel. Sparow-grass; Asparagus. Asperge.

Asparagus officinalis L., planta Europae, saepius culta, e familia Asparaginarum.

Turiones recentes albidus aphylli, squamis obsessi, qui in coenis eduntur. Colliguntur mense exeunte Majo et mense Junio.

Essentia Asparagi paretur modo in § 14. notato.

Asterias rubens.

Roßher Meerstern.

Asterias rubens Lam., animal crustaceum rubens, maria Europaea incolens, e familia Radiariorum, insigne: corpore

depresso; crusta subcoriacea, undique aculeata; radiis lanceolatis gibbis quinque, triplo longioribus quam latis; aculeis dorsalibus brevioribus, plerumque inaequaliter dispositis.

Animal totum vivens.

Essentia Asteriae aequali modo quo Essentia Cancri paretur.

Atriplex.

Chenopodium. Vulvaria. Stinfende Melbe. *Stinking goose-foot. Patte d'oie.*

Chenopodium Vulvaria L. s. Chenopodium olidum Curtis, planta annua Europae, e familia Chenopodearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule diffuso procumbente; foliis rhombo-ovatis integerrimis. Planta est ex toto farinaceo-pruinata.

Planta tota florescens, recens: Mensibus Julio et Augusto colligitur.

Essentia Atriplicis paretur modo § 14. notato.

Atropinum sulphuricum.

Schwefelsaures Atropin. *Sulphate of atropia. Sulfate d'atropine.*

Sal neutrum pulvereum crystallinum album vel in crystallulis acicularibus, coloris expertibus, in Aqua et Spiritu vini solubilibus, constantibus ex Atropino, Acido sulphurico et Aqua ($\text{At}, \text{SO}_3 + 4\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur.

Atropinum sulphuricum.

Rp. *Acidi sulphurici conc.* P. unam (1),

Aquae destillatae P. viginti (20).

Mixtis adde

Atropini puri P. sex (6)

vel quantum ad neutralisationem Acidi requiritur. Liquor filtratus tunc leni calore evaporet, donec crystallula demiserit. Tum liquor quam celerrime supra Acidum sulphuricum concentratum collocando exsicca. Asserva in vitris bene obturatis.

Auro-Natrium chloratum.

Aurum chloratum natronatum; Aurum natronato-chloratum; Aurum natronato-muriaticum; Aurum muriaticum natronatum; Chloretum auricum natronatum; Sal auri Figuieri. Gold-Natriumchlorid. *Chloride of gold and soda. Chlorure d'or et sodium; Chlorure aurico-sodique.*

Sal in crystallulis prismaticis aurantiacis, aëre persistenti-

bus, in Aqua facile atque in Spiritu vini solubile, constans e Natrio chlorato, Auro trichlorato et Aqua ($=\text{NaCl}, \text{AuCl}_3 + 4\text{HO}$).

Dilutio prima Aqua, secunda Spiritu vini diluto, dilutiones subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur, neve per longius tempus asserventur.

Auro-Natrium chloratum.

Rp. *Auri trichlorati sicci* P. quinque (5),
Natrii chlorati sicci puri P. unam (1).

Solve in

Aquae destillatae calidae P. duodecim (12).

Leni calore liquor ad volumen dimidium evaporet, tum seponatur loco frigido, ut fiant crystallae. Liquor a crystallis defusus iterum ad volumen dimidium evaporet et ad crystallisandum seponatur. Crystallae omnia collectae supra discum porcellaneum dispersae loco paulum tepido quam celerrime siccantur et in lagenulis a luce remotis asservuntur.

Nota. E liquore a crystallis ultimis defuso Aurum modo sequente praecipto ad Aurum praecipitatum parandum secernatur.

Aurum.

Gold. Gold. Or.

Aurum foliatum purum aut praecipitatum. Aurum foliatum Acido nitrico non solvitur. Acidum nitricum purum Auro foliato superfusum tum decantatum nec Acido hydrochlorico diluto turbetur, nec Ammono caustico liquido superante coeruleum tingatur.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiuntur.

Aurum praecipitatum.

Rp. *Ferri sulphurici crystallisati* P. decem (10).

Solve in

Aquae destillatae P. nonaginta (90).

Solutioni filtratae instilla inter agitationem liquorem, paratum ex

Auri trichlorati puri P. tribus (3),

(vel *Auro-Natrii chlorati* P. quatuor (4)),

Aquae destillatae P. triginta (30),

Acidi hydrochlorici P. duabus (2).

Praecipitatum inde enatum Aqua abluatur et leni calore siccetur.

Sit pulvis levis, e fusco cinnamomeus, in mortario porcellaneo compressus et contritus splendorem metallicum exhibens.

Aurum trichloratum.

Aurum muriaticum s. Aurum chloratum. Goldchlorid. *Perchloride of gold.*
Perchlorure d'or.

Pulvis crystallinus flavus, in aëre humescens, plane in Aqua et Spiritu vini facile solubilis, constans ex Auro et Chloro (=AuCl³).

Dilutio potentiata prima Aqua, secunda Spiritu vini diluto, dilutiones subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur. Dilutiones in lagenulis a luce remotis sollicitè neque per longius tempus asservantur.

Aurum trichloratum.

Rp. *Auri puri praecipitati* q. v.

Solve leni calore in quantitate sufficiente mixturae, paratae ex

Acidi hydrochlorici P. duabus (2) et

Acidi nitrici P. una (1).

Solutio in patellam porcellaneam ingesta leni calore balnei arenae ad syrupi spissitudinem evaporet. Residuum hoc calore 100—120° C. sollicitè calefacere perge, donec Acidum superfluum adhaerens avolaverit. Massam refrigeratam contere et in lagenula embolo suberino bene obturata ac velata charta nigra asserva. Partes 20 Auri puri praebeant fere partes 31 Auri trichlorati puri, quod inter evaporationem semper respiceas.

Aurum sulphuratum.

Schwefelgold. *Protosulphuret of gold.* *Protosulfure d'or.*

Pulvis saturate fuscus, paucis interdum particulis nitidis intermixtis, insolubilis et in Aqua et Spiritu vini, constans ex Auro et Sulphure (=AuS).

Contritiones et dilutiones parentur modis § 6. et 11. notatis.

Aurum sulphuratum.

Rp. *Auri trichlorati* P. decem (10).

Solve in mixtura ex

Aquae destillati P. quingentis (500) et

Acidi hydrochlorici P. una (1)

parata. In liquorem, in cucurbitam vitream infusum, quae in

balneo aquae caloris 60 ad 70° C. collocata est, tamdiu Gas Acidi hydrosulphurici (HS) induc, quamdiu praecipitatum fuscum exoritur. Praecipitatum elotum loco tepido siccetur et in lagenula obturata, a luce remota, servetur.

Nota. Calor liquoris gradus 70 thermometri Celsiusiani ne superet, ne magna quantitas Auri metallici in praecipitatum transferatur.

Badiaga.

Badaja; Spongia palustris. *Leichschwamm. Badiaga. Eponge de rivière.*

Spongilla lacustris Lamark s. Spongia lacustris L., alga in paludibus Europae frequens, insignis: thallo ramoso, membrana virescenti tubulisque decoloribus; sporangiis globosis lutescentibus.

Alga tota recens, aestate collecta.

Essentia Badiagae s. Spongiae palustris ex alga, premendo ope manuum inter strages linteas ab humore liberata, modo § 15. notato paretur.

Balanorrhinum.

Eichelstripperschleim.

Liquor mucilaginosus, qui in balanorrhoea e glandulis glandis penis secernitur.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Baryta acetica.

Effigsaurer Baryt. Acetate of baryta. Acétate de baryte.

Massa salina pulverea, alba, solubilis in partibus duabus Aquae, idemque in Spiritu vini partibus centum, constans e Baryta, Acido acetico et Aqua (=BaO, A+HO).

Dilutio prima Spiritu vini diluto, secunda Spiritu vini rectificato, dilutiones subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Baryta acetica.

Rp. *Aceti concentrati puri (pond. spec. 1,040), P. septem (7).*

Aquae destillatae singulorum P. septem (7).

Mixtis calefactisque injice inter agitationem

Barytae carbonicae purae P. quatuor (4)

aut quantum solvitur. Liquor filtratus, in patinam porcellaneam ingestus calore balnei aquae tamdiu evaporet, donec inter agitationem ad pulverem siccum redactus sit.

Baryta carbonica.

Kohlenzauer Baryt. *Carbonate of baryta. Carbonate de baryte.*

Pulvis albus, e Baryta et Acido carbonico constans (=BaO,CO²), in Aqua et in Spiritu vini insolubilis.

Contritiones et dilutiones parantur modis §§ 6. et 11. notatis.

Baryta carbonica.

Rp. *Bary chlorati crystallisati* P. tres (3).

Solve in

Aquae destillatae P. triginta (30).

Liquori filtrato instilla inter agitationem solutionem paratam ex

Ammoni carbonici P. una (1),

Aquae destillatae P. quinque (5),

Liquoris Ammoni caustici P. duabus (2),

aut quantum hujus liquoris requiritur, ut hic paululum praevalcat. Praecipitatum optime Aqua destillata abluatur, dein leni calore siccetur.

Baryum chloratum.

Baryta muriatica. Chlorbaryum. *Chloride of barytium. Chloride de baryum.*

Crystalla prismatica tabularia, coloris expertia, diaphana, saporis salini amari ingrati, in Aquae patibus duabus et dimidia, in Spiritu vini autem vix solubilia, constantia e Baryo, Chloro et Aqua (=BaCl+2HO).

Dilutio prima Aqua, secunda Spiritu vini diluto, tertia Spiritu rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Belladonna.

Tollfirsche; Tollfrant. *Deadly nightshade; Dwale. Belle-dame; Belladone.*

Atropa Belladonna L., planta perennis Europae meridionalis, in silvis umbrosis et montanis spontanea, e familia Solanearum. Differt a plantis similibus foliis ovatis acuminatis integerrimis, in petiolum attenuatis, junioribus pubescentibus, adultis nervis solummodo subpubescentibus; foliis in ramis geminatis; floribus axillaribus solitariis nutantibus, e violaceo fuscis.

Planta tota florescens recens. Mensibus Junio Julio Augusto colligitur.

Essentia Belladonnae paretur modo § 14. notato. Sit e viridi fusca.

Berberis.

Berberitze. *Barberry. Epine-vinette; Vinettier.*

Berberis vulgaris L., frutex Europae meridionalis, saepe cultus, e familia Berberidearum, insignis: ramis spinis tripartitis sub fasciculis foliorum; foliis obovato-oblongis, ciliato-serulatis; racemis pendulis multifloris in medio fasciculorum foliorum dispositis; floribus flavis; baccis oblongis coccineis; radice cum cortice principio tinctorio luteo praedita.

Cortex siccatus radicis autumno effossae.

Tinctura Berberidis paretur modo § 16. notato.

Bismuthum nitricum basicum.

Bismuthum. Magisterium Bismuthi; Marcasita alba; Bismuthum nitricum praecipitatum: Bismuthum hydrico-nitricum. *Bismuth?*; *Bismuthpraecipitat. Magistery of bismuth; Nitrate of bismuth. Magistère de bismuth; Sousnitrate de bismuth.*

Pulvis niveus subcrystallinus, e Bismutho oxydato, Acido nitrico et Aqua constans, in Aqua et Spiritu vini insolubilis, praecipitando paratus e solutione Bismuthi nitrici acidi. Servetur in vitris nigris. Contritiones et dilutiones parentur modis §§ 6. et 11. notatis.

Boletus Satanas.

Satanspilz.

Boletus Satanas Lenz, fungus Germaniae e familia Hymenomycetum, insignis: pileo magno fornicato crasso glabro, parum viscido, e flavo albido; tubulis flavidis, in margine rubris; stipite carnosio valde crasso, extus saturate rubro, supra albide reticulato, glabro, intus e flavo albido; carne pilei stipitisque post incisionem coerulescente; odoris amoeni.

Fungus totus recens, mensibus Augusto et Septembri collectus.

Essentia Boleti Satanae paretur modo § 15. notato.

Borax.

Borax depurata; Natrum boracicum natronatum. *Borax. Refined borax. Sousborate de soude.*

Sal in crystallis rhombicis vel frustis crystallinis decoloribus subdiaphanis duris, in aëre parum fatiscentibus, saporis mitis dulciusculi refrigerantis alcalini salsi. E Borace venali iterata crystallisatione parandum. Solubile in Aquae partibus

quindecim, insolubile in Spiritu vini rectificatissimo. Constat e Natro, Acido boracico et Aqua ($=\text{NaO}, 2\text{BO}^3 + 10\text{HO}$).

Potentiatur aequali modo atque Alumen.

Boviluinum.

Kinderspeigist.

Liquor mucosus in peste boum e faucibus, naribus, oculis effluens.

Potentiatur aequali modo atque Alveolinum.

Bovista.

Bovist; Staußschwamm. Puck-fist. Vesse de loup.

Bovista gigantea Nees s. Lycoperdon Bovista L. s. Bovista plumbea Persoon., fungus Germaniae e familia Gastromycetum.

Fungus (maturus) sporidiis olivaceo-fuligineis pulvereis repletus.

Tinctura Bovistae ex hoc fungo paretur modo § 16. notato.

Sporidia olivaceo-fuliginea ex peridio fragili exemta.

Contritiones et dilutiones e sporidiis modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Bromum.

Brom. Brom. Brôme.

Liquidum coloris e fusco saturate rubri, maxime volatile, causticum, odoris fortis odorem Chlorig accedentis, temperatura media vapores rutilantes emittens, in Aqua parum, in Spiritu vini maxime solubile. Pond. spec. 2,9. Liquidum sub strage aquae affusae in lagenae epistomio vitreo arctissime clausa et loco frigido servetur.

Dilutiones omnes Spiritu vini diluto efficiuntur, a luce semper remotae teneantur, neu per longius tempus asserventur. Dilutiones et prima et secunda mox rejiciendae sunt.

Brossulinum.

Syphilinum Brossulinum. Syphiliseiter.

Materia purulenta ulceribus venereis exemta.

Contritiones et dilutiones modo quo illae Alveolini (Pag. 33) efficiuntur.

Brucea.

Angustura spuria s. ferruginea s. ostindica s. antidysenterica. Pseudoangustura.

Strychnos Nux vomica L., arbor Ceylanica et Malabarica, e familia Apocynearum.

Cortex. Conferatur nota sub Angustura (Pag. 36).

Tinctura Bruceae paretur modo § 16. notato.

Bryonia.

Bryonia alba. Zannrübe; Gichtrübe. *Bryony*. *Bryone*; *Couleuvrée*.

Bryonia alba L., planta perennis Europae orientalis, in sepibus habitans, e familia Cucurbitacearum. Differt a speciebus sui generis: foliis cordatis, sinuato-dentatis, utrinque callosis-scabris; floribus monoicis; calice floris foeminei corollam subaequante; baccis globosis nigris.

Radix ex albido lutea, intus alba, crassa, fusiformis, post maturationem fructuum (baccarum) auctumno collecta.

Essentia Bryoniae modo § 14. notato paretur.

Bufo.

Kröte. Toad. Crapaud.

Rana Bufo, Bufo cinereus, animal frequens amphibium, e familia Ranarum, insigne: corpore ventricoso, verrucis fuscis vestito, lurido vel e cinereo rubente.

Animal vivens.

Tinctura (Essentia) Bufonis modo § 15. notato paretur.

Bupodopurinum.

Klauescheitener.

Materia purulenta mucosa ex ungulis boum claudicatione epizootica (peste exungulante) aegrotantium exempta.

Potentiatur aequali modo atque Alveolinum.

Bustomacacinum.

Maulschenscheim.

Secretum mucosum oris boum aphthis epizooticis s. stomachace aegrotantium.

Potentiatur aequali modo atque Alveolinum.

Cadmium.

Kadmiummetall. *Cadmium*.

Metallum Stanno simile, splendens, ductile, calore fortiore

volatile. Adhibeatur Cadmium divisum s. praecipitatum, quod est pulvis subtilis griseus, premendo ope chalybis splendorem metallicum exhibens.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiendae sunt.

Cadmium praecipitatum.

Rp. *Cadmii sulphurici crystallisati* q. v.

Solve in

Aquae destillatae trigintuplo.

In solutione filtrata colloca

Zincum in bacillis majoribus,

tum loco tepido sepone, interdum agitando et praecipitatum ab Zinco abradendo, donec omne Cadmium praecipitatum fuerit. Praecipitatum collectum primum Aqua, postea Spiritu vini abluatur et inter strages chartae bibulae quam celerrime leni calore siccetur, tandem a particulis Zinci forsitan intermixtis per cribrum trajiciendo separetur.

Cadmium sulphuricum.

Schwefelsaures Cadmiumoxyd. *Sulphate of cadmium. Sulfate de cadmium.*

Sal in crystallis columnaribus pellucidis, coloris expertibus, in aëre fatiscientibus, saporis metallici, in Aquae partibus tribus, neque in Spiritu vini solubile, constans e Cadmio oxydato, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{CdO}, \text{SO}^3 + 4\text{HO}$). Praeparatum officinarum chemicarum.

Dilutiones aequali modo atque Zinci sulphurici efficiuntur.

Cainca.

Cahinca. Cainana. Serpentina Brasiliana.

Chiococca scandens Riedel, Chiococca anguifuga Mart., frutex Americae meridionalis, e familia Rubeacearum.

Radix sicca cylindrica ramosa, 5 ad 12 centimetra longa, ramis plus minusve tortis tenacibus, pennam anserinam usque ad digitum minorem crassis, cortice subrugoso, annulato-nodosa, extus e griseo fusca, intus e griseo albida vel subflavida, odoris debilis ingrati, saporis ex aromatico amariuscule subacerbi. Pars lignosa, e flavido albida, centralis radicis fere insipida et inodora est.

Tinctura Caincae paretur modo § 16. notato.

Caladium.

Arum seguinum. Giftiger Aron. *Caladium*.

Caladium seguinum Ventenat., planta Americae borealis, in aliis terris in hortis botanicis culta, e familia Aroidearum, insignis: foliis ovalibus acuminatis; caule nodoso; petiolis subtus caniculatis subamplexicaulibus; spatha pallide viridi, intus purpurea; spadice citrino, brevior spatha oblonga.

Planta tota florescens.

Essentia Caladii paretur modo § 14. notato.

Calcaria acetica.

Essigsaure Kalkerde. *Acetate of lime*. *Acétate de chaux*.

Pulvis subcrystallinus albus, solubilis in Aquae partibus tribus et dimidia, in Spiritu vini parum solubilis, constans e Calcaria, Acido acetico et Aqua ($=\text{CaO}, \bar{\text{A}} + \text{HO}$).

Dilutio prima Aqua spirituosissima, secunda Spiritu vini diluto, tertia Spiritu vini rectificato, quarta Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Calcaria acetica.

℞p. *Calcariae carbonicae purae* P. unam (1).

Paulatim affunde inter agitationem

Aceti concentrati puri P. quatuor (4)

vel quantum requiritur ad perfectam solutionem, ita ut Acetum paulum praevaleat. Liquor filtratus calore balnei aquae et inter agitationem ad siccum evaporet. Serva in lagenis obturatis.

Calcaria arsenicica.

Pharmacolithos. Neutrale arsenisaure Kalkerde. *Arseniate of lime*.

Arséniate de chaux.

Pulvis albus, e Calcaria, Acido arsenicico et Aqua ($=2\text{CaO}, \text{HO}, \text{AsO}_5 + 5\text{HO}$) constans, in Aqua parum, neque in Spiritu vini solubilis.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 10. notatis parentur.

Calcaria arsenicica.

℞p. *Arsenici albi subtilissime pulverati* P. tres (3).

In patinam vitream immissis affunde

Acidi nitrici puri (pond. spec. 1,2) P. decem (10).

Miscela calore balnei arenae sub divo modico calore ad siccum

evaporet. Residuum in pulverem redactum digerendo coquendoque in

Aquae destillatae P. viginti (20)

solvatur. Solutioni refrigeratae, dein filtratae inter agitationem paulatim admisce

Aquae Calcariae ustae recens paratae P. 1300

vel quantum requiritur, ut Acidum adhuc praevaleat. Si tamen hunc modum neglexisti et Calcaria praevalet, instilla tamdiu Acetum concentratum, donec liquidum paululum acidum sit. Sepone per diem loco frigido. Tum sedimentum filtri ope separa, Spiritu vini rectificato ablue, loco tepido sicca et serva. (Liquorem a sedimento separatim loco abdito rejice.)

Calcaria carbonica.

Rohlenjaure Kalkerde. Carbonate of lime. Carbonate de chaux.

Pulvis albus, in Aqua et Spiritu vini insolubilis, constans e Calcaria et Acido carbonico ($=\text{CaO}, \text{CO}_2$). Aut Calciam carbonicam praecipitando effectam, aut e Conchis laevigando paratam (Conchas praeparatas) adhibere licet.

Contritiones quatuor, tum dilutiones efficiuntur.

Calcaria carbonica praecipitata.

Paretur aequali modo atque Baryta carbonica (Pag. 49) e Calcio chlorato puro.

Calcaria caustica.

Calcaria s. Calx viva s. usta. Rezkalk; gebrannter Kalk. Lime. Chaux.

Pulvis albidus sive e griseo albus, alcalinus, Aquae dimidia parte conspersus incalescens, in Aquae partibus circiter 700 solubilis. Ne contineat Acidum carbonicum.

Dilutiones potentiatae Calcariae ope Tincturae seu Spiritus Calcariae (causticae) efficiuntur.

Tinctura Calcariae s. Spiritus Calcariae causticae paretur modo § 16. notato, ita tamen, ut cucurbita, in qua fiat maceratio, sit fere repleta et epistomio suberino accurate obturata atque Spiritus vini adhibitus antea leni ebullitione ab Acido carbonico absorpto plane liberatus. Filtratio tincturae vel decantatio quam celerrime efficiatur. Tinctura e fusciscente flavida servetur in lagenulis plane repletis et optime obturatis. Tinctura, quae turbida est, vel sedimentum demittit, rejiciatur.

Calcaria caustica.

Rp. *Calcariae carbonicae purae q. v.*

In ollam platineam immissum albedinis calore excandescat, donec portiuncula exempta, aqua humectata, affuso Acido hydrochlorico diluto non amplius effervescat. Massa refrigerata statim in lagenulis optime obturatis asservetur.

Calcaria jodata.

Calcaria hypojodosa. Jobkaff. Jodic lime. Chaux jodurée.

Pulvis e fusco nigrescens, odoris Jodo accedentis, saporis styptici acris ingrati, in Aqua maxima ex parte solubilis, in aëre humescens.

Contritiones ne efficiantur.

Dilutio prima Aqua macerando et decantando, secunda Spiritu vini diluto, dilutio tertia Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur. Dilutiones a luce remotae asservuntur.

Calcaria jodata.

Rp. *Calcariae causticae recens paratae P. octo (8).*

Conspergantur paulatim

Aquae destillatae calidae P. tribus (3)

vel quantum requiritur, ut Calcaria praebeat hydratem pulverum. Tum statim inter terendum admisce

Jodi puri P. viginti et septem (27).

Statim miscela in lagenam epistomio vitreo munitam ingeratur et a luce remota servetur. Praeferatur ad efficiendam dilutionem primam hic modus:

Rp. *Calcariae causticae recens paratae P. octo (8).*

Conspergantur paulatim

Aquae destillatae P. tribus (3)

vel quantum requiritur, ut Calcaria praebeat hydratem. Tum, admixtis

Aquae destillatae frigidae P. quinque (5)

addantur inter terendum

Jodi puri P. viginti et septem (27).

Miscela, iterum admixtis

Aquae destillatae P. trecentis et triginta quinque (335),
in lagenam epistomio vitreo bene obturandam immissa interdum

agitando maceretur per horas duodecim. Tandem sepone et decanta. Liquor limpidus signetur: Dilutio potentiata 1.

Calcaria phosphorica.

Basisch-phosphorsaure Kalkerde; Knochenerde. *Phosphate of lime.*
Phosphate de chaux.

Pulvis subcrystallinus albissimus insipidus, in Aqua et Spiritu vini insolubilis, plane autem solubilis in Acido phosphorico diluto, constans e Calcaria, Acido phosphorico et Aqua ($=2\text{CaO}, \text{HO}, \text{PO}^5 + 3\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis parantur.

Calcaria phosphorica.

Rp. *Calcii chlorati (crystallisati)* P. duodecim (12).

Solve in

Aquae destillatae fervidae P. nonaginta sex (96).

Liquori filtrato adhuc calido inter agitationem instilla solutionem filtratam, paratam e

Natri phosphorici crystallisati P. viginti (20),

Aquae destillatae fervidae P. octoginta (80).

Sepone loco calido, donec praecipitatum initio lubrico-gelatinosum, sub forma pulveris subcrystallini ad fundum descendat. Praecipitatum filtro separatum Aqua calida optime edulcoretur, tum sicceetur.

Calcaria sulphurica.

Gypsum. Schwefelsaure Kalkerde; Gyps. *Sulphate of lime.* *Sulphate de chaux.*

Pulvis subcrystallinus albissimus, in Aqua partibus 500 solubilis, in Spiritu vini insolubilis, constans e Calcaria, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{CaO}, \text{SO}^3 + 2\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10 notatis parantur.

Calcaria sulphurica.

Rp. *Calcii chlorati (crystallisati)* P. decem (10).

Solve in

Aquae destillatae fervidae P. octoginta (80).

Liquori filtrato adhuc calido inter agitationem instilla solutionem filtratam, paratam e

Natri sulphurici crystallisati P. sedecim (16),

Aquae destillatae P. octoginta (80).

Sepone loco frigido. Tum praecipitatum in linteo collige, Aqua bene ablue et loco tepido sicca.

Calcium sulphuratum.

Calcaria sulphurata; Hepar Sulphuris calcareum. Kalkschwefelleber. Schwefelcalcium. *Sulphuret of lime. Sulfure de chaux.*

Pulvis e griseo flavescens vel rubello-albidus, saporis acris, in Aqua et Spiritu vini parum solubilis, aëri expositus odoris gas hydrosulphuratum accedentis, constans e Calcio sulphurato et Calcaria sulphurica ($=3\text{CaS} + \text{CaO}, \text{SO}^3$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis parantur. Praeferantur dilutiones e Tinctura Calcii sulphurati effectae, quae in lagenulis plane repletis asservandae sunt.

Tinctura Calcii sulphurati macerando in lagena repleta e Sulphureti parte una, Aquae partibus tribus, Spiritus vini diluti partibus sex et decantando paratur. Tinctura sedimento turbida rejiciatur.

Calcium sulphuratum.

Rp. *Calcariae recens ustae optimae* P. decem (10),
Sulphuris sublimati loti P. octo (8).

Optime mixtae in crucibulum Hassiacum inter comprimendum ope pistilli immittantur et strage Cretae pulveratae obtectantur. Crucibulum, operculo figulino ope luti argillacei obtectum, in furno anemio collocetur et carbonibus e ligno non incensis circumdetur. Tum stratum carbonum ardentium supra impone, ita ut ignis carbones a summo ad fundum versus lente corripiat, dein crucibulum per horam dimidiam excandeat. Post refrigerationem, operculo demto et strato Cretae caute rejecto, massa sulphurata conterendo in pulverem redigatur et statim in lagenis bene obturatis servetur.

Praescriptum alterum.

Rp. *Calcariae sulphuricae ustae, subtilissime pulveratae*
P. decem (10),

Fuliginis e taeda P. tres (3).

Mixtae comprimendo in crucibulum Hassiacum ingerantur et, operculo imposito (per horam) fortiore igne incandescant, donec in pulverem albidam conversae sint. Massa adhuc tepida statim in lagenulas optime obturandas ingeratur, ut asservetur.

Calendula.

Ringelblume. *Marygold. Souci des jardins ou de soleil.*

Calendula officinalis L., planta annua Europae australis spontanea, in hortis saepissime culta, e familia Compositarum (Calendulacearum). Differt ab aliis plantis similibus: involucri biseriali; receptaculo nudo plano; flore composito majore aurantiaco, radiato; caule erecto angulato hirsuto; foliis sparsis et alternis, oblongo-ovatis subdentatis vel sinuatis, inferioribus decurrentibus, superioribus amplexicaulibus, hirsutiviscosis.

Planta tota inter evolutionem florum (mense Julio) collecta. Essentia *Calendulae* paretur modo § 14. notato.

Camphora.

Kampfer. *Camphire. Camphre.*

Camphora officinarum Nees ab Esenb. *Laurus Camphora* L., arbores Asiae orientalis, e familia Laurinearum.

Massa subcrystallina alba nitida pellucida, in aëre plane avolans, odoris peculiaris fragrantis, saporis acris aromatici amaricantis, dein refrigerantis, in Aqua parcissime, in Spiritu vini facile solubilis. Sublimatione e partibus illarum arborum obtinetur.

Dilutio prima solvendo in Spiritu vini rectificatissimo efficitur.

Cancer.

Krebs. *Crab. Ecrevisse commune.*

Astacus fluviatilis Fabr. s. *Cancer fluviatilis* L., animal crustaceum ex ordine Decapodum et e familia Astacinarum, in lacubus et segnioribus fluminibus ac rivis totius Europae.

Animal totum vivens, aestate captum.

Essentia *Canceri* modo § 15. notato, conquassando et per tres dies macerando cum Spiritu vini rectificatissimo, paratur. Sit flavida.

Cannabis.

Sanf. *Hemp. Chanvre.*

Cannabis sativa L., planta annua, saepissime culta, in Persia spontanea, e familia Urticearum, trib. Cannabinearum, insignis: floribus dioicis; masculinis in racemis calyce quinque partito et staminibus quinque; femineis subbinis sessilibus, calyce spathaceo-complicato basi ventricoso; foliis stipulatis oppositis petiolatis digitatis, foliolis lanceolatis grosse serratis; supe-

rioribus foliis sparsis; stipulis interpetiolaribus liberis; caule erecto ramoso scabro; nucula albida bivalvi indehiscenti.

Planta, praesertim feminea, florescens, mensibus Junio et Julio collecta, caule crassiore et radice rejectis.

Essentia Cannabis modo § 15. notato paretur.

Cannabis Indica.

Gunjah; Banghee; Sidhee.

Cannabis Indica Lam. Planta annua Indiae orientalis, e familia Urticearum, trib. Cannabinarum.

Planta florescens vel seminifera sicca, e cinereo viridis, ex Asia adlata, Cannabis sativae habitu aequali, odoris et saporis autem fortioris. A caulibus crassioribus liberetur.

Tinctura Cannabis Indicae paretur modo § 16. notato.

Cantharides.

Spanische Fliegen. Spanish blistering flies. Cantharides.

Lytta vesicatoria Fabr. s. *Meloë vesicatorius* L., insectum annis siccioribus per omnem Europam meridionalem frequens, e familia Coleopterorum. Est alatum, coloris ex aureo viridis in coeruleum tendentis, splendens, molle, circiter 20 millim. longum et 5—7 millim. latum, antennis nigris filiformibus distantibus, odoris virulenti penetrantis. In Fraxinis, Ligustris, Syringis etc. aestate habitat.

Insectum totum siccatum. Mensibus Junio et Julio colligitur.

Tinctura Cantharidum modo § 16. notato paretur.

Capsicum.

Piper Hispanicum; Fructus Capsici annui. Spanischer Pfeffer. Capsicum. Poivre d'Espagne.

Capsicum annum L., planta annua Americae meridionalis, e familia Solanearum.

Fructus semina albida subrotunda compressa fovens, ruber coriaceo-membranaceus nitidus, siccatus conicus, 6 ad 9 centim. longus, a calyce urceolato viridi desecando liberatus.

Tinctura Capsici paretur modo § 16. notato.

Carbo.

Carbo praeparatus. Carbo vegetabilis. Holzkohle. *Charcoal. Charbon de bois.*

Pulvis subtilis nigerrimus parum nitens insipidus, odore carens, e ligno leviori aestuando paratus.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiuntur.

Carbo vegetabilis.

Rp. *Carbonis e ligno leviori, uti Tiliae, Fagi, Betulae, frustula.*

Incendantur et excandescant, donec fumum emittere cessaverint. Dein frustula in lamina frigida collocentur, post refrigerationem a cinere liberentur et tandem in pulverem subtiliorem redacta statim in lagenas bene obturandas ingerantur ac asserventur.

Carbo animalis.

Thierische Kohle. *Animal charcoal. Charbon animal.*

Pulvis e fusco niger, paulum nitens, odoris vix empyreumatici, insipidus, paratus e pelle recente taurina.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiuntur.

Carbo animalis.

Rp. *Pellis taurinae recentis frustulum.*

Inter carbones e ligno ardentes collocetur, donec flammae non amplius appareant. Tum frustulum, quod in carbonem transiit, inter duas laminas lapideas vel porcellaneas prematur, ut candere cesset. In pulverem redactum in lagenulam siccam bene obturandam statim ingeratur et servetur.

Carboneum sulphuratum.

Alcohol Sulphuris; Sulphur carbonatum. Schwefelkohlenstoff; Schwefelalkohol.

Sulphuret of carbon. Sulfure de carbone.

Liquor limpidus, plane volatilis, lucem maxime refringens, odoris paulum ingrati, saporis acris, in Aqua insolubilis, facile in Spiritu vini solubilis, e Carboneo et Sulphure constans, in officinis chemicis destillando Sulphur supra carbones candentes paratus. Pond. spec. 1,270.

Dilutio prima et dilutiones sequentes miscendo cum Spiritu vini rectificatissimo parantur.

Carcinominum.

Carcinominum axillare. Krebsseiter.

Sanies (materia ichorosa) e carcinomate axillae exempta.

Contritiones et dilutiones eodem modo quo Alveolini (Pag. 33) efficiuntur.

Carduus benedictus.

Cardobenedikten. Blessed thistle. Chardon beni.

Cnicus benedictus Gaertn., planta annua Europae calidioris, saepe in hortis culta, e familia Compositarum, trib. Acarnacearum. Insignis est phyllis involucri apice spina pin-nato-ramosa; foliis (amplexicaulibus) sinuato-pinnatifidis denti-culato-spinulosis; capitulis terminalibus bracteis obvallatis.

Planta recens, ante evolutionem florum (mensibus Junio et Julio) collecta, caulibus crassioribus et radice reiectis.

Essentia *Cardui benedicti* paretur modo § 14. notato.

Carduus marianus.

Semen *Cardui Mariae. Mariendistelfamen; Stiefkörner. St. Mary's thistle-seeds. Semence de chardon-marie.*

Silybum marianum Gaertn. s. *Carduus marianus* L., planta biennis Europae calidioris.

Semina sicca, paulum compressa, 0,6 centim. longa, 0,25 centim. lata, pappo piloso caduco coronata, fuscescentia, e nigro striata, nitida, nucleo albo oleoso. Mense Augusto colliguntur.

Essentia *Cardui mariani* ope Spiritus vini diluti modo § 15. notato paretur.

Cariesinum.

Knochenfraßjauche.

Materia purulenta cariei ossium desumpta.

Contritiones et dilutiones eodem modo quo Alveolini (Pag. 33) efficiuntur.

Cascarilla.

Cortex Cascarillae. Kaskaville. Cascarilla bark. Cascarille.

Croton Eluteria Swartz, frutex Americae meridionalis, e familia Euphorbiacearum.

Cortex siccus in segmentis convolutis, 4 ad 6 centim. longis, 2 millim. crassis, ponderosis, epidermide ex albido grisea, interdum nigrescente, plus minusve lichenibus maculata, rugosa, rimis transversalibus brevibus obsessa, fractura aequabili resinosa, saporis acris amari, odoris aromatici.

Tinctura *Cascarillae* paretur ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato.

Castoreum.

Castoreum Moscoviticum s. Sibiricum. Bibergeil. *Castoreum*.

Castor Fiber L., animal Europae et Asiae septentrionalis et meridionalis praesertim ad ripas fluminum et lacuum habitans, e classe Mammalium et e familia Castorinorum s. Palmipedum.

Castoreum venale inest in folliculis, plerumque compressis, glabris, prope genitalia Castorei sitis, continentibus massam e luteo fuscam, membranulis tenuioribus intertextam.

Non nisi Castoreum sic dictum Moscoviticum v. Sibiricum v. Norvegicum v. Bavaricum v. Polonicum ad usum homoeopathicum adhibere licet. Castoreum Americanum s. Canadense s. Anglicum rejiciendum est.

Plerumque contritiones et dilutiones modis § 6. et 10. notatis efficiuntur. Interdum etiam Tinctura potentiatur.

Tinctura Castorei paretur modo § 16. notato.

Causticum.

Neßloff.

Liquor limpidus, coloris expers, saporis acriusculi, parum styptici, odoris debilis, illi lixivii caustici accedens.

Dilutio prima Spiritu vini diluto, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Causticum.

℞p. *Calcariae ustae frustum majus.*

In aquam destillatam per horae sexagesimam partem mergatur, tum in catino collocetur, ut sponte incalescens in pulverem dilabatur.

Hujus pulveris P. quatuor (4)
in mortarium calefactum porcellaneum immissis inter conterendum admisce liquorem, paratum e

Kali bisulphurici fusione exsiccati et

Aquae destillatae fervidae, singularum P. quatuor (4).

Miscelam in cucurbitam vitream, in balneo arenae collocatam,ingere. Alembico vitreo excipuloque adaptatis et juncturis luto farinaceo clausis, fiat destillatio ad siccitatem, excipulum bene refrigerandum. Destillatum, exaequans circiter partes tres, in lagenis bene obturatis servetur. Quantitas pulveris calcarii, quae ad parationem Caustici sumitur, exaequet circiter 58 ad 60 Grammata vel Uncias duas.

Cepa.Zwiebel. *Onion. Oignon.*

Allium Cepa L., planta perennis, in hortis culta, e familia Liliacearum, trib. Asphodelinarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule fistuloso infra medium ventricosoinflato et foliis fistulosis teretibus ventricosis.

Planta tota florens recens. Colligitur aestate.

Essentia Cepae paretur modo § 14. notato.

Ceruminum.

Ceruminum auris. Ohrenschmalz. *Ear-wax. Cire des oreilles; Cérumen.*

Massa vix fluida, viscosa, recens, quae a cryptis sebaceis auris secernitur.

Contritiones et dilutiones modo quo illae Alveolini efficiuntur.

Chamomilla.Kamille. *Camomile. Camomille.*

Matricaria Chamomilla L., planta annua Europae, e familia Compositarum, trib. Anthemidearum. Differt ab aliis speciebus receptaculo conico nudo, intus cavo.

Planta tota florescens, aestate colligenda.

Essentia Chamomillae paretur modo § 15. notato.

Chelidonium.

Chelidonium majus. Schöllkraut. *Greater Calantine. Chélidoine.*

Chelidonium majus L., planta perennis Europae, e familia Papaveracearum. Differt ab aliis plantis ejusdem familiae succo croceo lactescente; foliis tenuibus, subtus glaucis, pinna-
tipartitis, laciniis subrotundis crenato-incisis; floribus luteis; pedunculis umbellatis; radice multicepe ramosa, crassitudinis pollicis, longioribus fibrillis obsessa, extus e fusco rubicunda, intus alba, succo luteo lactescente repleta.

Radix recens, mense Majo collecta.

Essentia Chelidonii paretur modo § 14. notato.

Chenopodium.

Grane Melbe oder Gänsefuß. *Gray goose-foot. Patte d'oie grise.*

Chenopodium glaucum L. s. *Blitum glaucum* Koch, planta annua frequentissima, e familia Chenopodearum. Differt a speciebus aliis sui generis foliis oblongis, obtusis, si-

huato-dentatis, subtus albidis vel e coeruleo albidis, supra e cinereo viridibus; racemis nudis simplicibus glomeratis.

Planta floescens, tota, recens (mensibus Junio ad Septembrem) colligenda, radice resecta.

Essentia Chenopodii paretur modo § 14. notato.

China.

Cortex Chinae regius; Quinquina Calisaga. Königschina. *Yellow or royal bark. Quinquina jaune royal.*

Cinchona Calisaya Weddel., arbor in montibus silvosis Americae meridionalis crescens, e familia Rubiacearum.

Cortex siccus. Cortex convolutus praeferatur. Prostat in frustis simpliciter vel bis convolutis, 10—20 centim. longis, 5—25 millim. latis; substantia corticali 3—8 millim. crassa; superficie epidermidis ex albido cinerea, lichenibus obsita, rimis profundis transversalibus frequentibus sulcata, colore ferrugineo, in rugis praesertim in fusco nigrum vergente; strato corticali extimo saepe e plurimis aliis stratis ferrugineis et nigris composito; strato medio ferrugineo compacto; strato tertio crassissimo densius fibroso, e rufo fusco, intus pallidiore. Cortex est odoris debilis, saporis intense amari.

Tinctura Chinae paretur ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato. Sit coloris e rubro fusci.

Chininum hydrochloricum.

Chinum muriaticum. Chlorwasserstoffsaures Chinin. *Hydrochlorate of Quinia. Hydrochlorate de Quinine.*

Sal in crystallis acicularibus, radiatim dispositis, albissimis, splendoris sericei, in partibus triginta Aquae, nec non in Spiritus vini rectificatissimi partibus tribus solubile, e Chinino, Acido hydrochlorico et Aqua constans ($=\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{H}_2\text{Cl}^2 + 3\text{HO}$).

Dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Chininum phosphoricum.

Phosphorsaures Chinin. *Phosphate of Quinia. Phosphate de Quinine.*

Sal in crystallulis minimis acicularibus albis levibus, splendoris sericei, solubile in Aquae partibus 900, nec non in Spiritus vini rectificatissimi partibus 120, constans e Chinino, Acido phosphorico et Aqua ($=\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{H}_2\text{PO}^5 + 6\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur.

Chininum phosphoricum.

Rp. *Chinini sulphurici (basici)* P. novem (9).

Solve in mixtione parata ex

Aquae destillatae calidae P. centum (100) et

Acidi sulphurici concentrati P. una (1).

Solutioni adhuc calidae una affunde

Natri phosphorici crystallisati P. quindecim (15),

antea in

Aquae destillatae P. sexaginta (60)

solutas. Post agitationem sepone loco frigido. Sedimentum album dein filtri ope separa et solvendo in Aqua fervente et seponendo in crystallia redige, lixivium ultimum rejiciendo.

Chininum sulphuricum.

Schwefelsaures Chinin; Chinin. *Sulphate of Quinia. Sulphate de Quinine.*

Sal in crystallis albissimis splendentibus acicularibus tenuissimis subflexibilibus levibus, in Aquae partibus 740, in Spiritu vini rectificatissimi partibus 80 solubile, e Chinino, Acido sulphurico et Aqua constans ($=\text{Ch}^2\text{SO}^3+8\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 10. notatis efficiuntur.

Chloroformium.

Formylum chloridatum. Chloroformylum. Chloroform. *Chloroform. Chloroforme.*

Liquor neuter, coloris expers, limpidus, volatilis, difficillime inflammabilis, odoris peculiaris grati aetherei, saporis aetherei dulciusculi, parce in Aqua, facile in Spiritu vini solubilis. Pond. spec. 1,49—1,50.

Dilutiones Spiritus vini rectificatissimi efficiuntur.

Chlorum.

Aqua s. Liquor Chlori; Aqua oxymuriatica s. chlorata. Chlormasser. *Solution of Chlorine. Chlore liquide.*

Liquor limpidus e viridi flavescens, odoris ingrati suffocantis, chartam exploratoriam coeruleam, quae in liquorem submergitur, statim decolorans, ex Aqua et Chloro constans ($\text{Cl}+982\text{Aq.}$). Servetur loco frigido in lagena nigra et epistomio vitreo clausa. Paretur Gas Chlori introducendo in Aquam, donec haec illo saturata sit.

Dilutiones omnes Aquae ope et saepius recens efficiuntur.

Cholelithinum.

Cholelithus. Gallenstein. *Gallstone. Pierre de fiel.*

Lapides s. calculi cystidis felleae, coloris et formae variae, macerando in Aqua frigida per dies duos purgati, tum loco tepido siccati.

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. efficiuntur.

Cicuta virosa.

Cicuta aquatica; Cicutaria. Wassertiefenling. *Water hemlock. Ciguë aquatique.*

Cicuta virosa L., planta perennis Europae, in paludibus et in fossis obvia, e familia Umbelliferarum. Differt ab aliis plantis similibus: involucellis polyphyllis; foliis glabris tripinnatisectis, laciniis serratis; caule glabro cavo; radice crassa, e flavesciente alba, cava, septis transversis loculosa; fibris verticillatis filiformibus.

Radix recens, ante florescentiam (mense Junio) collecta.

Essentia Cicutae virosae paretur modo § 14. notato.

Cimex lectularius.

Bettwanze. *Bed-bug. Punaise.*

Cimex lectularius s. Acanthia lectularia, insectum hemipterum in lectis frequentissimum, e familia Cimicidium, insigne: corpore e ferrugineo fusco, juniorum flavescente; defectu alarum, odore proprio ingrato.

Insectum vivens e ferrugineo fuscum.

Tinctura Cimicis ope Spiritus vini rectificatissimi ex insecto contundato modo § 16. notato paretur.

Contritiones, si poscuntur, et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Cina.

Semen Cinae s. Santonici. Zitterwerfamen. *Wormseed. Barbotine;*

Semen-Contra.

Artemisia Contra Vahl, Artemisia Lieberi Besser, planta Palaestinae et Syriae, e familia Compositarum.

Capitula (vel flosculi, minime semina) sicca parva clausa oblonga, circiter 0,2 centim. longa, squamis imbricatis involucri, e flavo viridia, glabra, a fragmentis subvillosis ramulorum parvulorum liberata. Semen Cinae Levanticum, Aleppicum vel Alexandrinum, in mercatura sic dictum, praefarendum est.

Tinctura Cinae paretur modo § 16. notato.

Cinchoninum sulphuricum.

Schwefelsaures Cinchonin. *Sulphate of Cinchonine. Sulphate de Cinchonine.*

Praeparatum e Cortice Chinae fusco, exhibens crystallam prismaticam, coloris expertia, dura, nitoris fere sericei, saporis amari. Constat e Cinchonino, Acido sulphurico et Aqua ($= \text{C}_{12}\text{SO}_3 + 3\text{HO}$). Solvitur Aquae partibus 90, et Spiritus vini rectificatissimi partibus septem.

Dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Cinnamomum.

Cinnamomum acutum; Cortex Cinnamomi (acuti s. Ceylonici). *Echte Zimmtb. Cinnamon. Cannelle.*

Cinnamomum Ceylonicum Breyn s. Laurus Cinnamomum L., arbor Indiae orientalis, e familia Laurinearum.

Liber vel cortex internus siccus ramorum, pluries convolutus, tenuissimus, tubulos exhibens, contextus fractura e fibris densis conspicuis, coloris ex aureo fusciscentis, odoris fragrantis grati, saporis dulciusculo-aromatici calidi paulum adstringentis. Differt a Cassia cinnamomea et fibris confertis nec sparsis et minore crassitie et colore minus fusco.

Tinctura Cinnamomi ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato paretur. Sit coloris e rubro fuscis.

Cistus.

Cistus Canadensis; Chamaecistus s. Helianthemus. *Gemeines Cistenröslein. Rocks-rose. Ciste.*

Helianthemum vulgare Gaertn. s. Cistus Helianthemum L., fruticulus Europae meridionalis, e familia Cistinearum. Differt ab aliis speciebus sui generis caule procumbente; foliis subrotundo-lanceolatis vel lineari-oblongis, supra pilosis, subtus incanis; stipulis linearibus petiolo longioribus; stylo in basi reflexo, bis vel ter longiore quam germen; racemo laxo cum floribus luteis.

Planta tota florescens (mensibus Majo, Junio et Julio) collecta, a radice liberata.

Essentia Cisti s. Helianthemi paretur modo § 15. notato.

Citri succus.

Succus Citri. Citronensaft. *Citron-juice. Jus de citron.*

Succus recens expressus fructuum Citri medicae Limonium (Risso) decorticatarum.

Clematis.

Herba Clematidis erectae s. Flammulae Jovis. Brennkraut; Brennwaßbrebe.

Clematis erecta L., planta perennis Europae australis et meridionalis, saepe in hortis culta, e familia Ranunculacearum. Differt a plantis similibus: caule non scandente (erecto); foliis oppositis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis integris; floribus albis quadripetalis, paniculatis.

Planta tota floescens recens (aestate) collecta.

Essentia Clematidis paretur modo § 15. notato.

Coca.

Sofa. Coca.

Erythroxylon Coca Lam., planta frutescens Americae meridionalis, e familia Erythroxylearum.

Folia siccata membranacea ovato-lanceolata, integra, 3—4 centim. longa, 2—2,5 centim. lata, costis plerumque tribus, saporis herbacei subamariusculi dulciusculi, parum adstringentis.

Tinctura Coccae paretur modo § 16. notato.

Coccionella septempunctata.

Sonnenkäfer; Marienkäfer. *Lady-cow; Lady bird. Vache à Dieu; Bête de la vierge.*

Coccionella s. Chrysomela septempunctata L., insectum coleopterum Europae, e familia Coccionellideorum, insigne corpore hemisphaerico; abdomine plano; coleoptris rubris, punctis nigris septem notatis.

Insecta recens capta.

Tinctura Coccionellae septempunctatae ex insecto vivente in mortario trito paretur modo § 16. notato.

Cocculus.

Semen Cocculi (Indici). Rostelskörner. *India berries. Coques du Levant.*

Cocculus Plukenetii D. Cand. s. Menispermum Cocculus Willd., frutex scandens Malabaricae et Celebis, e familia Menispermearum.

Fructus siccus sphaeroideo-reniformes, ad pisi majoris vel baccae Lauri siccae magnitudinem, coloris e griseo nigrescentis, odoris nullius, saporis nauseosi amari. Fructus constat ex amphispermio fragili insipido et testa albida fere insipida nucleum oleosum amarum fovente. Fructus cassi veteres rejiciendi sunt.

Tinctura Cocculi e fructibus nucleo praeditis modo § 16. notato paretur. Tinctura frigore crystallula Stearini demittere solet, quae filtrando separanda sunt.

Coccus Cacti.

Cochenella; Coccionella; Grana Coccinellae. *Koschenille. Cochineal. Cochenille.*

Coccus Cacti coccinelliferi L. et aliorum Cactorum, insectum femella homoptera, e familia Gallinsectorum, plantas illas Americae meridionalis inhabitans.

Insecta siccata, referentia grana parva atro-purpurea vel pulvere quasi albido inspersa, striis transversis notatis, in pulverem trita laete coccinea.

Tinctura Cocci Cacti s. Coccionellae paretur modo § 16. notato.

Coenurinum ovium.

Queesenzurm; Gehirnblasenzurm; Drehwurm. Hydatid in the brain of the sheeps. Hydatide cérébrale.

Hydatis seu vesica in cerebri ventriculo ovium saepe habitans, magnitudine ovi columbini, fovens vermiculos multos rugis transversis et cauda biseta, vesicae adnatos. Vermiculus a Rudolpho nominatur Coenurus cerebrialis.

Hydatis tota cum vermiculis.

Contritiones et dilutiones modo ex hydate conquassata quo illae Ascaridini efficiuntur.

Coffea.

Semina s. Fabae Coffeae; Cahua; Chasua. *Raffee; Mokka-Raffe. Mocca-Coffee-berry. Mocca.*

Coffea Arabica L. frutex Arabiae, e familia Rubiacearum.

Semina subrotunda, interdum paulum compressa, sulco exarata, flavida vel e viridi flavescentia, ex Arabia advecta, quae Coffea de Mocca vel Levantica nominantur.

Tinctura Coffeae e seminibus calore modico exsiccatis pulveratisque et ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato paretur. Colatura per hebdomadem seponatur, tum filtratur.

Colchicum.

Herbstzeitlose. Daisy; Meadow-saffran. Colchique; Tue-chien.

Colchicum autumnale L., planta perennis in pratis humidis Europae frequens, e familia Melanthacearum.

Bulbus (seu radix) recens solidus carnosus, hinc convexus

inde planus, extus tunica fusca coriacea, intus tenui ochracea vestitus, mense Augusto collectus, a bulbo adhaerente spurio liberatus.

Essentia Colchici (radicis s. bulbi) paretur modo § 14. notato.

Semina siccata subglobosa, magnitudine grani Panici miliaeci, e fusco lutea (recentia albida), dura, umbilico prominente praedita, odoris nullius, saporis acris. Pallida et rugosa rejicienda sunt. Mense Junio colliguntur.

Tinctura Colchici (seminum) e semine pulverato ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato paretur.

Nota. Nisi expressis verbis Essentia vel Tinctura Colchici radicis vel bulbi postulatur, semper Tinctura Colchici seminum dispensanda est.

Colocynthis.

Coloquinte. Coloquintida. Coloquinte.

Cucumis Colocynthis L., planta annua Africae, in Europa australi saepe culta.

Fructus (pepo) siccatus, a cortice exteriori mundatus, parenchymate (e flavesciente) albo fungoso leviores sicco amarissimo.

Tinctura Colocynthidis e parenchymate a seminibus plane liberato, tum minutissime inciso, modo § 16. notato paretur.

Columbo.

Columbowurzel. Colombo-root. Colombo d'Afrique.

Cocculus palmatus Cand. s. Menispermium palmatum Lamark, planta perennis in silvis ad littora Africae orientalis, e familia Menispermearum.

Radix sicca, saporis amari, in taleolis transversis orbicularibus, cortice exteriori rugoso e griseo fusco, interiore flavo vel e viridi luteo; annulo lignoso, linea nigra finito et medullam spongiosam farinosam e flavo viridem fovente. (Radix vera Tinctura Jodi conspersa colorem saturate coeruleum induit).

Tinctura Columbo ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato paretur.

Condylominum.

Condylom; Condylome.

Condyloma totum, ope cultri vel forficulae recens a corpore humano discissum.

Contritio prima e massa condylomatis conterendo cum Sac-

charo lactis ita paretur, ut primum massae pars una cum Sacchari lactis partibus decem l. a. conteratur, dein ad efficiendam contritionem secundam inter terendum quantitas sufficiens Sacchari lactis (partes 90) paulatim addas. Post contritionem sextam diluendi modo § 11. notato potentiare pergatur.

Condylominum penis canum (s. Balanorrhinum cum Sycosi?) ad medicinam veterinariam adhibetur.

Conium.

Cicuta. Schierling; Fleckenschierling. Hemlock. Ciguë.

Conium maculatum L., planta biennis Germaniae, e familia Umbelliferarum. Differt ab aliis plantis umbellatis: glabritie perfecta; caule fistuloso tereti substriato, virescente aut saepius (cum ramis majoribus) purpureis vel fuscis maculis notato; foliis supra saturate viridibus et subnitidis, subtus pallidioribus opacis, supradecompositis, laciniis inciso-serratis, ultimis ovalibus mucronulatis; umbella plana; margine calicis obsoleto; radice fusiformi alba; odore murino.

Planta florescens recens collecta (mensibus Junio et Julio), radice resecta.

Essentia Conii modo § 14. notato paretur.

Convolvulus.

Convolvulus arvensis. Ackerwinde. Corn-bind. Petit liseron; Liset.

Convolvulus arvensis L., planta perennis Europae, in agris frequens, e familia Convolvulacearum, trib. Genuinarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule prostrato vel subvolubili; foliis hastatis, auriculis acutis; pedunculis axillaribus folia superantibus; bracteis duabus lanceolatis linearibus a flore remotis; floribus roseis, saepe albis, extus striis quinque rubris.

Planta tota florescens recens. Colligitur aestate.

Essentia Convolvuli modo § 14. notato paretur.

Copaiva.

Balsamum Copaivae. Copaivabalsam. Balsam of Copaiva. Beaume de Copahou.

Copaiferae variae species, uti *Copaifera multijuga*, *Jaquini*, *oblongifolia*, arbores Americae meridionalis, e familia Leguminosarum.

Liquor oleoso-resinosus pellucidus limpidus flavus, in Spi-

ritu vini rectificatissimo solubilis, odoris singularis penetrantis, saporis amaricantis subacris.

Dilutiones ope Spiritus vini rectificatissimi efficiuntur.

Corallium.

Corallia rubra. Rothe Koralle. Red coral. Corail rouge.

Corallium rubrum Lamark s. *Iris nobilis* L., zoophytum Maris Mediterranei, e familia Corticosorum. Differt ab aliis speciebus sui generis: stirpe aequali calcarea rubra, oblique substriata; ramis vagis; cortice carnoso molli.

Fragmenta stirpium, crassitie pennae columbinae, colore sanguineo, pruina albida calcarea adspersa, odore nullo, quae ad usum macerando in Aqua destillata et siccando purganda sunt.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Cornus circinata.

Rundblättriger Hartriegel.

Cornus circinata L., arbor Americae borealis, e familia Cornacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: ramis verrucosis; foliis ovalibus acuminatis subtus albidis pilis appressis.

Cortex siccatus, epidermide fusca, saporis amaro-aromatici adstringentis.

Tinctura Corni circinatae modo § 16. notato paretur.

Coryzinum.

Coryzinum hominum. Schnupfenausfluß. Mucus. Mucosité catharrale.

Liquor albidus membrana mucosa narium catarrho (coryza) affecta secretus.

Contritiones et dilutiones modo quo Alveolini (Pag. 33) efficiuntur.

Coryzinum Equorum

in veterinaria medicina adhibetur. Est materia mucosa e naribus equorum, coryza affectorum.

Cotyledon.

Umbilicus Veneris. Nabeltraut; Venusnabel. (Venus's) navel-wort.

Nombril de Venus.

Cotyliphyllum Umbilicus Link s. *Cotyledon Umbilicus Veneris* L., planta perennis Angliae et Europae me-

ridionalis, e familia Crassulacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: radice tuberosa; foliis inferioribus peltatis subrotundis concavis repando-crenatis; floribus pendulis albidis.

Planta tota recens (mense Junio) collecta.

Essentia Cotyledonis paretur modo § 14. notato.

Crabrinum.

Gornisse. Hornet. Frelon.

Vespa Crabro L., insectum hymenopterum, e familia Vespariarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: annulis nigris et luteis; thorace nigro, antice rufo, immaculato; longitudine centim. 2,5.

Insectum totum vivum.

Contritiones et dilutiones modo quo illae Apisini (Pag. 38) efficiuntur.

Tinctura Crabronis s. Crabrinum paretur aequali modo quo Tinctura Apis (Pag. 38).

Crocus.

Safran. Saffron. Safran.

Crocus stavius L., planta perennis Europae meridionalis, in variis terris culta, e familia Iridearum.

Stigmata siccata, in tres lacinias superne latiores fissa, e coccineo aurantiaca, 3—4 centim. longa, stylo flavido plerumque adhaerente, odoris subnarcotici aromatici.

Tinctura Croci modo § 16. notato ope Spiritus vini diluti paretur.

Crotalinum.

Crotalus. Klapperschlängengift.

Crotalus horridus, anguis Americae, e familia Viperarum, insignis: crepitaculo teminali caudae; colore e griseo fusco; maculis rhomboidalibus e nigro fuscis, margine e flavido albo circumdatis et puncto e flavido albo notatis: abdomine e flavido albo.

Mucus recens venenosus dentium venenatorum. Potentia-
tur aequali modo quo Alveolinum.

Croton.

Grana Tiglli; Tyglum; Tiglium; Semen Cataputiae minoris. *Purgirförner. Molucca-grains. Noix purgatives; Graines de Tilly.*

Croton Tiglium L. et Croton Pavana Hamilton, frutices Asiae meridionalis, e familia Euphorbiacearum.

Semina oblongo-ovalia, fabae minoris magnitudine, subterragona, utrinque obtusa, integumento fragili, sordide e cinereo fusco, maculato, nucleo albido vel subflavescente, oleoso. Sint inodora, saporis autem acerrimi urentis.

Tinctura Crotonis paretur modo § 16. notato.

Oleum Crotonis, e seminibus expressum, est pingue, flavum vel e flavo fuscum, saporis acerrimi, in Spiritu vini rectificatissimi partibus quadraginta solubile.

Dilutio potentiata prima Spiritu vini absoluto, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Cubeba.

Piper caudatum. Kubeben. Cubebs; Teiled pepper. Cubèbes.

Piper Cubeba L. s. Cubeba officinalis Miquel, frutex Javae et Indiae orientalis, e familia Piperitarum.

Baccae siccatae subglobosae, ad magnitudinem pisi minoris, pedicellatae, reticulato-rugosae, e cinereo nigrae, semine solitario, saporis fervidi aromatici amaricantis, denique refrigerantis, odoris aromatici.

Tinctura Cubebae paretur modo § 16. notato.

Cuprum.

Rupfer. Copper. Cuivre.

Metallum divisum praecipitando paratum. Sit pulvis subtilissimus, e rufo fuscus vel cupreo-fuscus, terendo ope chalybis politorii nitorem metallicum exhibens.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Cuprum praecipitatum.

Rp. *Cupri sulphurici crystallisati P. duodecim (12).*

Solve in

Aquae destillatae P. sexaginta (60).

Liquor filtratus, Zinci puri frustis (circiter P. 15) immissis, coquatur, donec liquoris portiuncula filtrata colorem tantum palidum coeruleum exhibeat. Tum, frustis Zinci exemptis, praecipitatum aquam affundendo et decantando elotum digere per aliquot horas in mixtione, parata ex

Acidi sulphurici concentrati P. duabus (2),

Aquae destillatae P. triginta (30).

Tunc praecipitatum primum perfecte Aqua, dein Spiritu vini

abluere, inter strages chartae bibulae premendo ab humore libera, tandem calore gradus 70 thermom. Celsiusi non excedente quam celerrime sicca. Pulvis in lagenulas plane siccas et optime obturandas ingeratur et servetur.

Cuprum aceticum.

Aerugo crystallisata. Effigiales Kupferoxyd. *Acetate of copper.*
Deuto-acétate de cuivre.

Sal in crystallis prismaticis, e coeruleo viridibus, constans e Cupro oxydato, Acido acetico et Aqua ($=\text{CuO}, \bar{\text{A}} + \text{HO}$), solubile in Aquae partibus 14, nec non in partibus 20 Spiritus vini rectificatissimi. Crystalla fatiscencia et pulvere pallide viridi oblecta rejicienda sunt.

Dilutio prima potentiata solvendo partem unam salis in Aquae spirituosae partibus undeviginti, dilutio secunda commiscendo partem unam dilutionis primae cum partibus quatuor Spiritus vini rectificatissimi efficiuntur.

Cuprum aceticum.

Rp. *Aeruginis pulveratae* P. quatuor (4),
Aquae destillatae fervidae P. viginti (20).

In cucurbitam vitream immissis instilla

Acidi acetici diluti q. s.,

donec Aerugo soluta sit. Liqueor adhuc fervidus filtratur et seponendo loco frigido in crystallis redigatur. E liquore a crystallis defuso evaporando seponendoque nonnulla crystallis evadunt. Crystalla collecta inter strages chartae bibulae premendo ab humore adhaerente liberentur et statim in lagenis obturatis asserventur.

Cuprum arsenicosum.

Arsenigsaures Kupferoxyd; Scheel'sches Grün. *Arsenite of copper.*
Arsénite de cuivre.

Pulvis viridis, in Ammono caustico liquido plane solubilis, e Cupro oxydato et Acido arsenicoso et Aqua constans ($=2\text{CuO}, \text{AsO}_3 + \text{CuO} + 3\text{HO}?$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Cuprum arsenicosum.

Rp. *Arsenici albi subtilissime pulverati* P. unam (1),
Kali caustici sicci P. duas (2).

In mortario porcellaneo bene contritae in cucurbitam vitream ingerantur, tum addantur

Aquae destillatae P. sex (6).

Calore balnei aquae digere per horas duodecim, saepius agitando, dein per horam coque, aquam avolantem restituendo, et sepone. Liquori Aquae volumine duplo diluto et filtrato instilla solutionem filtratam, paratam e

Cupri sulphurici crystallisati P. duabus (2) et

Aquae destillatae P. decem (10),

quamdiu inde praecipitatum exoritur. Sepone per aliquot horas loco calido, tandem praecipitatum aqua ablue et inter strages chartae bibulae calore gradus 40 thermom. Celsiusi non excedente sicca. Caute serva.

Cuprum carbonicum.

Rohlenſaures Kupferoxyd. Carbonate of copper. Carbonate de cuivre.

Pulvis e viridi coeruleus, levis, in Ammono caustico solubilis, e Cupro oxydato, Acido carbonico et Aqua constans ($=2\text{CuO}, \text{CO}_2 + \text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Cuprum carbonicum.

Rp. *Cupri sulphurici crystallisati* P. decem (10).

Solve in

Aquae destillatae P. centum (100).

Liquori filtrato calefacto inter agitationem admisce

Natri carbonici crystallisati P. duodecim (12),

antea in

Aquae destillatae P. sexaginta (60)

solutas. Praecipitatum inde ortum aqua eluatur et loco tepido siccetur.

Cuprum sulphuricum.

Vitriolum Cupri. Schwefelsaures Kupferoxyd. Sulphate of copper.

Sulphate de cuivre.

Crystalla rhomboideo-prismatica diaphana coerulea splendentia, in Aquae partibus quatuor, nec in Spiritu vini solubilia, e Cupro oxydato, Acido sulphurico et Aqua constantia ($=\text{CuO}, \text{SO}_3 + 5\text{HO}$). Crystalla opaca vel partim dilapsa rejicienda sunt.



Dilutio prima ope Aquae, secunda ope Aquae spirituosae etc. modo § 9. notato efficiuntur.

Cyclamen.

Arthanita. Sanbrod. Sow-bread. Pain de pourcéau.

Cyclamen Europaeum L., planta perennis in silvis arborum frondentium et regionibus montanis Europae meridionalis frequens, e familia Primulacearum.

Radix (rhizoma) tuberascens subglobosa discoidea, extus fusca, intus alba, subtus multis fibris obsessa, recens autumnano anni secundi collecta.

Essentia Cyclaminis paretur modo § 15. notato.

Cyprinus.

Barbus; (Ichthyotoxicum). Barbe. Barbel; Barber. Barbeau.

Cyprinus Barbus L., piscis flumina Asiae et Europae inhabitans, e familia Leptocephalorum (Cyprinoideorum) ordinis Gasteropterygiorum, insignis: capite longiore fastigato; cirris carnosus longioribus juxta os; pinna dorsali radio secundo utrinque serrato; corpore supra olivaceo-viridi, infra albo.

Ova recentia, mense Majo e pisce capto exenta.

Essentia Cyprini ex ovis contusis modo § 15. notato paretur.

Contritiones, si poscuntur, ex ovis recentibus modo § 6. et 11. notatis efficiuntur.

Dakryadaesyringinum.

Dakryosyringinum. Thränenfistelschleim. Mucus of weeping fistula. Mucosité de la fistule lacrymale.

Materia mucosa e fistula lacrymali (dakryosyringe) exstillans.

Nota. Medicus Lux Dakryadaesyringinum externum et internum distinguit.

Contritiones et dilutiones modo quo Alveolini efficiuntur.

Daphne Indica.

Daphne Indica L., planta frutescens Sinae, e familia Thymelaeaeum. Differt ab aliis speciebus sui generis: capitulo florifero terminali pedunculato; foliis oppositis oblongo-ovatis glabris; odore gratissimo.

Flores et folia recens collecta.

Essentia Daphnis Indicae paretur modo § 15. notato.



Dictamnus.

Fraxinella. Diptam. *White dittanny. Diptame blanc.*

Dictamnus albus L., planta perennis Europae meridionalis, saepe in hortis culta, e familia Rutacearum. Differt ab aliis plantis ejusdem familiae: staminibus cum pistillo declinatis; foliis impari-pinnatis; racemo terminali; radice alba crassitudine pennae ad illam digiti minoris, longa, plus minusve flexuosa, carnosa, media parte lignosa, saporis subacris amariuscule, odoris hircosi.

Radix inter florescentiam plantae (mensibus Majo, Junio, Julio) recens collecta, a parte lignosa crassiore liberata.

Essentia Dictamni modo § 15. notato paretur.

Digitalis.

Fingerhut. *Fox-glove. Digitale.*

Digitalis purpurea L., planta biennis silvestris montana Germaniae et Helvetiae, e familia Personatarum, trib. Scrophularinarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis oblongis vel ovato-lanceolatis, in petiolum plus minusve attenuatis, crenatis, rugosis, supra pubescentibus, subtus tomentosis; laciniis calycis ovalibus, breviter acuminatis; corolla purpurea, intus maculis saturate purpureis albo-marginatis.

Folia a plantis florescentibus in regionibus montosis crescentibus (non in horto cultis) mense Junio recens collecta.

Essentia Digitalis paretur modo § 14. notato.

Drosera.

Rorella. Ros solis. Sonnenhaan. *Sundew. Rorelle.*

Drosera rotundifolia L., planta annua, frequens in paludosis locis Europae (septentrionalis), e familia Droseracearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis orbiculatis, scapis erectis folia triplo superantibus.

Planta tota florescens recens (mensibus Julio et Augusto) collecta.

Essentia Droserae paretur modo § 15. notato.

Dulcamara.

Solanum lignosum. Bitterstijß. *Bitter-sweet; Night-shade. Douce-amère.*

Solanum Dulcamara L., frutex scandens Europae, locis humidis paludosisque ad rivulos frequens, e familia Solanearum.

Differt ab aliis speciebus sui generis: caule fruticoso flexuoso, foliis cordato-ovatis integerrimis (superioribus saepe hastatis).

Caules et rami recentes, ad calamum scriptorium crassi, subangulati, (mensibus Junio, Julio, Augusto collecti). Caules crassiores lignosi rejiciantur.

Essentia Dulcamarae modo § 15. notato paretur.

Dysenterinum.

Materia mucosa in dysenteria (Ruhr) per anum secreta. Contritiones et dilutiones modo quo Alveolini efficiuntur.

Elaterium.

Momordica. Eselsgurke; Springgurke. *Squirting cucumber.*
Concombre sauvage.

Momordica Elaterium L., planta Europae meridionalis, saepe in hortis culta, e familia Cucurbitacearum. Differt ab aliis plantis familiae ejusdem: caule nano, cirrhus non ferente; foliis triangulari-cordatis obtusis dentatis; fructibus oblongis, verruculoso-muriaticis; fructu in basi elastice dissiliente.

Fructus (pepones) fere maturi recentes, (mensibus Augusto et Septembri collecti).

Essentia Elaterii paretur modo § 14. notato.

Empyeminum.

Lungengeschwürreiter.

Materia purulenta vomicarum pulmonum. Potentiatur uti Alveolinum (Pag. 33).

Enteropurinum.

Enterohelcosinum.

Pus ichorosum in enterohelcosi ex alvo secretum. Potentiatur uti Alveolinum (Pag. 33).

Enterosyringinum.

Fistula ani. Mastdarmfistel. *Fistula of the anus. Fistule du boyau-culter.*

Potentiatur uti Condylominum (Pag. 33).

Eugenia.

Wilde Jambusenmyrte. *Jamrose.*

Eugenia Jambos L. s. *Jambosa vulgaris* Candolle, arbor sempervirens Indiae orientalis, saepe in regionibus calidis

culta, e familia Myrtacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: fructu monospermo vel dispermo, tecto calyce ampliato et baccato, odoris rosacei.

Semina matura subrotunda tota recentia.

Tinctura Eugeniae e seminibus ad pulvem contusis paratur modo § 16. notato.

Nota. Quia fructus in Europa vix maturescunt, Tinctura in regionibus patriis arboris paratur.

Euphorbium.

Gummiresina Euphorbii. *Euphorbium. Euphorbium. Euphorbe.*

Euphorbia officinarum L., Euphorbia Canariensis L., Euphorbia antiquorum L., plantae perennes Africae meridionalis.

Succus lacteus plantarum illarum sauciatarum, in aëre induratus, ex Africa allatus, in frustulis difformibus, sordide subflavis vel e cinereo albidis, fragilibus, spinarum rudimenta ambientibus aut horum loco foraminulis praeditis. Inter pulverationem sternutationem nimiam excitat.

Tinctura Euphorbii paratur modo § 16. notato. Frustulorum Euphorbii lucidorum pars una in mortarium ingeratur et Spiritus vini paulo conspergendo ad massam pultiformem redigatur, cui in cucurbitam immissae addatur Spiritus vini rectificatissimi tantum, quantum ad explendas partes undecim requiritur.

Euphrasia.

Augentrost. Eyebright; Euphrasy. Euphrase.

Euphrasia officinalis L., planta annua Europae, e familia Personatarum, trib. Rhinanthacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis ovatis profunde serratis et floribus axillaribus.

Planta tota florescens recens (mense Julio collecta), a radice liberata. Planta in locis sabulosis crescens, insignis floribus coerulescentibus, calycibus foliisque glabriusculis (Euphrasia officinalis parviflora Kunth), praeferenda est.

Essentia Euphrasiae paratur modo § 15. notato.

Evonymus.

Fructus Tetragoniae. *Pfaffenhüttchen. Spillbaum. Spindlebush; Wahoo. Fusain; (Bonnet de prêtre).*

Evonymus Europaeus L., frutex Europae, e familia Celastrinearum. Differt ab aliis plantis ejusdem familiae: ramis

tetragonis; floribus virentibus; capsulis coccineis subquadrilobis; arillo aurantiaco totum semen includente.

Fructus (capsulae cum seminibus) rubescentes vel maturuscentes. Mense Augusto vel Septembri colliguntur.

Essentia Evonymi paretur modo § 15. notato.

Ferrum.

Mars. Eisen. Iron. Fer.

Metallum purum ope limae in scobem et terendo in mortario ferreo in pulverem subtilissimum redactum, vel ferrum ex Oxydo ferrico Hydrogenio reductum, quod praeferendum est. Sit ab Ferro oxydato plane liberum. Servetur in lagenulis siccis, bene obturatis.

Contritiones in mortario calefacto et ope Sacchari lactis bene sicci parentur. Contritiones et dilutiones modis §§ 6 et 11 notatis efficiuntur.

Ferrum Hydrogenio reductum.

Rp. *Ferri sesquichlorati liquidi q. v.*

Dilue

Aquae destillatae quantitate decemplici.

Liquori admisce inter agitationem

Ammoni caustici liquidi

quantum ad perfectam praecipitationem Ferri oxydati requiritur. Ammonum paulum praevaleat. Praecipitatum in linteo collige, Aqua destillata perfecte elue, modico calore sicca et tandem conterendo in pulverem redige.

Hoc praecipitatum pulveratum et siccum in tubum amplum ferreum vel pilam cavam ferream tubulatamingere et inter inducendum

Gas Hydrogenii siccum

in tubum vel pilam leniter candefiat, quamdiu vapores aquosi excedunt.

Apparatus totus constet e lagena bitubulata, quae Zincum aut Ferrum filatum vel in clavulis continet et in quam Acidum sulphuricum dilutum paulatim infundatur, ut gas Hydrogenii continenter evolvatur. Haec lagena sit ope tubi curvati cum lagena lavatoria, quae Acidum sulphuricum concentratum ab Arseno liberum continet, eodem modo conjuncta, ut gas Hydrogenii evolutum per Acidum sulphuricum transire cogatur et hoc

modo siccetur. Lagenae lavatoria sit ope tubi vitrei cum illo tubo ferreo vel pila cava, Ferrum oxydatum continente, conjuncta. Tubo vel pilae porro tubus vitreus angustior longior, qui gasa superflua et vapores aquosos abducat, insertus sit. Juncturae optime claudantur ope epistomiorum suberinorum et vesicae madefactae, in tubo ferreo (vel pila) autem ope epistomii ferrei. Tubus ferreus (vel pila) Ferro oxydato circiter ad dimidium suae capacitatis impletus sit. Etiam observandum est, ut, candefactione tubi ferrei (vel pilae) finita, tamdiu Gas Hydrogenii transducere pergat, donec tubus plane refrigeratus sit. Tum Ferrum reductum exime et statim in lagenas bene obturandas siccas immitte.

Ferrum aceticum.

Effigisantes Eisenoxyd. Acetate of iron. Acétate de fer.

Liquor limpidus, saturate e rubro fuscus, saporis adstringentis, odoris grati aciduli, ponderis specifici 1,140 ad 1,142, e Ferro oxydato, Acido acetico et Aqua ($=\text{Fe}^2\text{O}^3, \bar{\text{A}}^2 + \text{HO} + 52\text{HO}$) constans.

Tinctura Ferri acetici paretur miscendo partem unam liquoris cum parte una et dimidia Spiritus vini diluti.

Nota. Dilutiones Tincturae Ferri acetici semper recens parentur. Nonnulli medici praeceperunt, ut Ferrum aceticum liquidum leni calore ad siccum redigeretur et residuum siccum ad contritiones adhiberetur. Operatio exsiccandi aut leni calore aut collocando supra Acidum sulphuricum concentratum legibus chemicis repugnat, quia eo fere omnis Acetas ferricus inter amittendum Acidum aceticum decomponitur. Residuum plerumque est $2\text{Fe}^2\text{O}^3 + \bar{\text{A}} + 3\text{HO}$. Tinctura Ferri acetici, quae sedimentum habet, rejicienda est.

Ferrum aceticum (liquidum).

Rp. *Acidi nitrici (pond. spec. 1,2) P. duodecim (12).*

In cucurbitam vitream amplam, collo longiore instructam, immisiss et paulum calefactis sensim injice

Ferri puri P. unam (1).

Solutione peracta admisceantur

Aquae destillatae P. centum et quadraginta quatuor (144).

Tum liquori filtrato inter agitationem affunde

Ammoni caustici liquidi novem P. (9)

vel quantum requiritur, ut Ammonum praevaleat. Praecipitatum inde exortum aqua perfecte eluatur et ope preli, quantum fieri potest, ab humore adhaerente liberetur.

Partibus novem illius praecipitati in lagenam immissis affundantur partes quindecim

Acidi acetici diluti,

cujus partes 100 continent Acidi acetici anhydri partes 25. Seponere loco frigido saepius agitando, donec solutio facta sit. Liquorem filtratum in lagenis repletis obturatis loco frigido servare.

Ferrum carbonicum.

Ferrum oxydatum fuscum; Crocus Martis aperitivus; (Ferrum hydricum.) *Rochlenfaures Eisenoxydhydr.* *Souscarbonate de fer.*

Pulvis subtilissimus e nigro fuscus, Acido hydrochlorico affuso effervescens, nec Spiritu vini, neque Aqua solubilis, constans e Ferro carbonico oxydulato, Ferro oxydato et Aqua.

Contritiones et dilutiones parentur modis §§ 6. et 11. notatis.

Ferrum carbonicum.

Rp. *Natri bicarbonici* P. duas (2).

Solve agitando in

Aquae destillatae tepidae P. triginta (30).

Liquori filtrato, in lagenam capacitatis partium circiter 60 immisso, paulatim instilla solutionem limpidam, paratam e

Ferri sulphurici oxydulati crystallisati P. tribus (3) et

Aquae destillatae P. duodecim (12),

ita ut Acidum carbonicum inde vehementer evolutum partem vacuum lagenae impleat. Post sedimentationem liquor supernatans decanthando removeatur et lagena aqua tepida iterum repleatur. Praecipitatum hoc modo decanthando et saepius affundendo aquam clotum in linteo colligatur et ope preli ab humore adhaerente liberetur. Residuum ex pressione in frustula minora diffractum in vesica mundata involvatur et loco sicco tamdiu seponatur, donec praecipitatum siccum appareat, quod contritum in lagenulas bene obturandas statim ingeratur et asservetur.

Ferrum chloratum.

Ferrum muriaticum oxydulatum. *Eisenchlorür.* *Chloride of iron.*
Chlorure de fer.

Liquor limpidus, pallide viridis, saporis adstringentis, ponderis specifici 1,097, constans e parte una Ferri chlorati siccii (FeCl) et partibus novem Aquae. Servetur in lagenulis plane repletis et optime obturatis.

Liquor est dilutio potentiata prima Ferri chlorati.

Dilutio secunda et dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Ferrum chloratum liquidum.

(Dilutio prima potentiata.)

Rp. *Acidi hydrochlorici puri ponderis specifici 1,120*

P. quindecim (15),

Aquae destillatae P. decem (10).

Mixtis in lagenam immissis adde

Ferri in filis P. tres (3).

Sepone loco tepido per horas viginti quatuor ad triginta, subinde agitando, donec evolutio gasis Hydrogenii non amplius cernitur. Tum liquor a Ferro non soluto filtratione accelerata separatus Aqua destillata diluatur, ut pondus liquoris totius exaequet

Partes sexaginta tres (63).

Tandem liquor, admixta

Acidi hydrochlorici puri ponderis specifici supra designati

P. una (1),

in lagenulas ingeratur, in quibus plane repletis, epistomiis vitreis et tecturis e resina elastica confectis bene clausis asservetur.

Ferrum jodatum.

Eisenjodür. Jodide of iron. Jodure de fer.

Pulvis e flavido albus, in aëre humescens, saporis austeri, in octo partibus Aquae solutionem limpidam, coloris expertem praebens, constans e parte una Ferri jodati (FeJ) et partibus novem Sacchari lactis, et adaequans contritionem primam potentiata.

Contritio secunda et tertia et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur, dilutiones autem semper recens parandae sunt.

Ferrum jodatum

cum Saccharo lactis mixtum.

(Contritio prima potentiata).

Rp. *Ferri pulverati puri P. decem (10),*

Aquae destillatae P. quinquaginta (50).

In cucurbitam parvam immissis paulatim adjice

Jodi puri P. triginta sex (36).

Modice incalescant interdum agitando, donec color e rubro fuscus in colorem dilute subviridem mutatus sit. Liquorem citissime filtra, filtrum Aquae destillatae pauxillo affuso abluendo et statim commisce cum

Sacchari lactis pulverati P. trecentis (300).

Miscela tunc (in patina ferrea) calore balnei vaporis inter agitationem evaporet et massae adjectis

Sacchari lactis pulverati P. nonaginta sex (96)

evaporatio et exsiccatio eodem calore pergatur. Residuum siccum statim in pulverem redactum in lagenulas bene obtundendas ingeratur et a luce remotum asservetur. Contineant partes decem partem unam Ferri jodati sicci.

Ferrum lacticum.

Witssaures Eisenoxydul. Lactate of iron. Lactate de fer.

Pulvis crystallinus albidus, saporis subdulcis adstringentis, in Aquae partibus triginta solubilis, in Spiritu vini rectificatissimo insolubilis, constans e Ferro oxydulato, Acido lactico et Aqua ($=\text{FeO}, \text{L} + 3\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur. Si poscitur, recens parandae sunt.

Ferrum magneticum.

Lapis magneticus. Magnetstein; Magneteisenstein. Magnetic ironstone; Magnetic iron ore. Fer oxydulé magnétique.

Minerale e nigro griseum subsplendens, in metallifodinis Sueciae, Norvergiae, Saxoniae, Bohemiae etc. occurrens, constans e Ferro oxydulato et Ferro oxydato ($=\text{FeO} + \text{Fe}^2\text{O}^3$), vi magnetica praeditum. Ponderis specifici circiter 5,000. Frusta rubigine fuscescente oblecta rejiciantur.

Contritiones et dilutiones parantur modis §§ 6. et 11. notatis.

Ferrum sesquichloratum.

Ferrum muriaticum (oxydatum). Eisenchlorid. Sesquichloride of iron. Sesquichloride de fer.

Ferrum sesquichloratum sit liquidum*) limpidum, coloris e croceo fusci, ponderis specifici 1,300 ad 1,303. Centenae partes continent partes triginta Ferri sesquichlorati sicci.

*) Ob incertam quantitatem Aquae crystallinae, quae crystallis salis continetur, sal in Aqua solutum in promptu habetur.

Tinctura Ferri sesquichlorati s. Ferri muriatici (oxydati) commiscendo liquoris partem unam cum partibus duabus Spiritus vini diluti paretur. Tinctura potentiatur.

Ferrum sesquichloratum liquidum.

Rp. Ferri in filis P. sex (6),

Acidi hydrochlorici, pond. spec. 1,120, P. triginta (30),

Aquae destillatae P. quindecim (15).

In patinam porcellaneam immissas post digestionem coque, donec Ferri nihil amplius solvatur. Tum in liquorem filtratum tandiu

Chlorum gasiforme

l. a. introducatur, donec liquor Chlorum valde redoleat. Liquor calefaciendo a Chloro superfluo liberatus tandem diluatur

Aquae destillatae

ea quantitate, ut pondus liquoris partes quinquaginta quatuor (54) exaequet, vel donec liquor pondus specificum = 1,300—1,302 habeat. Liquor sit a Ferro oxydulato liber, quod ope Kalii ferricyanati rubri dignoscitur.

Nota. Ferrum in filis, antequam adhibeatur, ope chartae bibulae bene detergendum est.

Ferrum sulphuricum.

Vitriolum Martis. Schwefelsaures Eisenorybul. *Sulphate of iron. Sulphate de fer.*

Crystalla rhomboideo-prismatica, pellucida, e coeruleo viridia (neutiquam flavescentia aut ferruginea), e Ferro oxydulato, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{FeO}, \text{SO}^3 + 7\text{HO}$) constantia. Sint a Cupro, Zinco et Mangano plane libera. Sal est in Aquae partibus duabus solubile, in Spiritu vini insolubile.

Dilutiones potentiatae saepius recens parandae sunt. Dilutio prima et secunda Aqua, tertia Aqua spirituosa, quarta Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Filix.

Filix mas. Johanniskwurz. *Male fern. Fougère mâle.*

Aspidium Filix mas Schwartz s. Polypodium Filix mas L. planta perennis, in silvis montium Europae frequens, e familia Polypodiacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: rhizomate (cormo) longo crasso, residuis imbricatis frondium, petiolis carnosis et squamis paleaceis emarcescentibus ferrugi-

neis undique oblecto, medulla carnosa crassa farcto, extus ex atro fusco, intus pallide viridi; odoris peculiaris ingrati, saporis dulciusculi subacris.

Medulla carnosa recens, ex rhizomate autumnno collecto exemta.

Essentia Filicis paretur modo § 14. notato.

Formica.

Waldbameise. Holzameise. Wood-ant. Fourmi des bois.

Formica rufa L., insectum hymenopterum in Europae silvis frequens, e familia Formicariarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: thorace ferrugineo; capite et abdomine nigris; pedibus ferrugineis.

Insecta neutra aptera viventia, a quisquiliis perfecte mundata.

Essentia Formicarum paretur modo § 15. notato ope Spiritus vini rectificati.

Fragaria.

Fragula. Walderdbeere. Wild strawberry. Fraister.

Fragaria vesca L., planta Europae perennis in silvis et collibus frequens, e familia Rosacearum.

Planta tota florescens mense Majo collecta.

Essentia Fragariae paretur modo § 15. notato.

Galactoplacinum.

Milchschorf. Milk-scab. Croûtes laiteuses.

Massae crustae lacteae infantum.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur.

Gentiana.

Gentiana rubra s. lutea. Gentianwurzel. Fell-wort; Bitter-wort. Gentiane jaune.

Gentiana lutea L., planta perennis in Alpibus Europae, e familia Gentianearum.

Radix siccata. Sit lutea superius annulata, inferius longitudinaliter sulcato-rugosa, extus e luteo et cinereo subfusca, intus subrufa, ligno crasso, cortice tenuiore, saporis peramari. Radices aliarum specierum Gentianae coloris pallidioris rejiciantur. Cave ne radices Veratri albi immixtae sint.

Tinctura Gentianae paretur ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato.

Gentiana cruciata.

Kreuzgenzian. *Gentiane croisette.*

Gentiana cruciata L., planta perennis Europae, e familia Gentianearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: calycis dentibus quatuor inaequalibus; corolla plerumque quadrida appendiculata; caule terete; radice longe sulcata, ad digitum minorem crassa, e luteo alba.

Radix aut recens, aut siccata extus e rufo lutea intus e flavo albida.

Tinctura Gentianae cruciatae ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato e radice siccata, vel modo § 15. notato e radice recente paretur.

Geum.

Caryophyllata. Heffentwurz. *Pink-root; Avena. Recise; Salmonde.*

Geum urbanum L., planta perennis Europae, e familia Rosacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliolis (lobisve) acutis; floribus erectis; calyce viridi; radice saporis odorisque caryophyllacei, e rhizomate brevi et radiculis tenuibus longis composita, epidermide e fusco rubente, cortice intus flavescente fibroso et ligno e rosaceo albido.

Radix recens, mensibus Aprili et Majo, quum primum herba progerminat, collecta.

Essentia Gei s. Caryophyllatae paretur modo § 15. notato.

Ginseng.

Panax. Radix Ninsi. Kraftwurz. *Ginsengroot. Ginseng.*

Radix sicca plantae ignotae (*Panacis quinquefolii* L.) ex America allata, napiformis, interdum bifida, transverse rugosa, e flavo albida, intus alba et annulo resinoso praedita; texturae subcorneae; saporis e subdulci amariuscule, parum aromatici, odoris nullius.

Tinctura Ginseng modo § 16. notato ope Spiritus vini rectificati paretur.

Glonoinum.

Nitroglycerinum. Glycerinum nitrosatum.

Liquor olei instar, aqua gravior, saporis acris subdulciusculi, odoris fere nullius, coloris subflavescentis, in Aqua parum, in Spiritu vini facile solubilis, calore aucto explosione deto-

nans. Glonoinum attactu aëris facile corrumpitur, quam ob rem recens paratum Spiritus vini rectificatissimi quantitate novemplici commixtum, signandum dilutio potentiata prima, asservare solent.

Dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Glonoinum.

℞p. *Acidi nitrici concentrati, pond. spec. 1,450 ad 1,500,*
P. quatuor (4),

Acidi sulphurici concentrati P. octo (8).

Mixtis et ope glaciei usque ad 0° Celsiusi therm. refrigeratis guttatim et inter agitationem ope bacilli vitrei

Glycerini P. unam (1)

vel eam quantitatem instilla, donec guttulae, oleo similes, mixtioni innatantes appareant. Cave ne inter instillandum Glycerinum mixtura valde incalescat, quo modo explosio exoriri possit. Itaque instillare Glycerinum tamdiu cesses, quamdiu mixtura adhuc tepida est. Bene agis, si vas mixtionem continens aqua frigida vel glacie semper refrigeras.

Tum mixtionem totam inter agitationemingere in

Aquae frigidioris

volumen vigintuplex et sepone, donec Glonoinum, liquidi spissiusculi instar, in fundo aquae coierit. Aqua defusa, Glonoinum aqua commiscendo decantandoque ab Acido adhaerente libera, tandem ope infundibuli separatorii separatum in

Aetheris, pond. spec. 0,720—0,725,

quantitate non nimia solve, et conquassando cum Calcio chlorato fuso ab aqua adhaerente liberatum, tunc filtratum calore 25° Cels. therm. non superante evapora, quae operatio sub divo loco umbroso, atque adhibendo balneum aquae efficiatur. Statim in lagenulis vitreis et a luce remotis asservetur.

Glossolentorinum.

Zungenbeleg; Beleg der Zunge.

Massa recens mucosa alba, albida, flava, vel fusca etc. in lingua aegroti hominis insidens.

Contritiones et dilutiones eodem modo quo Alveolini (Pag. 33) efficiuntur.

Gonorrhinum.

Samenflüssigkeit.

Liquor spermaticus, lacteo-albidus, spissiusculus, pollutione nocturna per urethram ejaculatus. Ne muco gonorrhoeico permuetetur.

Contritiones et dilutiones eodem modo quo Alveolini (Pag. 33) efficiuntur.

Granatum.Cortex radices Granati. Granatwurzelrinde. *Pomegranate. Grenadier.*

Punica Granatum L., arbor Asiae, Europae et septentrionalis Africae, e familia Granatearum.

Cortex siccatus e ramis radices arboris spontaneae collectus. Exhibet segmenta ad duo millimetra crassa, canaliculata, flexuosa, fragilia, cortice exteriori e griseo fusco, rugoso, intimo subfibroso, e viridi lutescente; ligno saepe adhaerente fibroso, pallide luteo; saporis adstringentis amaricantis.

Tinctura Granati paretur modo § 16. notato.

Graphites.Plumbago. Wasserblei. *Blacklead. Plombagine.*

Pulvis subtilissimus a ferro et terris liber, e nigro griseus, tactu inquinans, aqua ponderosior, e carbone constans, in Aqua et Spiritu vini insolubilis.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. efficiuntur.

Graphites.

Rp. *Graphitidis venalis Anglici laevigati* P. decem (10),
Aquae communis P. centum (100).

Coque per horam. Tum, aqua decantata, adde

Acidi hydrochlorici puri,

Acidi nitrici puri, singulorum P. duas (2),

Aquae destillatae P. octo (8).

Digere per dies duos et saepius agita. Dein liquorem decanta et sedimentum Aqua destillata perfecte elue et sicca.

Gratiola.Gottesgabentrant. *Hedge hyssop. Herbe à pauvre homme.*

Gratiola officinalis L., planta perennis Germaniae, e familia Personatarum, trib. Scrophularinarum. Differt ab aliis

plantis ejusdem familiae: in calycis basi bracteis linearibus calycem superantibus; floribus axillaribus pedunculatis albis, tubis flavescens; caule erecto, basi repente; foliis glabris oppositis sessilibus lanceolatis serrulatis, ad basin integerrimis, subtrinerviis.

Planta tota florescens recens, mense Junio collecta.

Essentia Gratiolae modo § 14. notato paretur.

Guaco.

Guaco.

Eupatorium saturejaefolium Lam., *Eupatorium Guaco* Humb., *Mikania Guaco* Willd., planta repens Americae meridionalis, e familia Eupatoriacearum.

Folia siccata cum caulibus tenuioribus et floribus, 10 ad 13 centimetra longa, 7 ad 8 centimetra lata, petiolata, ovata, acuminata, serrulata, subtus hirta; caules teretes longiores flexuosi sulcati hirti; flores in corymbos aggregati.

Tinctura Guaco paretur modo § 16. notato.

Guajacum.

Resina Guajaci. Guajatharz. *Guajac.*

Guajacum officinale L., arbor Indiae occidentalis, e familia Zygophyllearum.

Resina nativa, ex arbore hac quomodocumque deprompta, in frustis difformibus, e fusco subviridibus, duris, superficie pulverulentis, fractura splendente subdiaphana. Sit in Spiritu vini solubilis.

Tinctura Guajaci paretur modo § 16. notato.

Gutti.

Gummi Gutti. Gutti.

Arbor non satis nota Asiae orientalis (*Hebradendron cambogioides* Graham?) Gummi-resina in frustis difformibus fragilibus, opaca, subnitida, e luteo rubra, trita citrina, fracturae conchoideae, partim in Spiritu vini, partim in Aqua solubilis.

Tinctura Gutti ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato paretur.

Haematoxylon.

Lignum Campechianum. Blauholz. *Log-wood.* *Bois de Campêche.*

Haematoxylum Campechianum L., arbor Americae australis, e familia Leguminosarum.

Lignum durum, e fusco-rubro violaceum, texturae fibrosae, saporis subdulcis adstringentis.

Tinctura Haematoxyli ope Spiritus vini rectificati modo § 16. notato paratur.

Helianthus.

Sonnenblume. *Large Sunflower of Mexico. Topinambour.*

Helianthus annuus L., planta annua Americae calidioris, in Europa culta, e familia Compositarum, trib. Coreopsidearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: radice fibrosa; pedunculis incrassatis; capitulis (anthodiis) amplis cernuis.

Capitula sive anthodia recentia cum floribus evolutis et cum pedunculis, mense Julio ante fructificationem collecta.

Essentia Helianthi paretur modo § 14. notato.

Helinum.

Reichborn. *Corn. Cor aux pieds.*

Massa callosa indurata gemursae in digitis pedum hominum.

Contritones et dilutiones parentur modis §§ 6. et 11. notatis.

Helleborus.

Melampodium. *Schwarze Nieswurz. Black Hellebore. Hellebore.*

Helleborus niger L., planta perennis alpina Germaniae meridionalis, e familia Ranunculacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: scapo unifloro vel bifloro subnudo; foliis radicalibus pedatis, foliolis oblongis, antrosum leviter serratis, glaberrimis coriaceis; rhizomate circiter ad 13 millim. longo, crasso, ramis brevioribus, radículas superne adnatas praelongas, ad 3—5 millim. crassas, extus e fusco nigricantes, intus albas carnosas emittente.

Radix tota aut recens aut tepido loco siccata. Colligitur mense exeunte Decembri et mense Januario post florescentiam. Ne cum radicibus similibus confundatur, radix semper una cum foliis radicalibus *) colligenda est.

Tinctura Hellebori e radice siccata modo § 16. notato, e radice recente modo § 15. notato paratur.

*) *Helleborus viridis* differt foliolis undique argute serratis, *Adonis vernalis* caule inferne squamoso (foliis radicalibus squamiformibus), foliis lineari-multipartitis.

Heracleum.

Sphondilium; Branca ursina. Bärenflan. *All-heal. Berce; Spondyle.*

Heracleum Sphondilium L., planta biennis pratensis et silvatica Europae, e familia Umbelliferarum, insignis: caule sulcato hirsuto; foliis hirsutis pinnatifidis; foliolis involucellorum lineari-setaceis.

Planta tota florescens recens, aestate collecta.

Essentia *Heraclei* paretur modo § 14. notato.

Herculinum.

Spuma inter paroxysmum epilepsiae (hominum) ex ore evadens.

Eodem modo, quo *Alveolinum* (Pag. 33) potentiatur.

Herpinum.

Flechte. Tetter. Herpe.

Bullae vel pustulae vel massa farinosa vel squamiformis herpetis. Discernunt *Herpinum* siccum et humidum capitis, scroti, faciei, nasi etc.

Potentiantur aequali modo quo *Condylominum* (Pag. 71).

Hippoestrinum.

Schraubenwurm. Bolts.

Larvae *Oestri Equi* (der *Pferdebremse*), quae magnitudine seminis *Dactyli* in ventriculis equorum (tempore veris) reperiuntur.

Potentiantur aequali modo quo *Ascaridinum* (Pag. 44).

Hipposudorinum humidum.

Pferdeschweiß. Sweat of the horses. Sueur de cheval.

Sudor humidus equi.

Potentiat eodem modo quo *Alveolinum*.

Hipposudorinum siccum.

Pferbestaub.

Pulvis albidus cuti equorum adhaerens, qui radendo operstrigilis et scoparum colligitur.

Potentiat eodem modo quo *Ascaridinum*.

Hippozaeninum.*Reiter. Glanders.*

Pus vel mucus in naribus equorum malleo humido aegrotantium secretum.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Humaninum.*Menschenoth. Man's excrements. Merde.*

Stercus humanum.

Potentiatur aequali modo quo Ascaridinum.

Hydrargyrum.

Mercurius vivus. Argentum vivum. Quecksilber. Quicksilver. Mercury.
Vifargent; Mercure.

Metallum liquidum mobilissimum, coloris stannei, pond. spec. 13,5. Sit purum et ab aliis metallis liberum.

Potentiatur modis §§ 6 et 11. notatis.

Hydrargyrum aceticum.

Mercurius aceticus. Effigsaures Quecksilberoxydul. *Acetate of mercury.*
Acétate de mercure.

Sal in crystallulis squamiformibus candidis, argenti instar nitentibus, in Aquae partibus 300 solubile, constans ex Hydrargyro oxydulato et Acido acetico ($=\text{HgO}^2\text{A}$).

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 10. notatis efficiuntur.

Hydrargyrum aceticum.

Rp. *Hydrargyri nitrici oxydulati crystallisati* P. viginti (20).

Tritas solve in mixtura frigida, parata ex

Acidi nitrici puri P. tribus (3) et

Aquae destillatae P. centum et sexaginta (160).

Solutioni, si opus est, filtratae inter agitationem admisce

Natri acetici crystallisati P. sedecim (16),

antea solutas in

Aquae destillatae fervidae P. triginta et duabus (32).

Digere per horam unam, tum sepone per diem loco frigido.

Dein praecipitatum defundendo filtrandoque a liquore separa,

Aqua destillata ablue et inter chartam premendo, calorem evitando, loco umbroso sicca et in lagenis obturatis serva.

Hydrargyrum amidato-bichloratum.

Hydrargyrum ammoniato-muriaticum; Mercurius praecipitatus albus. *Quecksilberamidchlorid*; weißer Präcipitat. *Chloro-amidide of mercury*; *White praecipitate*. *Chloro-amidure mercuriel*; *Mercure précipité blanc*.

Massa coloris nivei friabilis depingens, in Aqua et Spiritu vini fere insolubilis, igne non fusibilis, sed perfecte volatilis, constans ex Hydrargyro, Amido et Chloro ($=\text{HgCl} + \text{HgNH}^2 + \text{NH}^1\text{Cl}$).

Hydrargyrum amidato-bichloratum.

Rp. *Hydrargyri bichlorati corrosivi* P. duas (2).

Solve in

Aquae destillatae calidae P. quadraginta (40).

Liquori filtrato refrigerato affunde inter agitationem

Ammoni caustici liquidi, *pond. spec. 0,960*, P. tres (3), vel quantum ad praecipitationem requiritur. Praecipitatum in filtro collige, Aqua destillata, cui paulum Ammoni caustici liquidi admixtum est, ablue, tum loco umbroso tepido sicca et in vasis clausis a luce remotis asserva.

Contritiones et dilutiones parentur modis §§ 6 et 11. notatis.

Hydrargyrum amidato-nitricum oxydulatum.

Mercurius solubilis; Hydrargyrum oxydulatum Hahnemanni; Hydrargyrum oxydulatum nigrum; Hydrargyrum oxydulatum ammoniatum. *Hahnemann's auflösliches Quecksilber*. *Salpetersäures Quecksilberoxydulamid*. *Black oxide of mercury*.

Mercure soluble de Hahnemann.

Pulvis nigerrimus, in igne volatilis, constans ex Hydrargyro oxydulato, Hydrargyro amidato et Acido nitrico ($=\text{Hg}^2\text{O}, \text{NO}^5 + \text{NH}^2\text{Hg}$).

Contritiones et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiuntur.

Hydrargyrum amidato-nitricum oxydulatum.

Rp. *Hydrargyri nitrici oxydulati crystallisati* P. octo (8).

Contritas lenissimo calore solve in miscela parata ex

Aquae destillatae P. sexaginta quatuor (64) et

Acidi nitrici puri (*pond. spec. 1,200*) P. una (1).

Liquori, diluto

Aquae destillatae P. sexaginta quatuor (64),

instilla inter agitationem

Ammoni caustici liquidi (*pond. spec. 0,960*) P. quatuor (4),

antea dilutas

Aquae destillatae P. triginta et duabus (32).

Sedimentum exortum statim in filtro collige et in eo *Aquae destillatae* partibus quadraginta octo (48) ablue, inter chartae bibulae strages preme, loco umbroso, calorem evitando, sicca et tritum in lagenis a luce remotis serva.

Hydrargyrum bichloratum.

Mercurius sublimatus s. corrosivus. Hydrargyrum muriaticum corrosivum. *Sit-
bimat; Quecksilberchlorid. Perchloride of mercury. Deutochloride de mercure.*

Crystalla prismatica acicularia alba, texturae fibrosae, subdiaphana, excandefacta primum fusibilia tum volatilia, solubilia in partibus sedecim *Aquae*, nec non in partibus tribus *Spiritus vini*, constantia ex Hydrargyro et Chloro ($=\text{HgCl}$).

Dilutiones *Spiritu vini* rectificatissimo efficiuntur.

Hydrargyrum bichloratum crystallisatum.

Paretur solvendo Hydrargyrum bichloratum sublimatum venale in *Aquae fervidae* quadruplici quantitate, filtrando seponendoque.

Hydrargyrum bijodatum (rubrum).

Mercurius bijodatus s. jodatus ruber. *Quecksilberjodid. Perjodide of mercury. Deutojodure de mercure.*

Pulvis laete coccineus inodorus insipidus depingens, in igne volatilis, in *Aqua* fere insolubilis, in *Spiritus vini* partibus 120 solubilis, constans ex Hydrargyro et Jodo ($=\text{HgJ}$).

Contritiones quatuor, tum dilutiones efficiuntur.

Hydrargyrum bijodatum.

Rp. *Hydrargyri bichlorati corrosivi* P. octo (8).
Solve in

Aquae destillatae calidae P. centum et quinquaginta (150), quibus filtratis inter agitationem admisce liquorem filtratum, paratum e

Kalii jodati P. decem (10) et

Aquae destillatae P. quadraginta (40).

Praecipitatum inde exortum in filtro collige, *Aqua* bene ablue, loco tepido sicca et caute asserva.

Hydrargyrum chloratum mite.

Mercurius dulcis; Calomelas; Calomel; Hydrargyrum muriaticum mite; Aquila alba. Calomel; Quecksilberchlorid. *Protochloride of mercury. Protochlorure de mercure.*

Pulvis albus vel subflavide albus, tenuissimus, in igne plane avolans, in Aqua et Spiritu vini insolubilis, constans ex Hydrargyro et Chloro ($=\text{Hg}^2\text{Cl}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Hydrargyrum jodatum flavum.

Mercurius jodatus (flavus vel viridis).*) Mercurius protojodatus. Quecksilberjodid. *Protojodide of mercury. Jodure de mercure.*

Pulvis e subviridi flavus insipidus, igne volatilis, in Aqua et Spiritu vini rectificatissimo insolubilis, constans ex Hydrargyro et Jodo ($=\text{Hg}^2\text{J}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Hydrargyrum jodatum flavum.

Rp. Hydrargyri puri P. octo (8),

Jodi puri P. quinque (5),

Aquae destillatae P. unam (1).

In mortarium porcellaneum immissas sub divo assidue contere, interdum Spiritus vini aliquot guttis conspergendo, donec miscela colorem e subviridi flavum induerit. Tum miscelam Spiritu vini rectificatissimo ablue, loco umbroso tepido sicca et in lagena obturata, adversus lucis accessum munita, asserva.

Hydrargyrum nitricum.

Mercurius nitricus s. nitrosus. Hydrargyrum nitricum oxydulatum. Salpeteraures Quecksilberoxydul. *Protonitrate of mercury. Protonitrate de mercure.*

Sal in crystallis rhombicis, coloris expertibus, in aëre parum fatiscientibus, in parva quantitate Aquae solubile, in majore quantitate autem ex parte solubile et sal basicum demittens. Ex Hydrargyro oxydulato, Acido nitrico et Aqua ($=\text{Hg}^2\text{O}, \text{NO}^5 + 2\text{HO}$) constat.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Hydrargyrum nitricum (oxydulatum crystallisatum).

Rp. Hydrargyri puri P. decem (10).

*) Casparius Mercurio jodato significat praeparatum, quod sub nomine Hydrargyrum bijodatum hic receptum est.

In ollam vitream ingestis affunde

Acidi nitrici (pond. spec. 1,200) P. decem (10),
et sepone loco frigido per 24—36 horas. Crystalla exorta col-
lige, ablue Aquae destillatae parva quantitate, cui pars vige-
sima Acidi nitrici admixta est, inter chartam bibulam calorem
evitando sicca et in lagenis obturatis serva.

Hydrargyrum oxydatum rubrum.

Mercurius praecipitatus ruber. *Quecksilberoxyd. Peroxyd of mercury.*
Deutoxyde de mercure.

Pulvis subtilissimus, coloris e rubro flavi, in Aqua et Spi-
ritu vini insolubilis, in igne volatilis, constans ex Hydrargyro
et Oxygenio ($=\text{HgO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Hydrargyrum oxydatum rubrum.

Rp. *Hydrargyri oxydati rubri praeparati P. decem (10),*
Aquae destillatae P. viginti (20),
Kali caustici liquidi P. unam (1).

In ollam vitream ingestae per aliquot horas seponantur et sae-
pius agitentur. Sedimentum tunc Aqua calida bene abluatur
et loco tepido siccetur.

Hydrargyrum phosphoricum.

Mercurius phosphoricus s. phosphoratus. *Hydrargyrum phosphoricum oxydulatum.*
Phosphorsaures Quecksilberoxydul. Protophosphate of mercury. Protophos-
phate de mercure.

Pulvis crystallinus albus, in Aqua et Spiritu vini insolubi-
lis, in igne volatilis, constans ex Hydrargyro oxydulato, Acido
phosphorico et Aqua ($=2\text{Hg}^2\text{O}, \text{HO}, \text{PO}^5 + \text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Hydrargyrum phosphoricum.

Rp. *Hydrargyri nitrici oxydulati crystallisati P. octo (8).*
Solve agitando in

Aquae destillatae P. sexaginta quatuor (64) et

Acidi nitrici puri P. una (1).

Liquori limpido admisce

Natri phosphorici crystallisati P. sex (6),

antea solutas in

Aquae destillatae P. viginti quatuor (24).

Praecipitatum inde exortum Aqua sedulo ablue et loco umbroso tepido sicca. Serva in lagena obturata a luce remota.

Hydrargyrum sulphuratum rubrum.

Cinnabaris (facticia). Zinnober. *Red sulphuret of mercury; Cinnabar. Cinabre (factice).*

Pulvis subtilissimus insipidus, coloris coccinei, in igne plane volatilis, in Aqua et Spiritu vini insolubilis, constans ex Hydrargyro et Sulphure (=HgS).

Contritones et dilutiones modo §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Hydrophobinum.

Der Speichel Wasserscheufrant.

Spuma vel saliva, quae ante os hominum aut animalium hydrophobia (timore aquae) aegrotantium collecta reperiuntur.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Hyoscyamus.

Bilsenfrant. *Henbane. Jusquiame.*

Hyoscyamus niger L., planta annua et biennis Europae, e familia Solanearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis ovato-oblongis, sinuato-dentatis, infimis petiolatis, caulibus semiamplexicaulibus; corollis lutescentibus venis purpureis reticulatis, infundibuliformibus, quinquilobis.

Planta florescens recens (mensibus Junio et Julio) collecta, caulibus crassioribus et radice resectis. Planta solo sterili crescens praeferatur.

Essentia Hyoscyami paretur modo § 14. notato.

Hypericum.

Johannisfrant. *St. Johnswort. Millepertuis.*

Hypericum perforatum L., planta perennis Europae, e familia Hypericinearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule ancipiti, foliis glabris pellucido-punctatis.

Capsulae (fructus) immaturae recentes (mense Augusto collectae) nitidae, obtuse triangulares, e fusco rubrae.

Essentia Hyperici paretur modo § 15. notato.

Jacea.

Viola tricolor. Stiefmütterchen. *Hartsease pensies. Pensée tricolore.*

Viola tricolor L., planta perennis e familia Violariarum.

Differt ab aliis speciebus sui generis: caule angulato ramoso; stipulis lyrato-pinnatifidis magnis: foliis oblongis crenatis.

Planta floescens recens, mensibus Majo et Junio collecta.

Essentia Jaceae paretur modo § 15. notato. Sit odoris grati balsamici, coloris e fusco flavidi.

Jalapa.

Salappe. Jalap.

Ipomoea Purga Schlechtendal, *Convolvulus Purga* Schiede, planta perennis Mexicana, e familia Convolvulacearum.

Radix sicca tuberosa compacta ponderosa rugosa, intus annulis concentricis et punctis lineisque fuscis notata, fractura resinosa.

Tinctura Jalapae paretur modo § 16. notato.

Jatropha.

Semen Ricini majoris; *Nux cathartica Americana*; *Ficus infernalis*. Amerikanische Brechnuß. *Noix de Barbades*; *Pignons d'Inde*.

Jatropha Curcas L. s. *Curcas purgans* Adanson, arbor Americae australis et Indiae occidentalis, e familia Euphorbiacearum.

Semina e nigricante fusca, lineis et punctis pallidis variegata, circiter ad duo centim. longa, vix ad unum centim. crassa, nucleo albido oleoso, saporis primum pinguis dulciusculi, postea peracrioris, tam fauces quam linguam vellicantis.

Tinctura Jatrophae paretur modo § 16. notato.

Ignatia.

Faba sancti Ignatii; *Faba Indica*. Ignatiusbohne. *Ignatius-bean*. *Fève de saint Ignace*.

Strychnos Ignatii Berg s. *Ignatia amara* L., frutex insularum Philippinarum, e familia Strychnearum.

Semina sicca oblonga, obtuse tri-vel tetragona, uno latere convexa, reliquis plana, magnitudine circiter nucis Avellanae, extus grisea, durissima cornea, saporis amarissimi. Ad pulverationem semina ope cultri in taleolas tenues antea dissecantur et loco calido siccentur.

Tinctura Ignatiae modo § 16. notato paretur.

Indigo.

Indicum; *Indigofera*. Indig. *Indian blue*. *Indigo*.

Indigofera tinctoria L., *Indigofera Anil* L. et

aliae species Indigoferae, plantae Indiae orientalis, in India occidentali cultae, e familia Papilionacearum.

Massa (pigmentum) saturate coerulea compacta levis friabilis, ungue fricata nitore cupreo splendens, in Aqua et Spiritu vini insolubilis.

Contritioes et dilutiones modis § 6. et 11. notatis efficiuntur.

Influenzinum.

Grippinum. Grippenschleim.

Mucus secretus a membranis pituitariis hominum influenza epidemica aegrotantium.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Jodum.

Jodina. Jod. Jodine. Jode.

Substantia friabilis, calore volatilis, referens lamellas siccas e coeruleo nigras, splendoris metallici, odoris Chloro similis. Est in partibus decem Spiritus vini rectificatissimi plane, in Aqua parum solubilis. Servetur in lagena epistomio vitreo munita.

Dilutio prima solvendo partem unam Jodi in partibus decem Spiritus vini rectificatissimi, dilutio secunda commiscendo partes undecim (11) dilutionis primae cum partibus octoginta novem (89) Spiritus vini rectificatissimi efficiendae sunt. Dilutiones in lagenis epistomiis vitreis munitis, a luce remotis asserventur.

Ipecacuanha.

Brechwurzel. Ipecacuanha.

Cephaëlis Ipecacuanha Richard, planta perennis Brasiliae, e familia Rubeacearum.

Radix cylindrica flexuosa, 2 ad 5 millimetr. crassa, extus e fusco grisea, intus e luteolo alba, cortice crasso fragili verrucis inaequalibus copiosis, ligno tenui.

Tinctura Ipecacuanhae paretur modo § 16. notato.

Iris versicolor.

Bunte Schwertlilie. Common blue flag. Glaieul bariolée.

Iris versicolor L., planta perennis Americae borealis, in hortis saepe culta, e familia Iridearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule terete simplici longitudine foliorum

ensiformium; corollae tubo brevior quam germen subtrigonum; flore coeruleo laciniis exterioribus medio luteis; rhizomate tuberoso carnosum.

Radix (rhizoma) recens ante florescentiam collecta.

Essentia Iridis versicoloris paretur modo § 15. notato.

Juglans.

Putamina Nucum Juglandis. Wallnuß. Walnut. Noyer.

Juglans regia L., arbor orientalis, in Europa culta, e familia Juglandearum.

Cortex fructus immaturi recens viridis glaber subcarnosus, mensibus Junio et Julio collectus.

Essentia Juglandis paretur modo § 15. notato.

Juncus effusus.

Flatterjuncus.

Juncus effusus L., planta perennis Europae et Americae, e familia Juncearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: cyma laterali ramosissima effusa; culmo nudo laevi; floribus oblongis triandris; rhizomate caespitosiformi repente fibrillis unilateralibus, deorsum decurrentibus.

Radix recens plantae florentis, mense Julio collecta.

Essentia Junci effusi paretur modo § 15. notato.

Juncus pilosus.

Haarige Simse.

Luzula pilosa Willdenow s. Luzula vernalis De Cand. s. Juncus pilosus (variet. α) L., planta perennis Europae, e familia Juncearum. Differt culmo folioso; foliis planis in margine pilosis, radicalibus lanceolatis; umbella simplici ramis trifloris demum reflexis; floribus solitariis; rhizomate caespitosiformi multicipite, stolones emittente.

Radix recens plantae florentis, mensibus Aprili et Majo collecta.

Essentia Junci pilosi paretur modo § 15. notato.

Kali bichromicum.

Kali chromicum rubrum. Doppelt chromsaures Kali. Bichromate of potassa. Bichromate de potasse.

Sal in crystallis saturate e citrino rubris, in Aquae parti-

bus decem solubile, in Spiritu vini insolubile, constans e Kali et Acido chromico ($=\text{K}_2\text{O}, 2\text{CrO}_3$).

Dilutio prima, secunda et tertia efficiuntur Aqua, quarta Aqua spirituosa, quinta Spiritu vini diluto, sexta Spiritu vini rectificatissimo. Dilutio prima solvendo partem unam salis in partibus undeviginti (19) Aquae, dilutio secunda miscendo partes viginti (20) dilutionis primae cum partibus octoginta (80) Aquae parentur.

Kali carbonicum.

Sal Tartari. *Kohlenſaures Kali. Carbonate of potassa. Carbonate de potasse.*

Sal siccum pulvereum albiſſimum, aëris attactu deliques-
cens, in pari pondere Aquae solubile, in Spiritu vini insolubile,
constans e Kali et Acido carbonico ($=\text{K}_2\text{O}, \text{CO}_2$). Sit purissimum.

Dilutio prima et secunda Aqua, tertia Spiritu vini diluto etc.
(conf. § 9. notam) efficiuntur.

Kali chloricum.

Kali oxymuriaticum. *Chlorſaures Kali. Chlorate of potassa. Chlorate de potasse.*

Sal in crystallis candidis nitidis lamellosis, in Aquae sede-
cim partibus, in Spiritu vini rectificatissimi partibus 120 solu-
bile, constans e Kali et Acido chlorico ($=\text{K}_2\text{O}, \text{ClO}_5$). Sit a
Kali chlorato plane liberum. Iterata crystallisatione e Kali
chlorico venali paretur.

Dilutiones eodem modo quo Acidi oxalici (Pag 28) efficiuntur.

Kali nitricum.

Nitrum. *Salpeterſaures Kali; Salpeter. Nitrate of potassa. Azotate ou Ni-
trate de potasse.*

Sal in crystallis prismaticis pellucidis decoloribus vel albis,
in Aquae partibus quatuor solubile, in Spiritu vini insolubile,
constans e Kali et Acido nitrico ($=\text{K}_2\text{O}, \text{NO}_5$). Sit sal puris-
simum. Iterata crystallisatione e Kali nitrico depurato venali
efficiendum est.

Dilutio prima Aqua, secunda Aqua spirituosa, tertia Spiritu
vini diluto, quarta Spiritu vini rectificato, sequentes Spiritu vini
rectificatissimo efficiuntur.

Kalium bromatum.

Kali hydrobromicum. *Bromſaſium. Bromide of potassium. Bromure de
potassium.*

Crystalla alba cubica nitentia, in Aquae partibus quatuor,

nec non in partibus 200 Spiritus vini solubilia, constantia e Kalio et Bromo (=KBr).

Dilutio prima Aqua, secunda Spiritu vini diluto, sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Kalium jodatum.

Kali hydrojodicum. Sobkalium. *Jodide of potassium. Jodure de potassium.*

Crystalla cubica alba, in tribus quadrantibus Aquae partibus, nec non in sex partibus Spiritus vini rectificatissimi solubilia, constantia e Kalio et Jodo (=KJ).

Dilutio prima Spiritu vini rectificato, sequentes dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Kalmia.

Kalmie. Broadleaf kalmia. Grande kalmia.

Kalmia latifolia L., planta montana Americae borealis, e familia Ericearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: corymbis terminalibus; pedunculis calicibusque viscido-pubescentibus; foliis longe petiolatis subternis oblongis coriaceis, utrinque glabris.

Planta florens recens (vere collecta), radice resecta.

Essentia Kalmiae paretur modo § 15. notato.

Kaolinum.

Porzellanerde; Porcellanthon. *China-clay. Argile à porcelaine.*

Terra alba vel albida, tenera, argillacea. Variis in locis Germaniae effoditur. Ex Alumina, Acido silicico et Aqua praesertim constat. Laevigando in Aqua purgetur et siccetur.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Karkininum.

Reichseiter.

Discernunt Karkininum glandis penis, labiorum, nasi, uteri.

Pus ichorosum vel sanies e carcinomatibus illis exempta.

Potentiatur eodem modo quo Alveolinum.

Kobaltum.

Cobaltum. Kobalt. Cobalt.

Metallum coloris e rubente albidum, splendoris metallici tenuis, fracturae granulosa, durum, pond. spec. 8,5—8,9. A mag-

nete attrahitur. Metallum Hydrogenio ex Oxydo vel Cobalto oxalico reductum est pulvis e griseo niger, qui paretur eodem modo, quo Ferrum reductum. Ne Arsenio, quod in mercatura Cobaltum dicitur, commutetur.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Kreosotum.

Creosotum. *Kreosot. Kreosote. Créosote.*

Liquor subflavidus aut coloris expers, limpidus, lucem maxime refringens, Aqua gravior, in partibus octoginta Aquae, nec non in Spiritu vini facile solubilis. Frigori expositus in crystalli ne concreseat. Liquore Kali caustici plane solvatur et admixta Aqua ne turbetur. Nec chartam coeruleam, nec luteam mutet. Liquore Ferri sesquichlorati colore fusco, non coeruleo, tingatur.

Dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Kynoluium.

Mucus flavidus naribus et oculis secretus in canum morbo, quae lues canina (Staupe) nominatur.

Aequali modo quo Alveolinum potentiatur.

Kynotaeninum.

Bandwurm der Hunde. *Tape-worm of dogs. Ténia des chiens.*

Taenia recens, quam canis saepe una cum stercore per anum emittit.

Potentiatur aequali modo quo Ascaridinum.

Kynotorrhinum.

Ohransfluß der Hunde; Ohrwurmeiter.

Pus foetens excedens ex auribus canum, qui carcinodibus in auribus aegrotant.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Lachesinum.

Lachesis.

Trigonocephalus lachesis Oppel., Crotalus mutus L., Lachesis rhombeata Neuwied, anguis Americae australis, ibi Surukuku dictus, e familia Viperarum, insignis maculis e nigro fuscis rhomboideis, in seriem dispositis in dorso.

Mucus venenosus, e viridulo albidus, pellucidus dentium venenatorum.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Lacryminum.

Thränen. Tears. Larmes.

Lacrimae hominis.

Potentiantur aequali modo quo Alveolinum.

Lactuca.

Lactuca virosa. Giftlattig. *Acrid lettuce.* *Laitue vireuse.*

Lactuca virosa L., planta biennis Germaniae, e familia Compositarum, trib. Cichoracearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis horizontalibus, amplexicaulibus, in carina (costa media) aculeatis, mucronato-denticulatis, obtusis, ovali-oblongis, in basi sagittatis; caule paniculato.

Planta tota florescens recens, mensibus Julio et Augusto collecta, caulibus crassioribus resectis.

Essentia Lactucae paretur modo § 14. notato.

Lamium.

Weisse Nessel. *White nettle.* *Ortie blanche.*

Lamium album L., planta perennis e familia Labiatarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: floribus albis, verticillis sub20floris; galea floris obtusa; foliis petiolatis cordatis crenato serratis.

Planta tota florens recens (aestate) collecta.

Essentia Lamii paretur modo § 14. notato.

Laryngophthisinum.

Euftröhreneiter.

Materia pituitosa trachearum in phthisi tracheali secreta.

Potentiatur modo aequali quo Alveolinum.

Laurocerasus.

Kirschlorbeer. *Cherry-laurel.* *Laurier-cérise.*

Prunus Laurocerasus L., arbor sempervirens orientalis, in Europa saepius culta, e familia Amygdalearum, insignis:

foliis coriaceis sempervirentibus, remote serratis, subtus ad basin versus 2—4 glandulosus.

Folia recentia, aestate collecta.

Essentia Laurocerasi paretur modo § 15. notato.

Ledum.

Sumpfsport. Wild Rosemary. Romarin sauvage.

Ledum palustre L., fruticulus Europae borealis e familia Ericearum, insignis: foliis subcoriaceis lineari-lanceolatis marginem revolutum, supra viridibus nitentibus, subtus ramisque ferrugineo-tomentosis.

Folia una cum floribus recens collecta (mensibus Junio et Julio).

Essentia Ledi paretur modo § 15. notato.

Leucorrhinum.

Fluor albus. Weißer Fluß. Whites. Fleurs blanches.

Materia pituitosa in leucorrhoea ex vagina evadens.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Limulus Cyclops.

Königskrabbe. Horse-shoe; Helmed-fish.

Limulus Cyclops Fabr., *Monoculus Polyphemus* L., *Xiphosura Americana* Latr., animal crustaceum vel polymerium ex ordine Branchiopodorum et familia Aspidotorum, in maribus Indiae orientalis et Americae borealis habitans, insignis: testa plana convexa sutura lunata, postica dentata; cauda subulata longissima; aculeo parum serrulato in thorace; pedibus decem cheliformibus.

Succus (sanguis) coeruleus recens animalis.

Potentiatur aequali modo quo Aranea (Pag. 39).

Linaria.

Seinfrant. Flax-weed. Linaire.

Linaria vulgaris Miller, *Antirrhinum Linaria* L., planta perennis Europae, e familia Personatarum, insignis: corolla personata calcarata: caule erecto simplici vel superne ramoso; spicis terminalibus racemosis; floribus luteis; foliis sparsis confertis trinerveis linearibus acutis.

Planta tota floescens recens. Colligitur mensibus Julio et Augusto.

Essentia Linariae paretur modo § 14. notato.

Lippitudinum.

Feuchtigkeit des Triefauges.

Liquor pituitosus in lippitudine ex oculis hominum evadens. Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Lithonum carbonicum.

Lithion carbonicum. Lithium. Kohlenfaures Lithon. *Carbonate of lithia.*
Carbonate d'oxyde de lithium.

Pulvis albissimus levior, in Aquae partibus centum, non in Spiritu vini solubilis, constans e Lithono et Acido carbonico ($=\text{LiO}, \text{CO}^2$).

Lithonum carbonicum.

Rp. Ammoni carbonici P. sex (6).

Solve in

Aquae destillatae tepidae P. triginta (30).

Liquori filtrato affunde

Lithii chlorati sicci P. quatuor (4),

antea solutas in

Aquae destillatae calidae P. triginta (30).

Tum usque ad ebullitionem calefac et per diem loco frigido seponere. Dein sedimentum in filtrumingere, primum affundendo parvam quantitatem Aquae frigidae, postea ope Spiritus vini diluti tamdiu elue, donec liquidum defluens addito Argento nitrico soluto vix turbetur. Tandem massam in filtro remanentem inter strages chartae bibulae primum leni calore, postea calore balnei vaporis perfecte exsicca.

Lobelia.

Lobellie. Common Lobelia; Asthma weed. *Lobelia enflée.*

Lobelia inflata L., planta perennis Americae borealis, in hortis Europae saepius culta, e familia Lobeliacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule superne ramoso; foliis oblongis serrato-dentatis pilosiusculis, inferioribus obtusis, breviter petiolatis, superioribus acutis sessilibus; calice inflato; floribus racemosis; sepalis linearibus corollam aequantibus; capsula inflata rotunda; sapore primum debili, dein acri pungente.

Herba florens sicca ex America allata.

Tinctura Lobeliae paretur modo § 16. notato.

Nota. Herba sicca commercio mercatorio allata plerumque praefertur, tam-etsi planta apud nos culta vim medicamentosam tenet. E planta recente modo § 15. notato Essentia paretur.

Lolium.

Laumelloch. Darwel. Ivraie.

Lolium temulentum L., planta annua, e familia Graminearum spicatarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: radice annua fibrosa; caule superne scabro; spiculis glumam subaequantibus; floribus longe aristatis.

Spicae fructuariae maturae plantae in agris avena consitis (mense Augusto) collectae.

Essentia Lolii modo § 15. notato paretur.

Lupulus.

Strobuli s. Coni (s. Coni) Lupuli. *Gepfen. Common hop. Houblon.*

Humulus Lupulus L., planta perennis, frequenter culta, e familia Urticearum, trib. Cannabinearum. Differt: caule dextrosum volubili, foliis oppositis 3—5 lobis, supra scabris, subtus resinoso-punctatis, superioribus alternis et saepe integris; floribus femineis amentaceis.

Amenta fructuaria recentia, constantia ex achaeniis (caryopsidibus) obsitis granulis resinoso-amaris (Lupulino), et ex squamis sive bracteis ovatis, laxe imbricatis viridescens. Colliguntur mensibus Augusto et Septembri.

Essentia Lupuli paretur modo § 15. notato.

Lumbricinum.

Spulwurm. Maw-worm; Round worm. Strongle.

Ascaris lumbricoides L. vermis intestinalis ex ordine Nematodeorum (Enhelminthium), saepe per anum nec non per os hominum exiens. Differt ab aliis vermibus: cauda obtusa; rima ani transversa; intestino aurantio; sulco in quoque latere.

Vermis totus vivus.

Potentiatur aequali modo quo Ascaridinum.

Nota. Lumbricinum canum et felum sunt *Ascarides lumbricoides* canum et felum.

Lycoctonum.

Aconitum Lycoctonum. Gelfer Sturmhut.

Aconitum Lycoctonum L., planta perennis Europae

borealis et alpium Germaniae, e familia Ranunculacearum (Aconitearum). Differt ab aliis speciebus sui generis: floribus plerumque citrinis, calcaribus filiformibus circinatim convolutis, casside conico-cylindracea elongata calycis decidui; foliis saepe pilosiusculis palmatis, laciniis trifidis dentatis; radice fibrosa.

Planta florescens tota (mensibus Julio et Augusto) recens collecta.

Essentia Lycoctoni s. Aconiti Lycoctoni paretur modo § 14. notato.

Lycopodium.

Semen Lycopodii. Bärlappsfamen. *Earthmoss-seed. Lycopode.*

Lycopodium clavatum, complanatum, annotinum L., plantae perennes in silvis sterilibus Europae, e familia Lycopodiacearum.

Semina (spora) sicca (mensibus Augusto et Septembri collecta). Sint tenerrima, Aquae innatantia nec miscibilia, accensa sine fumo resinoso deflagrantia.

Tinctura Lycopodii paretur modo § 16. notato e seminibus, quae in mortario porcellaneo tamdiu contrita sunt, donec massam grumulosam humidam praebuerint.

Nota. Contritiones ob oleum pingue, quod semina continent, rarius efficiuntur. Si poscuntur, modis §§ 6. et 11. notatis parandae sunt.

Maculahepatinum.

Macula hepatica. Leberfleck. *Freckle.*

Cuticula recens maculae hepaticae aut sponte soluta aut scapello subsecta.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis parantur.

Magnesia carbonica.

Magnesia alba. Magnesia (kohlen-saure). *Subcarbonate of magnesia. Souscarbonate de magnésie.*

Pulvis subtilior levissimus albissimus, in Aqua vix solubilis, in Spiritu vini insolubilis, constans e Magnesia carbonica, Magnesia et Aqua.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Magnesia sulphurica.

Sal amarum s. Anglicum. Schwefelsaure Bittererde; Bittersalz. *Sulphate of magnesia. Sulfate de magnésie.*

Sal neutrum in crystallis prismaticis acicularibus splenden-

tibus, in aëre fatiscantibus, coloris expers, saporis amari refrigerantis, in partibus tribus Aquae, non in Spiritu vini solubile, constans e Magnesia, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{MgO}, \text{SO}^3 + 7\text{HO}$).

Dilutio prima Aqua, secunda Aqua spirituosa, tertia Spiritu vini diluto etc. (conf. § 9.) efficiuntur.

Magnesium chloratum.

Magnesia muriatica. *Chlormagnesium. Chloride of magnesium. Chlorure de magnésium.*

Sal neutrum pulvereum crystallinum album, in aëre humescens, in Aqua facile, nec non in Spiritu vini solubile, constans e Magnesia, Chloro et Aqua ($=\text{MgCl} + 6\text{HO}$).

Dilutio prima Aqua, secunda Spiritu vini rectificato, sequentes dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Magnesium chloratum.

Rp. *Acidi hydrochlorici puri (pond. spec. 1,120) P. triginta (30), Aquae destillatae P. decem (10).*

Mixtis et calefactis paulatimingere

Magnesiae carbonicae P. novem et dimidiam (9½), vel quantum requiritur ad perfectam neutralisationem Acidi. Liquor refrigeratus filtretur, filtrum Aquae paulo eluendo, et calore balnei vaporis evaporet, donec P. viginti (20) supersint, aut donec portiuncula exenta semirefrigerata appareat sicca. Massa semirefrigerata contrita statim in lagenam siccam, epistomio suberino exacte claudendam, ingeratur et asservetur.

Majorana.

Mayran. Majoram. Marjolaine.

Origanum Majorana L., planta annua Africae septentrionalis et Europae meridionalis, ubique in hortis culta, e familia Labiatarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis ovalibus obtusis integerrimis, junioribus incano-tomentosis; spicis subglobosis ternatis sessilibus; bracteis subrotundis tomentosis.

Spicae florentes cum foliis caulinis, recentes, mense Julio collectae.

Essentia Majoranae modo § 15. natato paretur.

Manganum aceticum.

Manganesium aceticum. Effigsaures Manganoxydul. *Protoacetate of manganese. Protoacétate de manganèse.*

Sal pulvereum crystallinum albidum vel in crystallulis rhombicis pellucidis, parum rubentibus vel coloris expertibus, saporis metallici. Solubile in Aqua, nec non in Spiritu vini, constans e Mangano oxydulato et Acido acetico ($=\text{MnO}_2$). Sal rubellum rejiciatur.

Dilutio prima Aqua spirituosa, secunda Spiritu vini diluto, sequentes dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur. Dilutiones per longius tempus ne asservantur. Dilutiones e rubro fuscæ rejiciantur.

Manganum aceticum.

Rp. *Acidi acetici diluti vel Aceti concentrati (pond. spec. 1,040)*
P. viginti (20).

Calefactis inter agitationem et paulatim injice

Mangani carbonici recens præcipitati

quantitatem sufficientem, quæ solvitur. Liquor filtratus leni calore balnei vaporis ad siccum evaporet, aut cuticula salina apparente ad crystallisationem seponatur. Crystalla premendo inter strages chartæ bibulæ et loco tepido quam celerrime siccantur. In lagenis bene obturatis serva.

Manganum carbonicum.

Manganesium carbonicum. Kohlensaures Manganoxydul. *Protocarbonate of manganese. Protocarbonate de manganèse.*

Pulvis tener albidus, neque in Aqua neque in Spiritu vini solubilis, e Mangano oxydulato, Acido carbonico et Aqua constans, qui tantum vestigia Mangani oxydati continet.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis parentur.

Manganum carbonicum.

Rp. *Mangani hyperoxydati depurati pulverati* P. decem (10).
Solve sub divo digerendo ope lenis caloris in
Acidi hydrochlorici puri (pond. spec. 1,120) P. sexaginta (60).

Chloro perfecte expulso, liquor filtretur et

Aquæ destillatæ fervidæ volumine æquali
diluatur. Liquori instilla solutionem filtratam paratam e

Natri bicarbonici P. sedecim (16) et

Aquae destillatae tepidae P. ducentis (200).

Tum sepone loco calido per aliquot horas et decanta. Affundendo Aquam calidam et decantando, quod saepius repetatur, sedimentum eluatur, tandem in filtro collectum exprimatur et inter strages chartae bibulae loco tepido quam celerrime siccetur. Contritum in lagenis bene obturatis servetur.

Nota. Cave ne Natrum inter praecipitationem praevaleat.

Manganum hyperoxydatum.

Manganum superoxydatum; Manganesium oxydatum nativum. Braunnstein; Manganhypéroxyd. *Peroxyde of manganèse. Peroxyde de manganèse.*

Minerale e griseo nigrescens subsplendens durum, texturae crystallinae radiatae, constans e Mangano et Oxygenio ($=\text{MnO}_2$). Neque Aqua, neque Spiritu vini solvitur. Non nisi depuratum adhibeatur.

Contritiones et dilutiones parentur modis §§ 6. et 11. notatis.

Manganum hyperoxydatum depuratum.

Rp. *Mangani hyperoxydati nativi* P. quindecim (15).

Pulveratis et in cucurbitam vitream immissis affunde

Acidi hydrochlorici crudi P. decem (10),

Aquae communis P. triginta (30).

Digere leni calore sub divo per aliquot horas. Tum, affusa Aquae calidae quantitate majore, sedimentum decantando collige, Aquam ablue et in cucurbitam remitte. Affusis

Acidi nitrici crudi P. quinque (5) et

Aquae communis P. decem (10),

iterum digere per aliquot horas. Tandem sedimentum Aquam bene ablue et sicca.

Marum verum.

Marum. Saßengamander; Amberkraut. *Germander. Germandrée maritime.*

Teucrium Marum L., fruticulus Europae calidioris, saepe in hortis et hibernaculis cultus, e familia Labiatarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis parvis ovatis integerrimis, in margine revolutis, subtus albido-tomentosis; anthuris laxis secundis; calyce hirsuto.

Planta floescens recens radice resecta. Colligitur mensibus Junio et Julio.

Essentia Mari veri paretur modo § 15. notato.

Mastocarcinominum.

Brustkrebseiter.

Sanies e cancro mammarum. Distinguuntur Mastocarcinominum simplex et Mastocarcinominum cum tela cellulosa.

Potentiatur eodem modo quo Alveolinum.

Medorrhinum.

Tripperschleim.

Materia mucosa in gonorrhoea syphilitica ex urethra evadens.

Potentiatur eodem modo quo Alveolinum.

Meletinum.

Materia nigra in vomitu cruento ejecta.

Potentiatur eodem modo quo Alveolinum.

Meloë.Maimurm. *Oil-beetle; May-worm. Scarabé onctueux.*

Meloë proscarabaeus L. s. Meloë violaceus Marsh. insectum coleopterum Europae, e familia Heterolytrorum.

Insectum violaceum elytris abdomine brevioribus, rugulosis, pedibus et antennis nigrescentibus, ad 3 centim. circiter longum, ad 1 centim. latum, attactu ex articulis, praecipue e geniculis pedum succum flavum emittens. Mense Majo in agris reperitur. Ope volsellae capiatur et statim in Spiritum vini injiciatur.

Tinctura Meloës paretur e Meloës recentis parte una et Spiritu vini rectificatissimi partibus decem modo § 16. notato.

Menyanthes.Trifolium fibrinum. Bitterflœe. *Buckbean. Trêfle des marais.*

Menyanthes trifoliata L., planta perennis palustris Europae, e familia Gentianearum. Differt: corolla pallide rosea infundibuliformi quinquefida, intus alba floccoso-barbata; foliis alternis ternatis.

Planta tota florens, mensibus Majo et Junio collecta.

Essentia Menyanthae paretur modo § 14. notato.

Mephitis.Stinkthier. *Skunk; Pol-cat. Mouffette.*

Mephitis Putorius s. Viverra putoria, fera Ame-

ricae, e familia Sanguinariorum, ex ordine Glirium, insignis dorso nigro, lineis quinque dorsalibus parallelis albis; rostro longo; cauda longa pilis vestita; glandulis duabus, sub radice caudae prope anum positis, ductu excretorio in intestinum rectum exunte praeditis, succo maxime foetente repletis.

Succus recens glandularum foetentium.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Tinctura Mephitis paretur commiscendo succi foetentis partem unam cum Spiritus vini diluti partibus duabus et agitando.

Mercurialis perennis.

Bingelfraut. *French Mercury. Mercuriale; Foirole.*

Mercurialis perennis L., planta Europae, in silvis et locis umbrosis et montosis frequens, e familia Euphorbiacearum. Differt radice perenni repente; caule adscendente simplicissimo; foliis ovatis scabriusculis.

Planta tota florens recens. Colligitur mense Majo.

Essentia *Mercurialis* paretur modo § 14. notato.

Metrorrhaginum.

Gebärmutterblutfluß.

Sanguis in metrorrhagia ex utero effluens.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Mezereum.

Seidelbast. *Mezereon. Bois gentil; Laureole femelle.*

Daphne Mezereum L., frutex in silvis et nemoribus Europae frequens, e familia Thymelaeae. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis glabris obverse oblongis deciduis; floribus roseis praecocibus lateralibus sessilibus (subternis).

Cortex recens, ante florescentiam (mensibus Februario et Martio) e truncis ramisque validioribus collectus.

Essentia *Mezerei* e cortice inciso et contuso modo § 15. notato paretur.

Millefolium.

Schafgarbe. *Common yarrow. Mille feuille; Herbe au charpentier.*

Achillea Millefolium L., planta perennis frequens, e familia Compositarum, trib. Anthemidearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule angulato corymboso villosa; foliis bipinnatifidis, rhachi (petiolo communi) edentata.

Planta tota floescens recens. Colligitur mensibus Majo et Junio.

Essentia Millefolii paretur modo § 14. notato.

Millepes.

Asellus; Oniscus. Kelleraffel. Woodlouse; Hoglouse. Cloporte; Porcellion.

Oniscus Asellus L., insectum isopodum in rimis et locis obscuris et humidis frequens e familia Pterygibranchiorum, insigne corpore ovali; cauda obtusa cum appendicibus inaequalibus; maculis flavidis seriatim dispositis in lateribus.

Insectum vivens.

Tinctura Millepedum ex insecto contuso modo § 16. notato paretur.

Molybdaenum sulphuratum.

Molybdaena. Zweifach Schwefelmolybdän. Protosulfide of molybden. Proto-sulfure de molybdène.

Minerale lamellosum chalybeo-griseum splendoris metallici, neque in Aqua neque in Spiritu vini solubile, Graphitae omnino simile, a quo differt compositione e Molybdaeno et Sulphure (= MoS_2). Linea hoc sulphureto in porcellana alba vitreata scripta est coloris e viridi fuscii. A lapidibus et massa terrea intermixtis liberatum adhibeatur.

Contritiones et dilutiones parantur modis §§ 6. et 11. notatis.

Morbillinum.

Maserschuppen.

Substantia epidermidis farinacea vel squamatim abscedens in stadio desquamationis morbillorum.

Potentiatur eodem modo quo Condylominum.

Morphinum.

Morphium. Morphin. Morphia. Morphine.

Alcaloides ex Opio. Crystallula prismatica, coloris expertia, saporis amari, reactionis alcalinae, in Aquae partibus 1200, in Spiritus vini rectificatissimi partibus 40 solubilia. Igne comburantur residuo non remanente.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur. Interdum tantum dilutiones in promptu habentur. Dilutio prima solvendo partem unam Morphini in partibus 49 Spiritus vini rectificatissimi, dilutio secunda commiscendo hujus solutionis et Spiritus vini partes aequales efficiendae sunt.

Morphinum aceticum.

Morphium aceticum. Effigjaures Morphin. *Acetate of morphia. Acétate de morphine.*

Sal amorphum albidum pulvereum peramarum neutrum, in Aquae partibus 20, in Spiritus vini rectificatissimi partibus 70 solubile, constans e Morphino, Acido acetico et Aqua ($=\text{Mph}^+\text{A} + \text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis parantur.

Morphinum hydrochloricum.

Morphium muriaticum. Chlorwasserstoffjaures Morphin. *Hydrochlorate of morphia. Hydrochlorate de morphine.*

Sal neutrum in crystallulis parvis acicularibus nitentibus, coloris expers, peramarum, in Aquae partibus 20, in Spiritus vini rectificatissimi partibus 60 solubile, constans e Morphino, Acido hydrochlorico et Aqua ($=\text{Mph}^+\text{HCl} + 6\text{HO}$).

Potentiatur aequali modo quo Morphinum aceticum.

Morphinum sulphuricum.

Morphium sulphuricum. Schwefelsjaures Morphin. *Sulphate of morphia. Sulfate de morphine.*

Sal neutrum in crystallulis prismaticis acicularibus, nitoris margaritacei, peramarum, in Aqua nec non in Spiritu vini facile solubile, constans e Morphino, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{Mph}^+\text{SO}_3 + 6\text{HO}$).

Potentiatur aequali modo quo Morphinum.

Moschus.

Moschus Tunquinensis. Moschus; Bijam. *Musk. Musc.*

Moschus moschiferus mas, animal bisulcum, e familia Cervinorum, quod montes Asiae mediae inhabitat, insigne folliculo in ventre prope genitalia et pone praeputium posito, substantia odoris gravissimi subunctuosa, quae Moschus dicitur, repleto.

Moschus Tunquinensis vel Tibetanus, qui semper praeferatur, adfertur in folliculis siccatis, ponderis 10 ad 18 Grammat., rotundo-oblongis, ovum columbinum circiter magnis, hinc convexis, inde planis, plus minusve turgidis, obsitis in latere convexo et circa ductum excretorium (in medio positum) pilis rigidis crassis brevioribus rarioribus adpressis subfuscescentibus. Substantia in folliculis sit odoris singularis gravissimi, saporis pe-

netrantis aromatico-amaricantis, subunctuosa, granuloso-grumosa, e fusco nigra, globulis perpaucis variae magnitudinis et cuticulae segmentis nec non pilis tenerrimis intermixta, magis autem siccata substantia punctis subresinosis lucidis flavidis micans.

Substantia haec ab illis pilis et partibus membranaceis liberata est Moschus medicamentosus. Servetur in lagena optime obturata, inclusa in olla e lamina ferrea confecta.

Tinctura Moschi paretur macerando e Moschi triti parte una et Spiritus vini diluti partibus viginti.

Saepe Moschus modis § 6. et 11. notatis potentiatur.

Nota I. Praeparata e Moscho et contritiones dilutionesque semper extra pharmacopolium efficienda sunt. Vasa quoque, mortaria etc., quae parationibus moschigeris inserviunt, a reliquis separentur.

Nota II. Moschus Cabardinicus rejiciatur, qui affertur in felliculis plerumque majoribus, oblongis, obsitis pilis minus adpressis, densis, longioribus, ex albedo argenteis. Rejiciatur etiam Moschus sic dictus e vesicis.

Murex.

Murex inflatus; Murex purpureus. *Purpurschnecke. Purple. Pourpre.*

Muricis variae species, cochleae in Mari mediterraneo frequentes, ex ordine Gasteropodum et e familia Siphonobranchiorum vel Purpuriferorum, insignes: testa univalvi, ovali vel oblonga, spirali exasperata suturis membranaceis, apertura desinente in canalem rectum integrum elongatum; operculo corneo.

Liquor, quo folliculus inter cor et hepar Muricis positus repletus est, recens coloris fere expers, attactu aëris purpurascens, in Aqua nec non in Spiritu vini parum solubilis.

Contritiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur.

Myrtus.

Myrte. Myrtle. Myrte.

Myrtus communis L., frutex Europae meridionalis, saepius in hortis et hibernaculis cultus, e familia Myrtacearum, insignis: foliis ovatis lanceolatisve acutis lucidis; pedunculis solitariis unifloris, sub flore bracteolis binis linearibus deciduis; calyce quinquepartito, floribus albis.

Folia recentia fruticis florentis. Mensibus Julio et Augusto colliguntur.

Essentia Myrti modo § 15. notato paretur.

Naja tripudians.

Brillenschlange. *Spectacle-snake. Serpent à lunettes.*

Naja tripudians s. *Coluber Naja*, anguis magna, e familia *Viperarum*, in regionibus calidis Asiae et Americae frequens, insignis: signatura perspicillo simili in collo.

Mucus venenosus dentium venenatorum.

Potentiatur aequali modo quo *Alveolinum*.

Natrium chloratum.

Natrum muriaticum; *Natrum hydrochloricum*; *Sal culinare*. Kochsalz; Chlornatium. *Chloride of sodium. Chlorure de sodium.*

Sal album neutrum in crystallulis hexaëdris, in aëre vix humescentibus, in *Aquae* partibus tribus, parum in *Spiritu vini* solubile, constans e *Natrio* et *Chloro* (=NaCl).

Potentiatur aequali modo quo *Ammonium chloratum*.

Natrium chloratum.

Rp. *Salis culinaris q. s.*

Solve in

Aquae fervidae

quantitate quintuplici. Liquori adhuc ferventi instilla

Natri carbonici soluti q. s.,

donec non amplius turbetur. Liquorem seponere et refrigeratum filtra, tum admixta

Acidi hydrochlorici puri

quantitate sufficiente, ut liquor sit neuter, evaporando in cry-
stalla coge, quae siccentur. Lixivium ultimum rejiciatur.

Natrium sulphuratum.

Natrum sulphuratum. Schwefelnatrium. Sulphide of sodium. Sulfure de sodium.

Sulphuretum siccum amorphum, e subviridi fuscum vel flavum, saporis amari alcalini hepatici, odorem debilem gasis *Acidi hydrothionici* exhalans, in *Aqua* facile, nec non ex parte in *Spiritu vini* solubile, e *Natrio* et *Sulphure* maximam partem constans.

Dilutio prima solvendo partem unam *Natrii sulphurati* in partibus novem *Spiritus vini* diluti et decantando efficitur, secunda *Spiritu vini* rectificato, sequentes *Spiritu vini* rectificatissimo. Dilutiones recens parandae sunt.

Natrium sulphuratum.

Rp. *Natri carbonici sicci s. dilapsi* P. tres (3),

Sulphuris sublimati loti P. duas (2).

Mixtae in crucibulo porcellaneo leni igni exponantur, donec effervescentia peracta in massam homogineam coëant, quam effusam et refrigeratam in pulverem grossum redige. Statim in lagenulas optime claudendas ingeratur. Non nisi parvae quantitates parentur.

Natrum carbonicum.

Natrum. Kohlenſaures Natron; Soda. *Carbonate of soda. Carbonate de soude.*

Sal in crystallis pellucidis, coloris expertibus, in aëre fatiscientibus, saporis alcalini, in Aquae partibus duabus, neque in Spiritu vini solubile, constans e Natro, Acido carbonico et Aqua ($=\text{NaO}, \text{CO}_2 + 10\text{HO}$).

Dilutio prima et secunda Aqua, tertia Spiritu vini diluto, quarta Spiritu vini rectificato, sequentes dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Natrum nitricum.

Natrum cubicum. Salpeterſaures Natron. *Nitrate of soda. Azotate de soude.*

Sal neutrum in crystallis rhomboideo-cubicis, coloris expertibus, in Aquae partibus duabus solubile, neque in Spiritu vini, constans e Natro et Acido nitrico ($=\text{NaO}, \text{NO}^5$).

Potentiatur aequali modo quo Natrum carbonicum.

Natrum sulphuricum.

Schwefelſaures Natron; Glauberſalz. *Sulphate of soda. Sulfate de soude.*

Sal neutrum in crystallis pellucidis prismaticis hexagonis vel octagonis, in aëre fatiscientibus, coloris experts, in Aquae partibus tribus, in Spiritu vini vix solubile, constans e Natro, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{NaO}, \text{SO}^3 + 10\text{HO}$).

Potentiatur aequali modo quo Natrum carbonicum.

Nephraposteminum.

Sanies abscessus renum (apostematis renum).

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Nephrolithinum.

Nierenstein.

Calculi renales, concretiones in nephrolithiasi exortae.
 Potentiantur aequali modo quo Corallium.

Niccolum.Nickel. *Nickel.*

Metallum Argento simile, pond. spec. circiter 9,0. Sit liberum ab Arseno, Cobalto, Ferro.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis et metalli limatura efficiuntur.

Nota. Si Niccolum purum non reperitur, e Niccolo oxalico ustione fortiore paretur. Niccolum oxalicum e solutione Niccoli carbonici in Acido hydrochlorico praecipitando ope Kali oxalici efficitur.

Niccolum carbonicum.Kohlenfaures Nickelorydul. *Carbonate of nickel. Carbonate de nickel.*

Pulvis tener subtilis e griseo viridulus, neque in Aqua neque in Spiritu vini solubilis, constans e Niccolo oxydulato, Niccolo oxydulato hydrato, Acido carbonico et Aqua ($=2[\text{NiO}, \text{CO}^2] + 3[\text{NiO}, \text{HO}] + 2\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modo §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Niccolum carbonicum.**Rp.** *Niccoli metallici venalis* P. decem (10).

In cucurbitam vitream caute immissis affunde paulatim

Acidi nitrici puri (pond. spec. 1,2) P. octoginta (80).

Digere leni calore, Acidum nitricum paulatim adhuc addendo, donec metallum fere solutum sit. Liquor, admixta parte una Niccoli metallici, calore balnei arenae ad perfectam siccitatem redigatur. Residuo in

Aquae destillatae P. centum et viginti (120)

soluta et filtrata fervefactoque instilla liquorem calidum, paratum e

Natri carbonici cryst. P. quinquaginta (50) et

Aquae destillatae P. centum quinquaginta (150).

Praecipitatum inde exortum bene elotum, adhuc humidum, solvatur in

Acidi hydrochlorici puri (pond. spec. 1,120) P. quinquaginta (50)

vel quantum requiritur, ut Acidum parum praevaleat. In hanc solutionem, aqua dilutam, inducatur

Gas Acidi hydrosulphurici,

donec liquor eo saturatus sit, sepone per aliquot horas et filtra. Liquor tunc coquatur, post refrigerationem filtretur, in lagenam (ad partes tres e quatuor replendam) ingeratur et

Gase Chlorig

exacte saturetur. Additis

Barytae carbonicae P. duabus (2),

sepone per diem, saepius agitando. Liquori filtrato instilla

Acidi sulphurici diluti q. s.,

ut Baryta soluta praecipitetur. Filtratione facta, liquori limpido instilla solutionem paratam ex

Natri carbonici cryst. P. quadraginta octo (48) et

Aquae destillatae P. centum et quadraginta quatuor (144)

vel quantum satis hujus solutionis, donec Natrum parum praevaleat. Praecipitatum inde exortum Aqua calida ablue et loco calido inter strages chartae bibulae sicca.

Nux moschata.

Muskatnuß. Nutmeg. Noix de Muscade.

Myristica moschata Thunb., *Myristica aromatica* Lam., arbor insularum Moluccarum, e familia Myristicarum.

Semina (nuclei) siccata subglobosa duriuscula ponderosa (pond. spec. 1,092—1,102), circiter 2 centim. magna, extus e cinereo fusca reticulato-rugosa, intus subfusco-albida, venis et striis luteis et e rubro-fuscis variegata, odoris et saporis aromatici noti.

Tinctura Nucis moschata paretur modo § 16. notato.

Nux vomica.

Brechnuß. Poison nul. Noix vomique.

Strychnos nux vomica L., arbor Ceylanica et Malabarica, e familia Strychnearum (Apocynearum).

Semina sicca inodora amarissima orbicularia compressoplaina, in margine nonnihil crassiora, grisea, tenaciora, circiter 2 centim. lata, 3—4 millim. crassa, umbilicata, villis e flavo fuscescentibus splendentibus mollibus obsita; minutim concidendo, tum loco tepido siccando, tandem contundendo in pulverem redigenda sunt.

Tinctura Nucis vomicae paretur modo § 16. notato.

Nymphaea lutea.

Nuphar luteum. Gelbe Wasserlilie; Nixblume. *Yellow water-lily.*

Nénuphar jaune.

Nuphar luteum Smith, planta perennis Europae, in stagnis frequens, e familia Nymphaeacearum, insignis: sepalis quinque, petalis fovea nectarifera dorsali instructis; stigmatibus peltato radiante excavato; foliis ovalibus, profunde cordatis; petiolorum pedunculorumque pilis internis; floribus luteis; radice magna longa, crassitie brachii, intus alba carnosio-spongiosa, extus gibbosa e flavo fusca.

Radix recens, mense Junio collecta.

Essentia Nymphaeae luteae paretur modo § 14. notato.

Odontonecrosinum.

Zahnseker Zahn.

Dens necrosi (carie sicca) ex parte corruptus.

Potentiatur aequali modo quo Corallium.

Odontosyringinum.

Zahnstiftleiter.

Materia purulenta in fistula dentaria (odontosyringe).

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Oenanthe.

Giftige Nebenwölfe. *Yellow Dropwort. Oenanthe jaune.*

Oenanthe crocata L., planta palustris perennis Europae, e familia Umbelliferarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule terete dense sulcato; foliis supradecompositis, foliolis cuneiformibus crenato-incisis; radice alba tuberoso-napiformi, repleta succo albido, attactu aëris flavescente, viroso.

Radix aestate collecta, aut recens aut siccata.

Essentia Oenanthes e radice recente modo § 14. notato.

Tinctura Oenanthes e radice siccata modo § 16. notato parentur.

Oipodopurinum.

Klaunseckeneiter.

Materia purulenta in claudicatione epizootica vel peste exungulante ruminalium ex ungulis secreta.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Oleander.

Nerium. Oleander. *Oleander*; *Rose-laurel*. *Laurier-rose*; *Laurose*.

Nerium Oleander L., frutex Europae et Asiae calidioris, Africae septentrionalis, saepe in hortis et hibernaculis cultus, e familia Apocynearum, insignis: corolla hypocraterimorpha, fauce squamis lacero-multifidis aucta, alba vel saturate rosea; foliis ternis lanceolatis coriaceis, subtus venosis, supra lucidis.

Folia recentia fruticis floescentis, mensibus Junio et Julio collecta.

Essentia Oleandri modo § 15. notato paretur.

Oleum animale (aethereum).

Oleum Cornu Cervi rectificatum; Oleum Dippelii. Aetherisches Thieröl. *Volatil animal oil*. *Huile animale volatile*.

Oleum aethereum, coloris plane expers, inflammabile, destillatione ex Oleo animali foetido effectum. Oleum fuscescens rejiciendum est. Serva in lagenulis obturatis a luce remotis.

Dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur, fuscescences rejiciantur.

Oleum Jecoris Aselli.

Leberthran. *Liver-oil*. *Huile de foie de Morue*.

Gadus Morrhua et variae species Gadi, pisces ex ordine Sternopterygiorum, e familia Orthosomatum.

Oleum pingue fluidum pellucidum flavum vel e flavo fuscum, saporis mitis, e jecore Gadorum ope aquae vaporum eliquatum et expressum.

Dilutio prima ope Aetheris, secunda Spiritu vini absoluto, dilutiones subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Oleum Terebinthinae.

Terpenthinöl. *Turpentine-oil*. *Huile de Térébinthine*.

Oleum aethereum coloris expers, limpidum, plane volatile. Rectificatione ex Oleo Terebinthinae Gallico paratur.

Dilutio prima Spiritu vini absoluto, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Ophiotoxicon.

Echlangengift. *Venom of serpents*. *Venin de serpent*.

Liquor flavidus glandularum venenatarum anguium vario-

rum ex America, plerumque paulo Spiritus vini commixtus, affertur.

Potentiatur aequali modo quo *Lachesis*.

Ononis.

Sanhechel. Restharrow. Bugrane.

Ononis spinosa L., planta perennis Europae, e familia Leguminosarum Lotoidearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caulibus ramisque spinosis, unifariam pilosis.

Radix recens, digitum minorem et amplius crassa, longa cylindrica ramosa tenax, epidermide e ferrugineo fusca, ligno crasso albedo. Colligitur vere ante florescentiam.

Essentia Ononidis modo § 15. notato paretur.

Opium.

Laudanum; Meconinum; Succus Thebaicus. Opium. Opium.

Papaver somniferum L., planta annua in Asia minore indigena, e familia Papaveracearum.

Opium, succus inspissatus capsularum immaturarum plantae illius, ex Oriente affertur. Sit massa in placentis e fusco rubellis, hinc inde plus minusve subflavis, siccis, in medio parum mollibus et tenacibus, digitis tractata mollescens, structurae lacrymis minutis dense compressis distinctae, odoris satis nauseosi narcotici, saporis peracris amari. Opium Levanticum solummodo adhibeatur. Contineat minimum ad 10 partes Morphini in partibus 100.

Tinctura Opii ex Opio loco tepido siccato et pulverato ope Spiritus vini diluti modo § 16. notato paretur.

Oreoselinum.

Athamanta; Peucedanum; Petroselinum montanum. Bergpeterfille.

Mountain-parsley.

Peucedanum Oreoselinum Cusson, *Selinum Oreoselinum* Scop., s. *Athamanta Oreoselinum* L., planta perennis Europae, e familia Umbelliferarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis tripinnatipartitis, ramificationibus petioli (ramastris) refracto-divaricatis; foliolis remotis ovatis pinatifido-incisis nitidis; floribus albis.

Folia radicalia, mense Majo et primo mense Junio collecta.

Essentia Oreoselini paretur modo § 14. notato.

Otorrhinum hominum.

Ohrenausfluß des Menschen.

Liquor purulentus effluens ex auribus hominum.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Distinguuntur: Otorrhinum hominum auribus captorum (surdorum) et auribus non captorum, Otorrhinum morbillorum et Otorrhinum scarlatinae.

Ozaeninum.

Ozaeninum hominum cum carie. Nasengeschwürreiter.

Sanies ex ozaena cum carie conjuncta.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Paeonia.

Gichtrose, Päonie. *Common Paeony. Pivoine.*

Paeonia officinalis L. s. *Paeonia peregrina* Miller, planta perennis Europae, in hortis saepe culta, e familia Ranunculacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: radice fibris tuberoso-incrassatis, moniliformi-ordinatis; floribus purpureis; foliis bi- vel triternatis vel ternato-sectis, supra nitidis, subtus pallidis.

Tubera fibrarum radice recentia, extus fusca, intus albida, vere collecta.

Essentia *Paeoniae* modo § 14. notato paretur. Sit coloris parum purpurascens et servetur a luce remota. Quotannis recens paranda est.

Paris.

Eingebeere. *True-love. Parisette.*

Paris quadrifolia L., planta perennis in silvis umbris humidisque Europae, e familia Smilacinearum, insignis: flore terminali solitario, perigonio patentissimo octophyllo, phyllis 4 exterioribus calycem, 4 interioribus angustioribus corollam referentibus; staminibus 8, antheris medio filamentorum adnatis; caule simplici; foliis quaternis sessilibus.

Planta florens tota, mensibus Majo et Junio colligenda.

Essentia *Paridis* paretur modo § 14. notato.

Parotidipurinum.

Ohrdrüsenreiter.

Sanies parotidis post anginam vel inflammationem parotidum secreta.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Petroleum.Steinöl. *Petroleum. Pétrôle.*

Oleum bituminosum rectificatione depuratum.

Oleum volatile, coloris expers, limpidum, parum iridescens, in partibus novem Spiritus vini rectificatissimi solubile.

Dilutio prima Spiritu vini alcoholisato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Petroselinum.Petersilie. *Parsleay. Persil.*

Petroselinum sativum Hoffm. s. *Apium Petroselinum* L., planta biennis Europae meridionalis, ubique in hortis culta, e familia Umbelliferarum. Differt ab aliis plantis umbelliferis similibus: petalis subrotundis integris (cum lacinula inflexa); fructibus ovatis, a latere contractis, costis filiformibus; caule angulato; foliis inferioribus longe petiolatis tripinnatipartitis, parum lucidis, subtus opacis, foliolis ovato-cuneatis mucronatis; involucellis filiformibus umbellula brevioribus; floribus viridentibus. *Aethusa Cynapium* L., qua planta saepe *Petroselinum* confunditur, differt: foliis infra nitidis, laciniis lanceolatis, involucellis dimidiatis pendulis umbellula longioribus; floribus albis.

Planta tota floescens (mense Junio) recens collecta.

Essentia *Petroselini* paretur modo § 14. notato.**Phellandrium.**Foeniculum aquaticum. Wasserfenchel. *Water-fennel. Phellandre; Fenouil d'eau.**Phellandrium aquaticum* L., planta perennis palustris Europae, e familia Umbelliferarum.Fructus (semen) maturus siccus, 4 millimetr. longus, oblongus, e viridi fuscus, utrinque dorso tricostato, segmentis calycinis stylisque persistentibus coronatus, e seminibus duobus (mericarpiis) compositus. Fructus *Cicutae virosae* et *Sii latifolii*, quibus confunditur, differunt forma subglobosa aut ovali et colore fusco. Fructus *Phellandrii* mense Septembri colliguntur.Tinctura *Phellandrii* paretur modo § 16. notato.**Phosphorus.**Phosphor. *Phosphor. Phosphore.*

Substantia, plerumque in baculis, compacta, lenta, recens alba

subpellucida, tum in superficie opaca, loco umbroso attactu aëris vapores lucentes exhalans, calore flammam concipiens, solubilis in Spiritus vini partibus 350 ad 400, in Aetheris partibus 120, insolubilis in Aqua. Sit ab Arseno nec non Sulphure liber.

Phosphorus aut Spiritu vini, aut Aethere solutus potentia-
tur. Dilutio spirituosa praeferenda est.

Phosphorus Spiritu vini solutus.

Rp. *Spiritus vini absoluti* P. ducentas (200).

Infusis in cucurbitam vitream minorem adijce

Phosphori P. unam (1).

Phosphoro calore balnei aquae calidae (40° C.) liquato, cucurbita leniter et caute agitur, donec Phosphorus in globulos minutos dilapsus sit, et agitatio pergatur, donec omnia refrigerata sint. Tum affunde

Spiritus vini absoluti

eam quantitatem, ut pondus liquoris et Phosphori partes quingentas (500) repleat. Cucurbita clausa per octo dies seponatur et saepius agitur, donec Phosphorus solutus sit. Liquor decantatus in lagenis plane repletis et epistomiis vitreis accurate clausis loco umbroso servetur. Signetur: Phosphorus $\frac{1}{500}$.

Dilutio tertia commiscendo solutionem hanc cum aequali volumine Spiritus vini rectificatissimi, subsequentes dilutiones diluendo dilutionem priorem cum Spiritus vini rectificatissimi volumine novemplici efficiuntur.

Phosphorus Aethere solutus. Aether phosphoratus.

Rp. *Aquae spirituosae* P. centum (100),

Phosphori P. unam (1).

Phosphorus eodem modo, qui supra notatus est, in globulos minutos dividatur. Liquore refrigerato a globulis decantato, Phosphoro affunde

Aetheris puri P. ducentas (200),

et macera per aliquot dies, cucurbita clausa, donec Phosphorus solutus sit. Hic Aether phosphoratus servetur eodem modo quo Phosphorus Spiritu solutus, et signetur: Phosphorus $\frac{1}{200}$.

Dilutio tertia commiscendo Phosphorum Aethere solutum cum quantitate quadruplici Spiritus vini rectificatissimi efficitur.

Phytolacca.

Scharlachbeere; Kermesbeere. *Porkweed; Porke physic. Morelle à grappes; Phytolaque; Epinard des Indes.*

Phytolacca decandra L., planta perennis Americae septentrionalis, Helvetiae et Germaniae meridionalis; saepe in hortis culta, e familia Phytolaccearum, insignis: foliis alternis exstipulatis oblongis ovalibusve mucronatis; racemis oppositifoliis; floribus rubentibus; baccis depresso-globosis violaceis, magnitudine pisi.

Folia recentia, mense Octobri collecta.

Essentia *Phytolaccae* modo § 14. notato paretur.

Pichurim.

Faba *Pichurim* major; Nuces *Sassafras. Pichurimboşne.*

Nectandra Puchury major Nees et Mart., arbor in Brasilia indigena. Nuclei (semina) siccati oblongi, circiter 3 centim. longi, 1,5 centim. lati, in partes duas (cotyledones) plerumque disjuncti, testa rugosa obtecti, duri, extus e flavo fuscis, intus e rubente flavi, odoris aromatici, qui Nucum moschatarum et corticis *Sassafras* odori similis est.

Tinctura *Pichurim* modo § 16. notato paretur.

Pimpinella.

Saxifraga. Bibernell. Burnet saxifrage. Petite saxifrage; Persil de bouc.

Pimpinella Saxifraga L., praecipue varietas *Pimpinella nigra* Willd., plantae perennes Germaniae, in locis siccis arenosis et saxosis frequentes, e familia Umbelliferarum.

Radix recens vere collecta, crassitie circiter digiti minoris, plerumque simplex, superne annulata, e fusco luteola, cortice spongioso albedo, ligno tenui, succo lacteo coerulescente repleta, saporis acris pungentis amariusculi.

Essentia *Pimpinellae* paretur modo § 15. notato.

Pinus silvestris.

Turiones Pini. *Fichtensprossen. Pine-strobiles. Echelons de pin.*

Pinus silvestris L., arbor Europae borealis, e familia Coniferarum, trib. Abietinearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis binis rigidis glaucis, strobilis pedunculatis recurvatis.

Gemmae recentes mense Majo collectae, squamis linearibus albidis membranaceis pruinosis.

Essentia *Pini silvestris* modo § 15. notato paretur.

Platinum.

Platina. Platin. Platina. Platine.

Metallum e chalybeo album, pond. spec. 21—23. Adhibetur metallum divisum, qui est pulvis e chalybeo griseus opacus.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Platinum divisum.

Rp. *Platini in filis* P. duas (2).

In cucurbitam immissis affunde miscelam paratam ex

Acidi nitrici puri P. quinque (5) et

Acidi hydrochlorici P. duodecim (12).

Coquendo et addendo paulatim quantitatem illius miscelae sufficientem solve, et liquorem leni calore fere ad siccum redige.

Residuo in Aqua soluto instilla solutionem concentratam

Ammonii chlorati,

quamdiu praecipitatum exoritur, quod filtrando separatum et siccatum in crucibulo porcellaneo fortiter excandescat.

Platinum bichloratum.

Platinum muriaticum. Platinchlorid. Deutochloride of platinum. Deutochlorure de platine.

Sal crystallinum e fusciscente rubrum, in Aqua et in Spiritu vini facile solubile, constans e Platino, Chloro et Aqua ($=\text{PtCl}_2 + 2[\text{?}]\text{HO}$).

Dilutio prima Spiritu vini rectificato, sequentes dilutiones Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Platinum bichloratum.

Rp. *Solutionis Platini, obtenti modo ad parationem Platini divisi supra notato, q. v.*

Leni calore in vase porcellaneo ad siccum evaporet.

Plumbum.

Plei. Lead. Plomb.

Metallum e griseo albidum coerulescens splendidum molle, pond. spec. 11,3. Adhibeatur Plumbum divisum s. praecipitatum, qui est pulvis plumbeo-griseus, opacus.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Plumbum divisum s. praecipitatum.

Paretur aequali modo, quo Cadmium praecipitatum (Pag. 53), e Plumbo acetico puro; sed pressio praecipitati plumbei evitetur. Serva in lagena bene obturata. Pulvis oxydo albedo inquinatus rejiciatur.

Plumbum aceticum.

Saccharum Saturni. *Essigsaures Bleioxyd. Acetate of lead. Acétate de plomb.*

Sal in crystallis acicularibus, coloris expertibus, nitentibus, subdiaphanis, in aëre fatiscentibus, in Aquae partibus duabus et in Spiritu vini rectificatissimi partibus octo solubile.

Dilutio prima Spiritu vini rectificato, dilutiones sequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Plumbum carbonicum.

Kohlensaures Bleioxyd. Carbonate of lead. Carbonate de plomb.

Pulvis ponderosus albissimus, e Plumbo oxydato et Acido carbonico constans ($=\text{PbO}, \text{CO}^2$), neque in Aqua neque in Spiritu vini solubilis.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Plumbum carbonicum.

Rp. *Plumbi acetici crystallisati* P. quatuor (4).

Solve in

Aquae destillatae P. quadraginta (40).

Liquori filtrato instilla solutionem filtratam, paratam e

Natri carbonici crystallisati P. tribus (3) et

Aquae destillatae P. triginta (30),

vel tantum hujus solutionis, quantum ad praecipitationem requiritur. Praecipitatum aqua elotum loco tepido siccetur.

Pneumolithinum.

Lungenstein.

Concrementa lapidea, quae interdum in pulmonibus reperiuntur. Potentiatur aequali modo quo Corallium.

Pneumophthisinum.

Lungenschwindsuchtsteiner.

Materia purulenta tussi exscreata (begma) in phthisi purulenta. Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Podocladinum.

Hornige Haut der Fußsohlen.

Epidermis crassa cornea plantae pedis.

Potentiatur modis §§ 6. et 11. notatis.

Podophyllum.

Schildförmiges Fußblatt; Maiapfel. *May-apple*; *Ducksfoot*. *Podophylle*.

Podophyllum peltatum L., planta perennis in America septentrionali indigena, interdum in hortis culta, e familia Papaveracearum, insignis radice tuberosa, fibris longis obsessa, extus fusca, intus e flavido alba; floribus albis campanuliformibus solitariis axillaribus; corolla 9petala, calyce 3sepalis; bacca uniloculari, e viridi lutea; foliis peltatis lobatis, grosse serratis.

Radix recens ante florescentiam collecta.

Essentia *Podophylli* paretur modo § 15. notato.

Podopyonium equorum.

Eiter aus dem Hufe der Pferde.

Sanies ex ulcere ungulae equi.

Potentiatur eodem modo quo *Alveolinum*.

Polypinum narium.

Nasenpolyp. *Polypus of the nose*. *Polype au nez*.

Substantia polypi narium.

Potentiatur aequali modo quo *Condylominum*.

Pothos foetidus.

Dracontium foetidum; *Symplocarpus (foetidus)*.

Pothos foetidus Jacq., *Dracontium foetidum* L., planta pratensis Americae septentrionalis, e familia Aroidearum.

Radix siccata cylindrica, digiti cassitie, extus e nigro-fusca, intus albida, fibris crassitie columbinae vel anserinae verticillatim obsessa; odoris *Asae foetidae* fere similis.

Tinctura *Pothi foetidi* paretur modo § 16. notato.

Prosopopurinum.

Eiternde Gesichtsbllüthen.

Materia purulenta vel bachiarum vel roseolarum saltantium vel papularum cutanearum faciei.

Potentiatur aequali modo quo *Alveolinum*.

Prunus Padus.

Padus. Faulfrische; Traubenfrische. *Service-berry.* *Putier.*

Prunus Padus L., arbor frutescens silvatica Europae, in hortis culta, e familia Amygdalearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: petiolo in apice biglanduloso, racemis pendulis vel nutantibus.

Cortex recens ex ramulis vere ineunte ante foliorum eruptionem collectus, non ultra tres millimetr. crassus, epidermide e viridi fusca, passim verrucis minimis albidis vel flaventibus obsessa, substantia corticali viridi, odoris Amygdalarum amararum.

Essentia Pruni Padi paretur modo § 15. notato.

Prunus spinosa.

Flores Acaciae nostratis. *Schlehdorn.* *Sloetree.* *Prunier épineux.*

Prunus spinosa L., frutex Europae, e familia Amygdalearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: ramis spinosissimis, ramulis pubescentibus; gemmis floriferis, 1—2 floris, singulis binis vel ternis.

Flores recentes, (e rosaceo) albi, non satis evoluti, mense Aprili tempestate sicca collecti, odoris debilis Amygdalarum amararum.

Essentia Pruni spinosae paretur modo § 15. notato.

Pulsatilla.

Mäckschelle. *Wind-flower.* *Pulsatille.*

Anemone pratensis L., planta perennis Europae mediae et borealis, e familia Ranunculacearum, trib. Anemonidearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis villosis, radicalibus bi- et tripinnatisectis, laciniis linearibus; phyllis involucri ternis, in basi connatis, digitomultipartitis; flore terminali pendulo atro-violaceo, phyllis companulato-conniventibus in apice reflexis, extrinsecus sericeis.

Planta tota floescens recens. Colligitur mense Aprili.

Essentia Pulsatillae modo § 15. notato paretur.

Pyoninum bubonum.

Buboneneiter.

Sanies bubonum. Distinguunt saniem bubonum venereorum et saniem bubonum non venereorum.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Pyoninum oculorum.

Augeneiter.

Materia purulenta, quae ophthalmiis variis secernitur. Distinguunt Pyoninum corneae, Pyoninum corneae syphiliticum etc. Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Ranunculus acris.Scharfer Hahnenfuß. *Acrid crowfoot. Renoncule acre.*

Ranunculus acer (vel *acris*) L., planta perennis pratensis, e familia Ranunculacearum, trib. Anemonidearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule erecto ramoso multifloro; foliis palmatim partitis, radicalibus longe petiolatis, summis sessilibus tripartitis, laciniis linearibus; pedunculis teretibus laevibus.

Planta tota floescens recens, crescens in pratis non nimis humidis. Colligitur mensibus Majo et Junio.

Essentia Ranunculi acris paretur modo § 14. notato.

Ranunculus bulbosus.Knolliger Hahnenfuß. *Bulbous rocted crowfoot. Renoncule bulbeuse.*

Ranunculus bulbosus L., planta perennis e familia Ranunculacearum, trib. Anemonidearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule erecto in basi bulboso-incrassato; pedunculis sulcatis; calice reflexo; foliis partitis.

Planta tota floescens recens, crescens locis minus humidis. Colligitur mensibus Majo et Junio.

Essentia Ranunculi bulbosi paretur modo § 14. notato.

Ranunculus Flammula.Flammula. Sumpfranunkel. *Smaller water crowfoot; Spear wort. Renoncule flammule.*

Ranunculus Flammula L., planta perennis palustris, e familia Ranunculacearum, trib. Anemonidearum. Differt ab aliis speciebus generis sui: caule adscendente vel declinato in basi saepe radicante; foliis subintegerrimis lanceolatis, radicalibus petiolatis; floribus luteis minoribus.

Planta tota floescens recens. Colligitur mensibus Majo, Junio et Julio.

Essentia Ranunculi Flammulae paretur modo § 14. notato.

Ranunculus repens.Kriechender Hahnenfuß. *Renoncule rampante.*

Ranunculus repens L., planta perennis, e familia Ranunculacearum, trib. Anemonidearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule stolonibus repentibus, foliis ternato-tripartitis, pedunculis sulcato-angulatis; calyce patente.

Planta tota florescens recens. Colligitur mensibus Majo et Junio.

Essentia Ranunculi repentis paretur modo § 14. notato.

Ranunculus sceleratus.Gifthañnenfuß. *Marsh crowfoot. Renoncule scélérate.*

Ranunculus sceleratus L., planta annua Europae, in locis paludosis vel humidis crescens, e familia Ranunculacearum, trib. Anemonidearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule erecto ramosissimo multifloro; foliis radicalibus petiolatis glabris quadripartito-trilobis, laciniis obovato-cuneiformibus; foliis superioribus subsessilibus tripartitis, laciniis integris lanceolatis; pedunculis sulcatis; calice reflexo; floribus lutescentibus parvis.

Planta tota florescens recens. Colligitur mensibus Junio et Julio.

Essentia Ranunculi scelerati paretur modo § 14. notato.

Raphanus.Rettig. Gartenrettig. *Radish. Rave.*

Raphanus sativus L., varietas niger, planta annua vel biennis in hortis culta, e familia Cruciferarum, trib. Raphanearum.

Radix recens magna carnosa duriuscula, extus nigra, intus alba, saporis acerrimi, mensibus Junio et Julio collecta.

Essentia Raphani paretur modo § 14. notato.

Ratanha.

Ratanhia. Ratanhawurzel.

Krameria triandra Ruiz et Pavon., fruticulus Peruvianus, e familia Polygalearum.

Radix sicca perdura subramosa elongata subcylindrica, digitum circiter crassa, rugosa, cortice e nigrescente rubro, intimo fibroso, ligno coloris cinnamomei, saporis adstringentis. Radix flavescens rejicienda est.

Tinctura Ratanhae paretur modo § 16. notato.

Rhagadinum.

Gautschunden.

Rhagades vel fissurae cutis. Distinguunt etiam Rhagades syphiliticas vel Rhagadinum syphiliticum.

Potentiatur aequali modo quo Condylominum.

Rheum.

Rhabarbarum. Rhabarber. Rhubarb. Rhubarbe.

Rhei species non certe notae, plantae perennes Chinae et regni Tibetani, e familia Polygonearum.

Radix Rhei Moscovitica s. Russica solummodo adhibenda est. Haec radix occurrit in segmentis variae magnitudinis. Est excorticata lutea, pulvere deterili conspersa, intus e rubro alboque variegata, sub dentibus stridens et facile emolliens.

Tinctura Rhei ope Spiritus vini diluti modo § 16. notato paretur.

Rhododendron.

Alpenrose. Yellow Rhododendron; Rosebay. Rose de Sibérie.

Rhododendron Chrysanthum L., frutex in alpibus Sibiriae habitans, e familia Ericearum.

Folia siccata coriacea rigida oblonga, in margine reflexa, in petiolum brevem decurrentia, integerrima, ad 5 centimetr. longa, ad 2—2,5 centimetr. lata, e fusco viridia, supra glabra vel parum rugulosa, subtus dilute ferruginea, reticulato-venosa, nervo intermedio prominente, odoris Rhei appropinquantis, saporis parvis austeri.

Rejicienda sunt folia Rhododendri ferruginei, quae sunt minora, lanceolata, subtus saturate ferruginea, non reticulata, et folia Rhododendri hirsuti, quae sunt obovata crenulata ciliata, subtus resinoso punctata.

Tinctura Rhododendri paretur modo § 16. notato.

Rhus.

Toxicodendron. Giftsumach. Shumac. Sumac vénéneux.

Rhus Toxicodendron vulgare Michaux (Rhus radicans L.) et Rhus Toxicodendron quercifolium Michaux, Rhus Toxicodendron L., frutices Americae borealis, in hortis saepe culti, e familia Terebinthacearum, trib. Sumachinarum, insignes: foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis, acer-

rimum halitum expirantibus et tactu periculosus; paniculis axillaribus, floribus virentibus, petalis saepe purpureo-venosis; fructu (drupa) quinesulcato nigrescente. Frutex primus differt caule radicante, foliolis integris glabris; frutex alter caule erecto, foliolis sublobato-incisis, subtus pubescentibus.

Folia recentia, succo lacteo flavescente, cutim denigrante, repleta. Sub florum proventum (mensibus Majo et Junio), sole lucente et manibus vestitis colliguntur.

Essentia Rhois s. Toxicodendri paretur modo § 15. notato.

Rhus Vernix.

Fruchtsumach. Vernis de la Chine.

Rhus Vernix L. s. Rhus venenata D. Cand., arbor palustris Americae borealis, Chinae et Japoniae, in hortis Europae raro culta, e familia Terebinthacearum, trib. Sumachinarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis 5—6jugis glabrusculis sempervirentibus; foliolis integerrimis; floribus dioicis.

Folia recentia, quae simili modo et eodem tempore quo Folia Rhois supra notata colliguntur.

Essentia Rhois Vernicis paretur modo § 15. notato.

Rosmarinus.

Anthos. Rosmarin. Common rosemary. Romarin.

Rosmarinus officinalis L., frutex Europae meridionalis, in hortis saepe cultus, e familia Labiatarum. Differt ab aliis plantis similibus: corolla violacea labio superiore erecto bipartito, inferiore trifido, lobo medio concavo dependente; filamentis infra medium dente reverso auctis; foliis sempervirentibus lineari-lanceolatis obtusis coriaceis, margine reflexo, rugosis, subtus albo-tomentosis, nervo majori percurrente; odore gravi aromatico.

Folia cum floribus, mensibus Majo et Junio recens collecta.

Essentia Rosmarini modo § 15. notato paretur.

Rumex crispus.

Krausblättriger Ampfer.

Rumex crispus L., planta perennis in locis humosis Europae habitans, e familia Polygonearum. Differt ab aliis speciebus

sui generis: foliis lanceolatis acutis cordatis undulato-crispis, anthuris aphyllis.

Planta floescens recens, resectis radice et caule crassiore. Mensibus Julio et Augusto colligitur.

Essentia Rumicis crispae paretur modo § 14. notato.

Ruta.

Gartenraute. Common rue. Rue.

Ruta graveolens L., planta perennis Europae australis, saepe in hortis culta, e familia Rutacearum, insignis: petalis luteis concavis; foliis subtripinnatifidis, laciniis ultimis cuneiformibus, subtus glanduloso-punctatis; corymbo terminali composito; odore proprio gravi.

Planta radice rejecta, recens cum floribus nondum apertis. Colligitur mensibus Majo et Junio.

Essentia Rutae paretur modo § 14. notato.

Sabadilla.

Sababillfrüner; Sänsesamen. Cevadilla seed. Cevadille.

Sabadilla officinalis Brandt, Veratrum officinale Schldl., Veratrum Sabadilla Chetz, planta perennis Mexicana, e familia Colchiacearum.

Semina e fructu triecapsulari membranaceo e flavo fuscescente exempta, subteretia, 5 millimetr. longa, rugosa, incurva, in latere uno subplana, altero convexa, margine acuto, e fusco nigra nitida, intus albida.

Tinctura Sabadillae paretur modo § 16. notato.

Saccharum granulatum.

Globuli e Saccharo et Amylo parati; Globuli saccharati s. saccharini. *Streukügelchen. Granular sugar; Sugar-globulets. Nonpareille.*

Praeparatum dulciariorum, Saccharum Amylo mixtum, in globulos magnitudine Seminis Papaveris redactum. Sint globuli omnes aequa magnitudine, duri, sicci, albissimi, plane liberi ab intermixto Saccharo pulvere.

Saccharum lactis.

Milchzucker. Sugar of milk. Sucre de lait.

Pulvis crystallinus albus inodorus, saporis dulciusculi, inter dentes stridens, in Aquae fervidae partibus tribus, frigidae partibus septem, in Aquae spirituosae partibus novem, vix in

Spiritu vini solubilis. Saccharum lactis et grosse et subtilissime pulveratum terendo in mortario porcellaneo parandum est.

Saccharum lactis.

Rp. *Sacchari lactis venalis* P. decem (10).

Solve in

Aquae destillatae fervidae P. triginta (30).

Solutionem calidam per pannum laneum colatam sepone per dies duos loco frigido. Liquorem tunc a crystallis defusum et filtratum ad volumen dimidium evaporando redige et loco frigido sepone, ut crystallae edat. Liquor ab his ultimis crystallis defusus rejiciatur. Crystallae omnia collectae solve in

Aquae destillatae fervidae P. viginti (20) vel q. s.

et solutionem adhuc fervidam filtra per chartam bibulam supra linteum expansam, ita ut liquor filtratus in vas suppositum, Spiritus vini rectificatissimi circiter P. triginta (30) continens, destillet. Post colaturam Spiritum agita et per dies duos sepone. Tum sedimentum exortum in linteo collige, exprime et loco tepido sicca.

Si Saccharum lactis venale est album et optimae indolis, ad depurationem sufficit crystallisatio iterata, supra notata, ex Aqua. Pulveratio crystallorum durorum Sacchari lactis tum in mortario majore, e massa porcellanea durissima confecta, facile efficitur. Pulvis grossus et pulvis subtilissimus in promptu habeantur.

Sabina.

Sadebaum; Sevenbaum. Savin. Sabine.

Juniperus Sabina L., *Sabina officinalis* Garke, frutex Europae australis, in hortis saepe cultus, e familia Coniferarum, trib. Cupressinearum, insignis: ramis densis coarctatis adscendentibus; foliis oppositis adpressis ovalibus acutis, in dorso glandula impressis; foliis junioribus quadrifariam imbricatis; odore gravi.

Summitates ramulorum juniorum mensibus Aprili et Maio collectae.

Essentia Sabinae paretur modo § 15. notato.

Sambucus.

Flieber; Hollunder. Elder. Sureau.

Sambucus nigra L., arbuscula Europae, saepe culta, e

familia Caprifoliacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: cymis quinquerradiatis; foliolis oblongis crenato-serratis; medulla alba.

Cymae florentes, pedunculis crassioribus resectis, una cum foliis cymae proximis. Colliguntur tempestate sicca mensibus Junio et Julio.

Cortex ramulorum arbusculae, ab epidermide liberatus, viridulus, mensibus Februario et Martio collectus.

Essentia Sambuci e cymis floriferis et foliis paretur modo § 14. notato.

Essentia Sambuci corticis e cortice modo § 15. notato paretur.

Sanguinaria.

Blutwurzel. *Blood-wort; Redroot. Sanguinaire de Canada.*

Sanguinaria Canadensis L., planta Americae borealis, in hortis Europae saepe culta, e familia Papaveracearum, insignis: folio plerumque unico et scapo unifloro, succo lactescente fulvo.

Radix (rhizoma) siccata, digitum minorem circiter crassa, cylindrica, plus minusve flexuosa, praemorsa, e ferrugineo fusca, transversim secta annulum corticalem lucidum rubrum et lignum medullamque e flavido albam punctis rubris notatis praebens, fractura inaequabili, saporis acrioris, salivam manducantium colore rubeo imbuens. Effoditur post maturitatem fructuum.

Tinctura Sanguinariae paretur modo § 16. notato.

Sassafras.

Sassafras. *Sassafras.*

Sassafras officinale Nees. et Hayne, *Laurus Sassafras* L., arbor Americae borealis, Pensilvaniae, Carolinae etc., e familia Laurinearum.

Lignum radice cortice et epidermide vestitum. Epidermis est e griseo ferruginea rugosa, cortex exterior suberosus rubiginosus, interior fibrosus ruber, lignum longitudinaliter striatum, striis extrinsecus fuscis, intus pallide luteis variegatum. Sapor est subdulcis, odor foeniculaceus.

Tinctura Sassafras paretur modo § 16. notato.

Sarsaparilla.

Sassaparilla. *Sassaparille. Salsepareille.*

Nonnullae species *Smilacis*, frutices Americae meridionalis, e familia Smilacearum.

Radix siccata, dicta *radix Sarsaparillae Honduras*, perlonga teres, ad 6 millimetr. crassa, flexuosa, per longitudinem rugoso-sulcata, radiculis fibrillosis paucis, cortice fusco unum millimetr. et ultra crasso, ligno annulari subflavo, interdum subviridi, medulla crassiore alba, sapore primum debili, dein amaricante subaustero.

Tinctura Sarsaparillae paretur modo § 16. notato.

Scabiesinum.

Psorinum hominum. Krätzpustel.

Pustulae scabiei siccae hominum.

Potentiatur eodem modo quo *Condylominum*.

Ad medicinam veterinariam commendata sunt: *Scabiesinum canum*, equorum et ovium.

Scarlatinum.

Scharlachschuppe.

Squamulae in stadio desquamationis febris scarlatinae ex cute decedentes.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Scilla.

Squilla. Meerzwiebel. *Officinal squill.* *Scille.*

Scilla maritima L., planta perennis Europae meridionalis, e familia Liliacearum.

Bulbus recens ovato-globosus, magnitudinis pugni, a squamis siccis exterioribus liberatus.

Squamae siccatae albae bulbi.

Essentia Scillae paretur ex bulbo recente modo § 14. notato.

Tinctura Scillae ex squamis bulbi siccatis modo § 16. notato ope *Spiritus vini diluti* paretur. *Tinctura* vicem *Essentiae* praebet, si bulbi recentes *Scillae* auferri non possunt.

Scrophularia.

Braunwurz; *Kropfwurzel.* *Figwort.* *Holmesweed.* *Scrophulaire.*

Scrophularia nodosa L., planta perennis palustris Europae, e familia *Scrophularinarum*, insignis: radice tuberosa e fusco grisea rugosa; caule quadrangulari, non alato; foliis ovato-oblongis subcordatis duplicato-serratis, serraturis inferioribus longioribus; panicula terminali; floribus e viridulo fuscis.

Planta tota florescens recens. Colligitur mensibus Junio et Julio.

Essentia Scrophulariae modo § 15. notato paretur.

Scrophulinum.

Skrofelneiter.

Materia purulenta ex ulcere scrophuloso.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Secale cereale.

Roggen. Rye. Seigle.

Secale cereale L., planta annua atque biennis, ubique culta, e familia Graminearum, insignis: spiculis bifloris cum rudimento tertii floris; floribus glumas superantibus.

Spicae florentes. Colliguntur mense Majo exeunte et mense Junio.

Essentia Secalis cerealis paretur modo § 15. notato.

Secale cornutum.

Mutterkorn. Spurred-rye. Ergot.

Germen Secalis cerealis degeneratum monstrosum, sistens granum subcylindricum, plerumque curvatum, interdum per longitudinem rugosum, 1,5—3 centimetr. longum, 3—5 millimetr. crassum, extus e violaceo griseum vel e fusco griseum, intus albidum. Colligitur e spicis virescentibus serena tempestate ante messem.

Essentia Secalis cornuti modo § 15. notato e Secali cornuto recens collecto ope Spiritus vini rectificati paretur.

Nota. Contritiones et dilutiones, si poscuntur, e Secali cornuto modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur. Post tempus, quo colligitur, siccatum adhibeatur.

Sedum acre.

Manerpfeffer. Wall pepper. Stone-crop. Sédon; Poivre de muraille.

Sedum acre L. planta perennis Europae, e familia Crassulacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caulibus ramosis diffusis subrepentibus; foliis carnosis sparsis ovatis, sessilibus, in dorso gibbis, in ramis sterilibus sexfariam posititis; cimis bipartitis; floribus flavis, petalis calyce duplo longioribus; sapore acri.

Planta tota florescens recens, mense Majo collecta.

Essentia Sedi acris paretur modo § 14. notato.

Selenium.Selenium. *Selen. Selen. Sélène.*

Substantia metalloidea amorphæ, interdum crystallina, e fusco rubra, vitriformis, vix pellucida, pond. spec. 4,28, in aëre calefacta odorem Raphani similem spargens, in Aqua insolubilis, in Spiritu vini parum solubilis.

Contritiones et dilutiones modo §§ 6. et 11. notatis efficiuntur. Contritio prima fiat ope Sacchari lactis grosse pulverati et in mortario refrigerato, ut Selenium pistillo nimis adhaereat.

Senega.*Senega. Rattlesnake; Milkwort. Senega.*

Polygala Senega L., planta perennis Provinciarum unitarum Americae borealis, e familia Polygalearum.

Radix sicca subcylindrica, pennam anserinam crassa, flexuosa rugosa, superne tuberculosa, subtus in curvaturis carina notata, cortice crasso, epidermide sordide luteola tecto, intus e flavo albido resinoso, ligno albido, saporis primum farinacei, dein amaro-acris.

Tinctura Senegae modo § 16. notato paretur.

Senna.*Senneblätter. Senna leaves. Feuilles de Séné.*

Folia siccata variarum specierum Cassiae, e familia Leguminosarum, fruticum Aegypti, Dongolae et Nubiae, mixta. Cassia lenitiva, lanceolata, obovata praebent Folia Sennae sic dicta Alexandrina, quae a medicis praeferuntur. Sina stipitibus majoribus crassioribusque quam maxime libera.

Tinctura Sennae paretur modo § 16. notato.

Sepia.*Succus Sepiae. Sepie. Sépia.*

Sepia officinalis L. et *Sepia octopoda*, animalia molusca praesertim Maris mediterranei, ex ordine Cephalopodum, insignia: vesica atramentifera in abdomine.

Massa sicca venalis, e fusco nigra, saepius membranulis tenerimis immixtis, evaporando obtenta liquorem e vesica illa atramentifera exemptum (non illud pigmentum, quo etiam pictores utuntur). Est in Aqua difficile, in Spiritu vini minime

solubilis. Ad usum pharmaceuticum a membranulis quam maxime liberetur.

Contritiones dilutionesque modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur. Dilutio quarta, si sedimentum demittit, decantanda est.

Tinctura Sepiae ope Spiritus vini diluti modo § 16. notato parata rarius adhibetur.

Serpentaria.

Virginische Schlangenwurz. *Virginian snakeroot. Serpentaire de Virginie.*

Aristolochia Serpentaria L., *Aristolochia officinalis* Nees ab Esenb., planta Americae borealis, e familia Aristolochiarum.

Radix rhizomate brevi praemorso flexuosissimo, radiculis copiosis, 8 ad 10 centimetr. longis, filiformibus, intricatis, epidermide e viridi fusca vestitis, intus e fusciscente albidis, odoris camphoracei, saporis acris aromatici. Ne confundatur cum radice *Spigeliae Marylandicae* L., quae radiculis tenuissimis fuscis inodoris et sapore nauseoso amaro distinguitur.

Tinctura Serpentariae paretur modo § 16. notato.

Serpyllum.

Thymus Serpyllum. Quenb. *Mother of thyme. Serpolet; Thym sauvage.*

Thymus Serpyllum L., planta fruticosa Europae, e familia Labiatarum, insignis: corollae fauce annulo pilorum convergentium instructa; floribus rubentibus, interdum albidis; verticillis capitatis vel racemosis; foliis in basi ciliatis; caule prostrato; ramis floriferis adscendentibus. Praeferatur *Thymus Serpyllum* odoris citroidei, varietas *Thymus Serpyllum angustifolius* (exserens Ehrh.), foliis lineari-lanceolatis.

Planta tota florescens recens. Colligitur aestate.

Essentia Serpylli paretur modo § 15. notato.

Silicia.

Silicea; Terra silicea; Acidum silicicum. Kieselsäure; Kieselerde. *Silica. Silice.*

Pulvis tener albusissimus levis, insipidus, in Aqua vix solubilis, in Spiritu vini minime solubilis, constans e Silicio et Oxygenio.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Silicia.

Rp. *Kali silicici liquidi q. v.*

In patinam porcellaneam infuso inter agitationem affunde

Acidi hydrochlorici puri

eam quantitatem, ut paululum praevaleat. Miscelam ad siccitatem evaporando redige et massam salinam residuam Aqua calida elue. Quod in filtro remanet, calore modico siccetur et servetur.

Nota. Kali silicicum liquidum (Vitrum solutum) est venale. Si vis rare, Arenae quarzosae pulveratae P. 15 et Kali carbonici depurati P. 10—12 miscendae sunt et in crucibulum ferreum vel platineum ingestae forti igne coalescant. Massa refrigerata pulverata in aqua coquendo solvatur et filtretur.

Smyrnum.

Zizia aurea; Goldene Zizie.

Smyrnum aureum L., *Zizia aurea* Koch., planta in montibus Americae septentrionalis, praesertim Carolinae, habitans, e familia Umbelliferarum, trib. Pimpinellae. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis biternatis, lobo medio 3—5gono, ovalilanceolatis serrulatis; umbellae radiis brevibus.

Planta florescens, caulibus crassioribus rejectis.

Semina maturescentia.

Essentia Smyrnii ex herba modo § 15. notato, Tinctura e seminibus modo § 16. notato parentur.

Solanium.

Solanin.

Alcaloides, qui in pluribus partibus plantarum Solanearum reperitur, exhibens pulverem vix crystallinum vel crystalli minutissima prismatica, saporis amari nauseosi. Aqua, Spiritu vini et Aethere vix solvitur, Spiritu autem vini fervido solvitur.

Contritiones quatuor, tum dilutiones efficiuntur.

Solaninum.

Rp. *Germinum elongatorum albidorum vel coloris expertum tuberum Solani tuberosi, quae tempore veris illa tubera loco obscuro asservata projiciunt, quantum vis.*

In pulvem contundendo redacta germina commisceantur

Acidi hydrochlorici diluti

quantitate sufficiente, donec puls paulum acidula sit. Macera loco tepido per diem, tum exprime, residuum aquae calidae paulo commisce et iterum exprime. Colaturae admisce

Calcariae hydraticae

eam quantitatem, ut Calcaria paulum praevaleat. Tum loco frigido per horas duodecim seponere. Sedimentum exortum dein in filtro collige, aqua ablue et loco tepido sicca, quod in pulverem contritum

Spiritus vini alcoholisati

quantitate sufficiente saepius excoque, quamdiu portiunculae colaturae filtratae addito Jodo soluto colore fusco turbantur. Liquores excoquendo obtentos ac destillando ad voluminis partem quartam redactos loco frigido per dies duos seponere. Sedimentum exortum post hoc tempus collige et lenissimo calore sicca.

Solanum Lycopersicum.

Liebesapfel. *Love-apple. Tomate; Pomme d'amour.*

Lycopersicon esculentum Dunal., *Solanum Lycopersicum* L., planta annua Americae meridionalis, in Europa in hortis saepe culta, e familia Solanearum, insignis: foliis impari-pinnatis, pinnis extimis majoribus confluentibus; floribus flavis axillaribus; racemis bipartitis aphyllis; baccis pomiformibus glabris nitidis rubris carnosissimis, saporis aciduli.

Planta tota florens recens. Colligitur mense Julio.

Essentia Solani Lycopersici paretur modo § 14. notato.

Baccae recentes.

Essentia Solani Lycopersici baccarum paretur § 14. notato.

Solanum mammosum.

Giftapfel. *Pomme poison.*

Solanum mammosum L., planta annua Americae mediae, in Europae hortis rarius culta, e familia Solanearum, insignis: caule herbaceo villosissimo ramoso, aculeis curvatis obsesso; foliis cordatis angulato-lobatis obtusis, utrinque villosissimo rubente tectis, aculeatis; floribus e violaceo coeruleis; baccis magnis subrotundis mammiformibus luteis.

Baccae recentes.

Essentia Solani mammosi paretur modo § 14. notato.

Solanum nigrum.

Schwarzer Nachtschatten. *Morelle noire.*

Solanum nigrum L., planta annua Europae, e familia Solanearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis ovatis

sinuato-dentatis subpubescentibus; caule et ramis angulosis; racemis extraaxillaribus; pedicellis fructiferis in apice incrassatis, deflexis; baccis parvis nigris, interdum rubescentibus, globosis. Colligitur aestate.

Essentia Solani nigri paretur modo § 14. notato.

Spigelia.

Wurmtreibende Spigelia. Brinnvilliers.

Spigelia anthelmia L., planta perennis Americae meridionalis, e familia Spigeliacearum, insignis: caule ramoso, superne crassiore, subtereti; foliis oppositis sessilibus oblongis acuminatiss, in basi attenuatis, inferne e coeruleo viridibus, summis quaternis; spicis rectiusculis; floribus albis minutis; seminibus parvis nigris rugosis; radice tenui fibrosa.

Planta tota florens recens.

Planta siccata ex America allata.

Essentia Spigeliae e planta recente modo § 14. notato, Tinctura e planta siccata modo § 16. notato parentur.

Spiritus Aetheris nitrosus.

Spiritus Nitri dulcis; Spiritus nitrico-aethereus.

Liquor limpidus neuter coloris expers vel parumper flavescens, praesertim Aethera nitrosum continens. Liquor, qui acuit, admixto Kali tartarico et rectificatione iterata ab Acido liberetur.

Spiritus Aetheris nitrosus.

Rp. *Kali nitrici puri pulverati* P. quatuor (4).

In cucurbitam vel retortam vitream immissis affunde miscelam frigidam paratam ex

Acidi sulphurici concentrati Anglici P. quatuor (4) et

Spiritus vini rectificatissimi P. sedecim (16).

Vase destillatorio cum tubo refrigeratorio (porcellaneo vel vitreo) conjuncto excipuloque adaptato, instituatur destillatio calore balnei vaporis, donec

Partes quatuordecim (14) elicita sint, quae conquassentur cum

Magnesiae ustae parva quantitate et seponantur per aliquot horas.

Liquor decantatus et filtratus leni calore ex retorta vitrea

ita rectificetur, ut partes duodecim primum transeuntes et mixtae colligantur, tum statim in vitris minoribus plane repletis et optime obturatis loco frigido asserventur. Pond. spec. 0,840—0,845. Notandum est, ut excipulum semper sine luto adaptetur.

Spiritus vini absolutus.

Alcohol absolutus. Wasserfreier Weingeist.

Sit liquor coloris expers, limpidus, perfecte volatilis, inflammabilis, odoris et saporis puri spirituosus. Inter manus tritus vel commixtus cum Aqua destillata calida nullum odorem heterogeneum praecipue Fermentolei alicujus prae se ferat. Sit ponderis spec. 0,793—0,795 (99,5—100° Trallesii Alcoholometri).

E Spiritu vini rectificatissimo puro supra Calcium chloratum fusum calore balnei aquae saepius rectificando paratur. Spiritus supra Calcariam ustam rectificatus, saporis amariuscule, rejiciendus est.

Spiritus vini alcoholisatus.

Alcohol fortior. Verstärkter Weingeist.

Sit liquor indole eadem, qua Spiritus vini absolutus praeditus, et eodem modo paretur. Sit ponderis spec. 0,810—0,816 (94,5—96° Alcoholometri Trallesii).

Spiritus vini rectificatissimus.

Alcohol. Weingeist. Starker Weingeist.

Sit liquor indole eadem, qua Spiritus vini absolutus, praeditus. Paretur e Spiritu vini venali maceratione cum carbone recente vegetabili et rectificatione calore balnei aquae. Sit ponderis spec. 0,832—0,837 (88—90° Alcoholometri Trallesii).

Inquinatio Fermentoleo vel Aethere aliquo eodem modo cognoscitur, qui supra de Spiritu vini absoluto notatus est.

Spiritus vini rectificatus.

Alcohol mitigatus. Rectificirter Weingeist.

Rp. *Spiritus vini rectificatissimi* Volumina duo,

Aquae destillatae Volumen unum.

Misce. Liquor sit ponderis spec. 0,910—0,915 (57—58° Alcoholometri Trallesii).

Spiritus vini dilutus.

Alcohol dilutus. Gewässelter Weingeist.

Rp. *Spiritus vini rectificatissimi,**Aquae destillatae* utriusque Volumina aequalia.

Misce. Liquor sit ponderis spec. 0,940—0,945 (44—45° Alcoholum. Trallesii).

Spongia.*Spongia tosta* s. *usta*; *Spongia marina tosta*; *Carbo Spongiae*. Gerösteter Meer-schwamm. Schwammkohle. Burnt sponge. Charbon d'éponge.*Pulvis grossiusculus* e nigro fuscus, odoris empyreumatici, saporis acris salsi, torrendo *Spongiam marinam* paratus.*Tinctura Spongiae* ope *Spiritus vini rectificati* modo § 16. notato paretur.**Spongia tosta.****Rp.** *Spongiarum marinarum.**A lapidibus arenaeque accurate liberatas, tum minutim concisas immitte in tostorium purum* (constructione cylindri ferrei, in quo fabae Coffeae torreri solent), et tostorium supra igne versando agitandoque torrefac, adustionem spongiae evitando, donec portiunculæ exemptæ sint fuscae et pulverari possint. *Spongia* hoc modo tosta, frustulis nigris rejectis, in pulverem redigatur et bene servetur.**Stannum.***Zinn. Tin. Etain.**Metallum molle, ductile, splendoris argentei, in Acido hydrochlorico solubile, pond. spec. 7,3. Ad usum therapeuticum stannum in lamellas tenuissimas redactum* (Schwammsilber, Metallsilber) adhibere solent. Hoc saepe est metallis aliis inquinatum, quam ob rem rejiciatur. *Stannum praecipitatum* est purum et adhibeatur. Sit pulvis metallicus e flavescente griseus, premendo ope chalybis splendorem metallicum exhibens.

Contritiones et dilutiones parentur modis §§ 6. et 11. notatis.

Stannum praecipitatum.**Rp.** *Stanni chlorati* P. octo (8).

Solve in liquore parato ex

Aquae destillatae P. centum et sexaginta (160),*Acidi hydrochlorici* P. duabus (2).

In solutionem filtratam immerge

Zinci puri in bacillis P. duodecim (12),
tum sepone, dum Stannum metallicum praecipitatur, quod interdum ope spatulae vitreae remove. Stannum praecipitatum, Zinco rejecto, primum Aqua destillata, postremo Spiritu vini ablue et inter strages chartae bibulae quam celerrime sicca. Serva in lagenulis repletis.

Staphisagria.

Semina Staphidis agriae. *Stephanskörner. Stavesacre. Staphisaigre.*

Delphinium Staphisagria L., planta biennis Europae meridionalis, e familia Ranunculacearum.

Semina siccata grisea aut e fusco grisea, trigona vel tetragona, compressa incurva, hinc convexa inde plana, rugosa, sutura prominula notata, nucleo ex albo luteo oleoso, odoris ingrati, saporis nauseosi acris.

Tinctura Staphisagriae e seminibus, commixtis Cretae albae pari pondere, tum grosse pulveratis modo § 16. notato paretur. Creta addita ad resorbendum oleum pingue seminum et pulverationi facilius efficiendae inservit.

Stibio-Kali tartaricum.

Tartarus stibiatus s. emeticus. *Brechwinstein. Potassio-tartrate of antimony;*

Tartar emetic. Tartrate de potasse antimonie. Tartre stibie.

Sal in crystallis octaëdris recte rhombicis pellucidis, coloris expertibus, in aëre fere persistentibus, post aliquod tempus tamen subopacis albis, in Aquae partibus quindecim, in Spiritu vini vix solubile, constans e Kali, Stibio oxydato, Acido tartarico et Aqua ($=\text{K}_2\text{O}, \text{T} + \text{SbO}^3\text{T} + 2\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur.

Stibium sulphuratum aurantiacum.

Sulphur stibiatum aurantiacum; Sulphur auratum. *Pomeranzenfarbener Schwefelspießglanz; Goldschwefel. Yellow sulphuret of antimony. Persulfure d'antimoine.*

Pulvis e rubro aurantiacus depingens, odoris expers, in Aqua minime, in Spiritu vini vix, in Ammono caustico liquido totus solubilis, constans e Stibio et Sulphure ($=\text{SbS}^3$). Sit ab Arsenio et Stibio oxydato omnino liber.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Stibium sulphuratum aurantiacum.

Rp. *Stibio-Natrii sulphurati crystallisati (salis Schlippii) recens parati* P. duodecim (12).

Solve agitando in

Aquae destillatae P. quadraginta octo (48).

Liquori filtrato, diluto circiter

Aquae filtratae quintuplice volumine,

inter agitationem admisceatur mixtura limpida, parata ex

Acidi sulphurici concentrati P. quatuor et dimidia ($4\frac{1}{2}$) et

Aquae destillatae P. nonaginta sex (96).

Praecipitatum inde exortum collige, aqua ablue, dein inter strages chartae bibulae preme et loco umbroso tepido (25° C.) quam celerrime sicca. Tritum in vasis bene obturatis a luce remotis asserva.

Nota. Sal Schlippii paretur e Stibii sulphurati nigri laevigati P. 24, Sulphuris loti P. 4, Natri carbonici crystallisati P. 36, Calcariae ustae P. 12 et Aquae circiter P. 220 l. a. coquendo, filtrando, evaporando crystallisandoque.

Stibium sulphuratum nigrum.

Antimonium. Antimonium sulphuratum. Schwarzer Schwefelspießglanz; Spießglanz. *Grey protosulphide of antimony. Protosulfure noire d'antimoine.*

Massa composita e crystallis metallice splendentibus, e nigro griseis, acicularibus, radiatim dispositis, digitos inquinantibus, neque Aqua nec Spiritu vini solubilis, constans e Stibio et Sulphure (=SbS³). Sit ab Arsenio, Plumbo et Cupro plane libera.

Massa contrita super lapidem expolitum et durum, affusa parva quantitate Aquae destillatae, in pulverem subtilissimum redigatur.

Contritiones et dilutiones modo §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Stibium sulphuratum rubeum.

Kermes; Kermes minerale. Sulphur stibiatum rubeum. Rother Schwefelspießglanz. *Brown antimoniated sulphur. Protosulfure rouge d'antimoine.*

Pulvis subtilis, e rubro fuscus, sub microscopio crystallula intermixta conspicua praebens, inodorus, insipidus, constans e Stibio et Sulphure (=SbS³) et intermixtis crystallulis Stibii oxydati (SbO³), plane solubilis in Acido hydrochlorico. Neque Aqua nec Spiritu vini solvitur.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Stibium sulphuratum rubeum.

Rp. *Natri carbonici crystallisati* P. viginti et quatuor (24).
Solve in lebeate ferreo in

Aquae destillatae P. ducentis et quadraginta (240)
ad ebullitionem usque calefactis, tum inter agitationem adde

Stibii sulphurati nigri laevigati P. unam (1).
Coque per horas duas, aquam evaporatione diminutam semper restituendo, et liquorem adhuc ferventem in vas, quod paulum *Aquae destillatae* fervidae continet, statim filtra.

Postquam refrixerit, praecipitatum exortum in filtrum injiciatur et in eo *Aqua destillata* abluatur, donec liquor defluens chartam exploratoriam rubram non amplius mutet. Tandem inter chartam bibulam preme, loco obscuro tepido (25° C.) exsiccata, sedulo contere et in vasis bene obturatis a luce remotis serva.

Stramonium.

Datura. Stechapfel. Thorn-apple; Stramony. Stramonium.

Datura Stramonium L., planta annua Americae, Asiae et Europae, e familia Solanearum, insignis: calyce tubuloso, supra basin circumscisso; corolla alba infundibuliformi, limbo plicato quinquedentato; stigmatibus bilamellatis; fructu (capsula) ovali echinato; foliis ovatis sinuato-dentatis glabris.

Planta florens recens, caule crassiore et radice rejectis. Colligitur mensibus Julio et Augusto.

Semina matura siccata. Sunt reniformia compressa scrobiculato-scabra nigra, intus alba, inodora, magnitudinis lentis minoris.

Essentia Stramonii e planta recenti modo § 14. notato, Tinctura Stramonii e seminibus modo § 16. notato parentur.

Nota. Tincturam Essentiae substituere licet.

Strontiana carbonica.

Strontiana. Strontianerde. Carbonate of strontia. Carbonate de strontiane.

Pulvis subtilis albus, Acidis affusis effervescens, in partibus *Aquae* 18000, neque in Spiritu vini solubilis, constans e *Strontiana* et *Acido carbonico* ($=\text{SrO}, \text{CO}_2$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Strontiana carbonica.

Paretur aequali modo quo Baryta carbonica, nisi quod loco Baryi chlorati sumatur Strontiana nitrica crystallisata.

Strychninum.

Strychnina; Strychnium. *Strychnin. Strychnine.*

Alcaloides in crystallulis prismaticis vel pulvere crystallino albo, inodorus et saporis peramari, solubilis in Aquae partibus 7000—8000, in Spiritus vini rectificatissimi partibus 200. In cochleari platinico fortius aestuatus perfecte comburat et Acido nitrico superaffuso colore rubro ne tingatur. In officinis chemicis e Nucibus vomicis paratur.

Primum contritiones potentiatae quatuor, tum dilutiones efficiuntur.

Strychninum nitricum.

Salpetersaures Strychnin. *Nitrate of strychnine. Azotate de strychnine.*

Sal neutrum in crystallulis acicularibus, coloris expertibus, flexilibus, nitoris sericei, saporis peramari, solubile in Aquae partibus 100, in Spiritus vini rectificatissimi partibus 80, constans e Strychnino, Acido nitrico et Aqua ($=\text{Str}^{\dagger}\text{NO}^5+\text{HO}$). In cochleari platinico fortius aestuatus perfecte comburat et Acido nitrico superaffuso colorem rubrum ne assumat.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur.

Strychninum sulphuricum.

Schwefelsaures Strychnin. *Sulphate of strychnine. Sulfate de strychnine.*

Sal neutrum in crystallulis coloris expertibus, pellucidis, cubicis, in aëre subfatiscentibus, calore liquescentibus, peramarum, solubile in Aquae partibus 50, in Spiritus vini rectificatissimi partibus 100, constans e Strychnino, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{Str}^{\dagger}\text{SO}^3+8\text{HO}$).

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 10. notatis efficiuntur.

Strychninum sulphuricum.

Rp. *Strychnini puri* P. triginta quinque (35).

Contritas misce cum

Aquae destillatae P. centum et octoginta (180).

Mixtioni ad 40—60° Cels. therm. circiter calefactae instilla

Acidi sulphurici diluti (pond. spec. 1,115) P. triginta (30)
 aut quantam ad perfectam neutralisationem requiritur; sed cave,
 ne Acidum praevaleat. Liquorem calore 50° Cels. therm. non
 excedente evaporando et seponendo in crystallà coge, quae in-
 ter chartam bibulam premendo siccata statim in lagenulis bene
 obturatis asserva.

Sudorinum pedum.

Fußschweiß.

Sudor pedum hominum.

Dilutio prima Aqua spirituosa, secunda Spiritu vini diluto,
 tertia Spiritu vini rectificato, sequentes dilutiones Spiritu vini
 rectificatissimo efficiuntur.

Sudorinum phthisicum.

Colliquativer Schweiß.

Sudor colliquativus phthisi aegrotantium.

Potentiatur aequali modo quo Sudorinum pedum.

Sulphur.

Sulphur sublimatum lotum. Schwefel. *Sulphur. Soufre.*

Pulvis subtilis siccissimus, pallide citrinus, odoris expers,
 insipidus, nequaquam acidus, in Spiritu vini parum, neque
 in Aqua solubilis. Paretur eluendo Sulphur sublimatum venale
 aqua et siccando loco tepido. Cave ne Arsenium contineat,
 quod cognoscitur macerando Sulphur Ammono caustico liquido,
 et commiscendo liquorem filtratum cum Acido hydrochlorico
 superante. Praecipitatum inde ortum citrinum Arsenium prodit.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Sumbul.

Moschuswurzel. *Sumbul-root. Racine de sumbul.*

Planta Asiae umbellifera non satis nota.

Radix sicca formae placentarum majorum, e flavo fusca,
 texturae spongiosae tenacioris, odoris penetrantis Moschi simi-
 lis, saporis amaricantis acris. Ex Asia affertur.

Tinctura Sumbul e radice minutim concisa modo § 16.
 notato paretur.

Sycosinum.

(Condylominum?) Feigwarze. *Fig. Fic.*

Verruca venerea (sycoma) hominum.

Potentiatur aequali modo quo Condylominum.

Symphytum.*Schwarzwurz. Comfrey. Consfère; Oreille d'âne.*

Symphytum officinale L., planta perennis Europae, e familia Boraginearum, insignis: calyce quinquefido; corolla tubulosa, limbo quinquelobo campanulata, fauce squamis quinque radiato-conniventibus clausa; foliis hispidis, inferioribus ovato-lanceolatis petiolatis, superioribus lanceolatis sessilibus decurrentibus; caule ramoso; radice nigra, fibris dauciformibus fasciculata.

Planta tota florescens recens. Colligitur mensibus Majo et Junio.

Radix recens, autumnno collecta.

Essentia Symphyti aut e planta tota modo § 14. notato, aut e radice modo § 15. notato paretur.

Tabacum.*Nicotiana. Tabak. Tabacco. Tabac; Nicotiane.*

Nicotiana Tabacum L., planta annua Americana, in Europa saepius culta, e familia Solanearum, insignis: calyce tubuloso quinquefido persistente; corolla rosea infundibuliformi, fauce ventricosoinflata, limbo plicato laciniis quinque acuminatis; foliis integris oblongo-lanceolatis acuminatis sessilibus, inferioribus attenuato-decurrentibus.

Folia majora recentia plantae vix florecentis. Mense Julio colliguntur.

Essentia Tabaci modo § 14. notato paretur.

Tæninum.*Bandwurm. Tapeworm. Ténia.*

Taenia lata s. vulgaris et *Taenia solium* s. cucurbitina L., vermes intestinales classis Enhelminthorum, ordinis Cestoideorum, insignes: corporibus planiusculis geniculatis, oribus quadrilobis.

Vermis recens vivus vel frustula corporis ejusdem.

Potentiatur aequali modo quo Ascaridinum.

Tanacetum.*Athanasia. Rainfarn. Common tansy. Tanaisie.*

Tanacetum vulgare L., planta perennis Europae, e familia Compositarum, insignis: corymbo terminali composito; involucrio imbricato; receptaculo nudo; floribus aureis; foliis glabriusculis bipinnatifartitis serratis; caule erecto.

Summitates florentes plantae. Colliguntur mensibus Julio et Augusto.

Essentia Tanaceti paretur modo § 15. notato.

Taraxacum.

Wenzeln. *Dandelion. Liondent; Pissenlit.*

Taraxacum officinale Weber, Leontodon Taraxacum L., planta perennis Europae, e familia Compositarum, trib. Cichoracearum, insignis: involucro (peranthodio) calyculato, exteriori reflexo; receptaculo nudo, floribus multiseriatis; pappo stipitato piloso; foliis radicalibus runcinatis; scapo fistulato moncephalo; succo lacteo.

Planta tota recens. Colligitur, antequam floret, mensibus Aprili et Majo.

Essentia Taraxaci paretur modo § 14. notato.

Taxus.

Eichenbaum. *Yew. If.*

Taxus baccata L., arbor Europae meridionalis, saepe culta, e familia Coniferarum, trib. Taxinarum, insignis: floribus dioicis, masculis et femineis axillaribus, floribus masculis squamis peltatis lobatis, femineis squamis solitariis, squama disciformi ad baccam rubram demum excrecente; foliis sempervirentibus distichis linearibus acute mucronatis, nervo primario utrinque prominente.

Summitates ramulorum recentes, mensibus Martio, Aprili, Majo collectae.

Essentia Taxi paretur modo § 15. notato.

Tellurium.

Tellur. Tellur.

Metalloïdum Argento simile, fragile, friabile, saepe exhibens crystallam vel lamellas splendoris metallici, in aëre calore inflammabile et fumum album acidulum spargens, in Aqua insolubile, in Spiritu vini vix solubile. Pond. spec. 6,2. E minis variis Hungariae elicitur.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Thea.

Thea Caesarea. Kaiserthee; Perlenthe. *Imperial tea. Thé imperial.*

Folia siccata Theae Chinensis Sims. (Cameliaceae), e

China et Japonia allata. *Thea viridis* primae notae, odoris suavis, vulgo *Perlthee* (*Thea perlata*) nominata, adhibenda est, quia *Thea imperialis*, quae optima aestimatur, in Europam rarius affertur. Cave ne colore factitio viridi imbuta sit.

Tinctura *Theae* paretur modo § 16. notato.

Theridium.

Theridium Curassavicum. *Spinnweb.*

Theridium Curassavicum Hering, animal *Curassaviae* ex ordine *Octopodum*, e familia *Aranoïdium*, colore nigro, magnitudine ossis cerasi, pilis paucis brevibus vestitum, macula aurantiaca supra anum et maculis minoribus duabus ejusdem coloris antice in abdomine, macula flava in ventre. *Arenae* juniores striis guttatis albis, femineae striis tribus guttatis flavis notatae sunt. *Aranea* venenosissima.

Tinctura *Theridii* macerando araneas recens captas in *Spiritus vini* rectificatissimi volumine decuplici paretur.

Thuja.

Arbor vitae. *Lebensbaum.* *White cedar.* *Arbre de vie.*

Thuja occidentalis L., arbor *Americana*, in hortis *Europae* saepe culta, e familia *Coniferarum*. Differt ab aliis speciebus sui generis: ramis horizontalibus; foliis quadrifariam imbricatis, in dorso unituberculatis (glandula impressis); strobulis obovatis, squamis interioribus truncatis infra apicem gibbosis.

Folia et fines ramorum floriferorum recentia, mensibus *Aprili* et *Majo* collecta.

Essentia *Thujae* paretur modo § 15. notato.

Tilia.

Simbe. *Linden.* *Tilleul.*

Tilia Europaea L., *Tilia platyphylla* Scop. et nonnullae varietates floribus suaveolentibus, arbores *Europae*, e familia *Tiliacearum*, insignes: bracteis albidis integris magnis pedunculo ad medium usque adnatis.

Fores recentes vel cymae floridae recentes a pedunculis bracteisque liberatae. Colliguntur mensibus *Majo* et *Junio*.

Essentia *Tiliae* paretur modo § 15. notato.

Tinctura acris sine Kali.

Aetzstoff-Tinctur.

Rp. *Kali caustici sicci* P. unam (1),*Spiritus vini rectificatissimi* P. sex (6).

Digere leni calore per quatuor dies interdum agitando, tum se-
pone loco frigido per aliquod tempus. Liquori dein decantato
paulatim instilla

Acidi sulphurici concentrati, Aquae pari volumine diluti
quantum ad neutralisationem perfectam requiritur. Sepone per
diem et filtra. Serva colaturam in lagenis bene obturatis. Sit
liquor coloris e rubro flavi, nec chartam exploratoriam coeruleam
nec rubram mutans.

Nota. Acidi sulphurici nimiam quantitatem, quam fortuito addideris, ad-
dendo Calcariae ustae pulveratae paulum tollere licet.

Tinctura Sulphuris.

Alcohol sulphuratus. Spiritus vini sulphuratus.

Rp. *Sulphuris sublimati loti* P. quinque (5),*Spiritus vini alcoholisati* P. centum (100).

In lagenam immissas sepone per quatuor dies et saepius agita.
Tum filtra. Liquorem serva in lagenis bene obturatis.

Tineinum.Tininum. Kopfsgrind; Grindkopf. *Scabby-scalp. Teigne.*

Crusta albida tineae contagiosae.

Potentiatur aequali modo quo Condylominum.

Tonco.Dipterix; Faba Tonco; Tongo; Tonga. Tonkabohne. *Tonca. Fève Tonca.*

Dipterix odorata Willd., Coumarouna odorata Au-
blet, arbor Guianae, e familia Leguminosarum.

Semina subreniformia subcompressa, ad 3—4 centim. longa,
1—1,5 centim. lata, 0,5—1 centim. crassa, e rubro fusca vel e
nigro fusca, testa glabra rugosa splendoris pinguis vestita, co-
tyledones duas fuscascentes includente, crystallulis albis acicu-
laribus (Cumarinum exhibentibus) plus minusve conspersa; odo-
ris grati, eidem florum Meliloti similis.

Tinctura Tonco (s. Tongae) paretur modo § 16. notato.

Tussilago.Petasites. Großer Hufelattig; Hefwurz. *Butter-bur. Petasite.*

Petasites officinalis Mnch., Petasites vulgaris Desf.,

planta perennis Europae, in pratis humidis frequens, e familia Compositarum, trib. Tussilaginearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: rhizomate repente longo, ad 3—5 centim. crasso, ramoso, superne tuberoso, extus fusco, intus candore carnosio; scapo squamoso, thyrsos ovali; anthodiis majoribus (Tussilago Petasites L.) vel thyrsos oblongo anthodiis minoribus (Tussilago hybrida L.), anthodiis plerumque purpurascens praecocibus; foliis tantum radicalibus reniformi-cordatis sinuato-angulatis dentatis.

Radix (rhizoma) recens tempore florescentiae plantae (exunte mense Aprili et mense Majo) collecta.

Essentia Tussilaginis paretur modo § 14. notato.

Ulmus.

Ulm. Elm-tree. Orme.

Ulmus campestris L. et Ulmus effusa Willd., arbores silvaticae Europae, e familia Urticearum, trib. Ulmacearum, insignes: samaris membranaceis circumalatis; floribus praecocibus; foliis alternis scabris stipulatis, ovalibus et oblongis, duplicato-serratis.

Cortex interior (liber) flavus e ramis non nimis tenuibus, vere collectus.

Essentia Ulmi paretur modo § 15. notato.

Ureinum.

Ғарнабһаһ.

Sedimentum urinae febre intermittente aegrotantium. Ureinum febrium intermittentium sine apyrexia et Ureinum febrium intermittentium ex urina inter apyrexiam reddita distinguunt. Sedimentum in filtro collectum loco tepido siccatur.

Potentiatur modis §§ 6. et 11. notatis.

Urolithinum.

Ғарнаһһһһ.

Concretiones lapideae vel calculi una cum urina redditi, urolithi sic dicti. Ablutae et siccatae adhibentur.

Potentiatur modis §§ 6. et 11. notatis.

Urtica.

Brennnessel. Stinging nettle. Ortie.

Urtica urens L., planta annua Europae, e familia Urti-

cearum (Urticearum). Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis oppositis ovali-rhombeis acutis inciso-serratis, in basi attenuatis; anthuris petiolo brevioribus; floribus monoicis, seminibus flavidis glabris.

Planta florens tota, aestate collecta.

Essentia Urticae paretur modo § 15. notato.

Nota. Tinctura Urticae seminum, quae interdum postulatur, e seminibus siccatis modo § 16. notato paretur.

Uva Ursi.

Bärentraube. *Bearberry.* *Bousserolle.*

Arctostaphylos Uva Ursi Sprengel. Arbutus Uva Ursi L., fruticulus sempervirens Europae et Americae borealis, e familia Ericinearum, insignis: caulibus prostratis; foliis obovato-oblongis integerrimis nitidis, subtus reticulato-venosis (nec punctatis), saporis subadstringentis.

Folia recentia vel siccata. Colliguntur exeunte aestate.

Essentia Uvae Ursi e foliis recentibus modo § 15. notato paretur.

Tinctura Uvae Ursi e foliis siccatis modo § 16. notato paretur.

Nota. Tincturam Essentiae substituere licet.

Valeriana.

Balbian. *Valerian.* *Valériane.*

Valeriana officinalis L., planta perennis Europae, e familia Valerianearum.

Radix (rhizoma) siccata brevis, praemorsa, subrotunda vel oblonga, tuberculata, undique radiculis tenuibus tenacibus, extus e fusco cinereis, intus albidis subcarnosis obsessa, odoris graveolentis subnauseosi, saporis acris amaricantis. Collecta in locis montosis siccis semper praeferatur. In vasis bene clausis servetur.

Tinctura Valerianae paretur modo § 16. notato.

Variolinum.

Vaccininum. *Ruhpockenstoff.*

Materia purulenta vel lymph a pustularum vaccinellae vel variolae vaccinae.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Varioloïdinum.

Materia purulenta vel lymphæ pustularum variolidium hominum, quibus variolæ insertæ sunt (vaccinatorum).

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Varicellinum.

Unerchter Pockenstoff.

Materia purulenta vel lymphæ pustularum varicellæ vel variolæ spuriae hominum.

Potentiatur aequali modo quo Alveolinum.

Veratrinum.

Veratrum; Veratrina. Veratrin. *Veratria. Véatrine.*

Alcaloides e seminibus Sabadillæ obtentus, exhibens pulverem albidum, amorphum, odoris nullius, saporis valde acris urentis, sternutationem vehementem, interdum periculosam, excitantem, vix in Aqua, in Spiritus vini rectificatissimi partibus quatuor solubilem. In Acido hydrochlorico solutus præbet solutionem limpida. Exaestuando primum liquescat, tandem carbonem edat, qui ustione partes fixas ne relinquat.

Dilutio prima et subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Veratrum.

Helleborus albus. Weiße Nieswurzel. White hellebore. Hellebore blanc.

Veratrum album L., planta perennis montana Germaniæ et Helvetiæ, Galliæ, sæpe culta, e familia Melanthacearum.

Radix (rhizoma) siccata simplex cylindrica aut conica, brevius, obtusa, tuberculoso-rugosa, ad 2,5 centim. crassa, 4—5 centim. longa, resectione radicularum frequentium cicatrisata et scabra, superne annulata, epidermide nigricante, intus spongiosa alba, odoris fere nullius, trita sternutationem vehementem excitans, saporis primum amari dein acerrimi.

Tinctura Veratri paretur modo § 16. notato.

Verbascum.

Äbnigsferze. Yellow mullein. Bouillon blanc.

Verbascum Thapsus L., *Verbascum thapsiforme* Schrader, planta biennis Europæ mediæ, e familia Scrophularinearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: foliis alio

ad aliud decurrentibus; floribus citrinis majoribus; antheris inaequalibus; filamentis inferioribus anthera sua hinc longe decurrente fere duplo longioribus.

Folia et summitates florentes plantae recens (mense Julio) collectae.

Essentia Verbasci paretur modo § 15. notato.

Vinca.

Pervinca. Wintergrün. Lesser periwinkle. Pervenche petite.

Vinca minor L., fruticulus silvestris Europae, e familia Apocynearum, insignis: floribus axillaribus longe pedunculatis; corolla azurea hypocraterimorpha limbo quinquepartito et fauce quinquegona; antherarum processibus squamiformibus supra stigma conniventibus; stigmatе terminato cono piloso; caule repente; ramis floriferis erectis; foliis oppositis ellipticis coriaceis semper-virentibus; rhizomate longo, subtus radículas emittente.

Fruticulus totus florescens recens. Colligitur mensibus Aprili et Majo.

Essentia Vincae paretur modo § 15. notato.

Viola.

Beißhen. Violet. Violette.

Viola odorata L., planta perennis Europae et Asiae, e familia Violariarum. Differt ab aliis speciebus sui generis: floribus saturate violaceis odoratis; stolonibus flagelliformibus et defectu caulis; foliis subrotundo-cordatis.

Planta tota florens recens. Mensibus Aprili et Majo colligitur.

Essentia Violae paretur modo § 14. notato.

Zincum.

Spianter; Zinf. Zinc. Spelter. Zinc; Spiauter.

Metallum ex albedo griseum nitidum, tenax, rigidum, fracturae lamellosae, pond. spec. circiter 7,0, in igni aëris accessu flammam lucidam pallide virescentem concipiens et flocos niveos (flores Zinci) praebens. Adhibeatur Zincum praecipitatum s. divisum, exhibens pulverem griseum opacum.

Contritones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Zincum praecipitatum s. divisum.**Rp.** *Zinci chlorati puri* P. tres (3).

Solve in

Aquae destillatae P. duabus (2).

In solutione, in ollam vitream immissa, bacillos Zinci puri multos perpendiculate colloca, tum ad parietem ollae Aquam destillatam caute ita affunde, ut haecce Zinco chlorato soluto innatet. Tum sepone. Actione chemica finita, Zincum praecipitatum in filtro collige et primum Spiritu vini, dein Aethere abluere, tandem siccatum ope cribri a frustulis Zinci forsan immixtis separa. Serva in lagenis obturatis.

Zincum aceticum.Effigsaures Zinforghd. *Acetate of zinc. Acétate de zinc.*

Sal in crystallis majoribus lamellaribus, oblique rhombicis, albis, nitoris sericei, odoris debilis acetici, in aëre subfatiscentibus, solubile in Aquae partibus quatuor, in Spiritus vini rectificatissimi partibus circiter triginta, constans e Zinco oxydato, Acido acetico et Aqua ($=\text{ZnO}, \text{A} + 3\text{HO}$).

Dilutio prima Aqua spirituosa, dilutiones subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur.

Zincum aceticum.**Rp.** *Zinci carbonici puri* vel*Zinci oxydati albi* q. v.

Solve digerendo in

Acidi acetici aqua diluti q. s.,

sensim affundendo. Liquorem filtratum evaporando et seponendo in crystallia redige, ita tamen, ut instillato Acido acetico liquor semper paululum acidus sit. Crystalla collecta, calorem evitando, siccentur.

Zincum cyanatum.Zincum hydrocyanicum. Cyanzinf. *Cyanide of zinc. Cyanure de zinc.*

Pulvis albissimus, in Aqua et Spiritu vini vix solubilis, e Zinco et Cyano ($=\text{ZnC}_y$) constans.

Contritiones et dilutiones modo §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Zincum cyanatum.**Rp.** *Zinci acetici q. v.*

Solve in

Aquae destillatae frigidae

quantitate decuplici. Liquori, si opus erit, filtrato instilla

Acidi hydrocyanici,

quamdiu praecipitatum inde exoritur. Praecipitatum primum Aqua destillata, dein Spiritu vini bene eluatur et quam celerime inter strages chartae bibulae loco tepido (25–30° C.) siccetur. Serva in lagenulis obturatis a luce remotis.

Zincum oxydatum.Flores Zinci. *Zinkoxyd. Oxyd of zinc. Zinc oxyde.*

Pulvis albus levis grumulosus insipidus inodorus, in Aqua et Spiritu vini insolubilis, excandefactus colorem citrinum, inter refrigerandum evanescentem, assumens, Aqua humectatus in Acido hydrochlorico diluto sine effervescentia plane solubilis, constans e Zinco et Oxygenio ($=\text{ZnO}$). Urendo Zincum carbonicum praecipitatum purum paretur. Serva in lagenis obturatis.

Contritiones et dilutiones modis §§ 6. et 11. notatis efficiuntur.

Zincum sulphuricum.Vitriolum album. *Schwefelsaures Zinkoxyd. Sulphate of zinc. Sulfate de zinc.*

Sal in crystallis aut prismaticis magnis diaphanis, aut parvis acicularibus, decoloribus, in aëre vix subfatiscentibus, reactionis acidulae, saporis acris acerbi, in Aquae partibus $2\frac{1}{2}$, neque in Spiritu vini solubilibus, constantibus e Zinco oxydato, Acido sulphurico et Aqua ($=\text{ZnO}, \text{SO}_3 + 7\text{HO}$). Sit purum, praesertim a Ferro et aliis metallis liberum.

Dilutio prima et secunda Aqua, tertia Aqua spirituosa, quarta Spiritu vini diluto, quinta Spiritu vini rectificato, dilutiones subsequentes Spiritu vini rectificatissimo efficiuntur. Dilutiones turbidae rejiciantur.

Zingiber.*Ingwer. Ginger-root. Gingembre.*

Zingiber officinarum Roscoe (*Amomum Zingiber* L.) planta perennis Indiae orientalis, in India occidentali culta, e familia Scitaminearum.

Radix (rhizoma) siccata ex India allata, epidermide resecta, in segmentis 4 ad 5 centim. longis, depressis, ponderosis, tuberoso-nodosis, extus flavescentibus vel e flavo cinereis, intus e rubro albidis vel flavis, folliculis parvis resiniferis, saporis acris, odoris aromatici. *Radix* extus alba rejiciatur.

Tinctura Zingiberis modo § 16. notato paretur.

Emplastrum Arnicae.

Taffetas Arnicae. Arnica-plaster.

Rp. *Ichthyocollae incisae* P. unam (1).

Solve coquendo in

Aquae destillatae P. duodecim (12).

Colaturam ad partes sex remanentes evaporando redactam in duas partes aequales divide.

Parti alteri adde

Infusi filtrati Arnicae radiceis P. quatuor (4),
paratas e P. radiceis $\frac{5}{8}$ et *Aquae fervidae destillatae* P. 5.
Parti alteri adde mixturam filtratam, paratam ex

Infusi Arnicae radiceis ut antea parati,

Essentiae Arnicae utriusque P. unam (1).

Parte colaturae cum Infuso Arnicae primum commixta obducatur ope penicilli tela bombycina (*Taffetas*) rubicunda, quae supra jugum extensa est. Tela loco tepido siccata, operatio identidem repetatur, donec liquor consumptus fuerit.

Dein parte altera colaturae, cum Infuso et Essentia Arnicae commixta, haec tela iterum simili modo obducatur, donec liquor consumptus fuerit. Telam siccata loco sicco serva. Grammata 30 (Drachm. 8) *Ichthyocollae* ad telae Centimetra quadrata 160 (Ped. Rhenan. quadrat. $4\frac{1}{2}$ —5) obducenda sufficiunt.

Appendix I.

Medicamenta usitatissima

et dilutionum potentiarum numeri, ad quos illa potentiata saepissime adhibentur.

	Dilut. potent.		Dilut. potent.
Absinthium	30	Calcaria carbonica	30
Acidum arsenicosum	30	Calcium sulphuratum	10
Acidum hydrochloricum	30	Calendula	3
Acidum nitricum	30	Camphora	3
Acidum phosphoricum	10	Cannabis sativa	30
Acidum sulphuricum	10	Cantharides	30
Aconitum	30	Capsicum annum	15
Agaricus muscarius	30	Carbo animalis	30
Alumina	30	Carbo vegetabilis	30
Ambra	10	Causticum	30
Ammonum carbonic.	20	Chamomilla	15
Ammonium chloratum	30	China	30
Anacardium orientale	30	Cina	10
Argentum	20	Cinnamomum	3
Arnica	10	Clematis	10
Asa foetida	10	Cocculus	15
Asarum	15	Coffea	20
Aurum	15	Colchicum	15
Baryta carbonica	20	Colocynthis	30
Belladonna	30	Conium	30
Borax	30	Crocus	10
Bryonia	30	Cuprum	30



	Dilut. potent.		Dilut. potent.
Cuprum aceticum	30	Phosphorus	30
Digitalis	15	Platina	15
Drosera	30	Plumbum	30
Dulcamara	30	Plumbum aceticum	15
Euphrasia	30	Pulsatilla	15
Ferrum	30	Rheum	10
Filix	10	Rhododendron	30
Graphites	30	Rhus	30
Helleborus	15	Ruta	3
Hydrargyrum	15	Sabadilla	30
Hydrargyrum amidato-nitric.		Sabina	24
oxydulatum	15	Sambucus	10
Hydrargyrum bichloratum	30	Scabiesinum equorum	20
Hyoscyamus	15	Scilla	18
Jacea	3	Secale cornutum	30
Jalapa	6	Sepia	30
Ignatia	15	Silicea	30
Jodum	(30)	Spigelia	30
Ipecacuanha	6	Spongia	30
Kali carbonicum	30	Stannum	10
Kali nitricum	30	Staphisagria	30
Kreosotum	30	Stibio-Kali tartaricum	10
Lachesis	30	Stibium sulphurat. nigrum	30
Ledum palustre	15	Stramonium	15
Lycopodium	30	Sulphur	30
Magnesia carbonica	30	Symphytum officinale	20
Magnesium chloratum	20	Thuja	30
Marum verum	15	Tinctura Sulphuris	—
Mezereum	15	Urolithinum	30
Natrium chloratum	30	Urtica urens	30
Nux vomica	30	Vaccininum	30
Oleander	10	Veratrum	15
Opium	10	Vinca	5
Petroleum	20	Zincum	30



Appendix II.

Calendarium

indicans tempus ad vegetabilia singula recentia
colligenda.

Mense Januario.

Helleborus (rad.).

Mense Februario.

Mezereum (cort.)

Sambucus (cort.).

Mense Martio.

Angelica (rad.)

Sambucus (cort.)

Asarum

Taxus

Mezereum (cort.)

Viola.

Prunus Padus (cort.)

Mense Aprili.

Apocynum (rad.)

Prunus spinosa (flor.)

Aristolochia longa (rad.)

Pulsatilla.

Arum (rad.)

Sabina

Asarum

Taraxacum

Geum (rad.)

Taxus

Juncus pilosus (rad.)

Thuja

Ononis (rad.)

Tussilago (rad.)

Paeonia (rad.)

Ulmus (cort. int.)

Pimpinella (rad.)

Viola.

Mense Majo.

Actaea (rad.)	Ranunculus acris
Aristolochia	Ranunculus bulbosus
Artemisia (rad.)	Ranunculus Flammula
Asparagus	Ranunculus repens
Chelidonium (rad.)	Rhus
Cistus	Rhus Vernix
Dictamnus (rad.)	Rosmarinus
Fragaria	Ruta
Geum (rad.)	Sabina
Jacea	Secale cereale
Iris versicolor (rad.)	Sedum acre
Juncus pilosus (rad.)	Symphytum
Kalmia	Taraxacum
Menyanthes	Taxus
Mercurialis perennis.	Thuja
Millefolium	Tilia
Oreoselinum	Tussilago (rad.)
Paris	Vinca minor.
Pinus silvestris (gemmae)	

Mense Junio.

Aconitum	Conium
Actaea racemosa	Convolvulus
Aethusa	Cotyledon
Aristolochia	Dictamnus (rad.)
Asparagus	Digitalis
Belladonna	Dulcamara
Cancer	Gratiola
Cannabis	Heracleum
Cantharides	Hyoscyamus
Carduus benedictus	Jacea
Cepa	Juglans (cort.)
Chamomilla	Lamium
Chenopodium	Laurocerasus
Cicuta virosa	Marum verum
Cistus	Menyanthes
Clematis	Millefolium
Colchicum (semina)	Nymphaea lutea (rad.)

Oenanthe (rad.)
 Oleander
 Paris
 Petroselinum
 Ranunculus acris
 — bulbosus
 — Flammula
 — repens
 — sceleratus
 Raphanus (rad.)
 Rhus

Rhus Vernix
 Rosmarinus
 Ruta
 Sambucus (flor.)
 Scrophularia
 Secale cereale
 Serpyllum
 Smyrnium
 Symphytum
 Tilia
 Verbascum.

Mense Julio.

Absinthium
 Allium
 Anagallis
 Atriplex
 Badiaga
 Belladonna
 Calendula
 Cannabis
 Cantharides
 Carduus benedictus
 Ceba
 Chamomilla
 Chenopodium
 Cistus
 Clematis
 Conium
 Convolvulus
 Dictamnus (rad.)
 Drosera
 Dulcamara
 Euphrasia
 Helianthus
 Heracleum
 Hyoscyamus
 Juglans (cort.)
 Juncus effusus (rad.)

Lactuca
 Lamium
 Laurocerasus
 Linaria
 Lycocotonum
 Majorana
 Marum verum
 Myrtus
 Oenanthe (rad.)
 Oleander
 Ranunculus Flammula
 Ranunculus sceleratus
 Raphanus (rad.)
 Rumex crispus
 Sambucus (flor.)
 Scrophularia
 Secale cornutum
 Serpyllum
 Solanum Lycopersicum
 Solanum nigrum
 Stramonium
 Tabacum
 Tanacetum
 Urtica
 Verbascum.

Mense Augusto.

Absinthium	Evonymus (fruct.)
Agaricus	Hypericum (fruct.)
Agnus castus	Lactuca
Allium	Linaria
Atriplex	Lolium
Badiaga	Lupulus
Belladonna	Lycoctonum
Boletus Satanas	Lycopodium
Bovista	Myrtus
Carduus marianus (sem.)	Rumex crispus
Chenopodium	Solanum mammosum
Colchicum (bulbi)	Stramonium
Drosera	Tanacetum
Dulcamara	Urtica
Elaterium	Uva Ursi.

Mense Septembri.

Agnus castus	Evonymus (fruct.)
Aristolochia longa (rad.)	Gentiana cruceata (rad.)
Boletus Satanas	Lupulus
Bovista	Lycopodium
Chenopodium	Phellandrium (sem.)
Elaterium	Uva Ursi.

Mense Octobri.

Agnus castus (drupae)	Phytolacca
Berberis (cort. radice)	Symphytum (rad.).
Filix	

Mense Novembri.

Artemisia (rad.)	Cyclamen (rad.).
Bryonia (rad.)	

Mense Decembri.

Helleborus (rad.).



I N D E X.

- Abeille 38.
- Absinthe 25.
- Absinthium 25.
- Absinthium vulgare 25.
- Acacia nostras 134.
- Acanthia lectularia 67.
- Acetate of baryta 48.
 - " de baryte 48.
 - " de chaux 54.
 - " of copper 76.
 - " de cuivre 76.
 - " de fer 83.
 - " of iron 83.
 - " of lead 132.
 - " of lime 54.
 - " de mercure 95.
 - " of mercury 95.
 - " of morphia 118.
 - " de morphine 118.
 - " de plomb 132.
 - " de zinc 164.
 - " of zinc 164.
- Achillea Millefolium 116.
- Acid of salpeter 28.
- Acide arsenieux 25.
 - " azotique 28.
 - " benzoïque 25.
 - " hydrochlorique 26.
 - " hydrocyanique 26.
 - " hydrofluorique 27.
 - " molybdique 28.
 - " muriatique 26.
 - " oxalique 28.
 - " phosphorique 28.
 - " prussique 26.
 - " sulfurique 29.
 - " tartrique 29.
- Acidum arsenicosum 25.
 - " azoticum 28.
 - " benzoicum 25.
 - " borussicum 26.
 - " cyanhydricum 26.
 - " fluoricum 27.
 - " hydrochloricum 26.
 - " hydrocyanicum 26.
- Acidum hydrofluoricum 27.
 - " molybdaenicum 28.
 - " muriaticum 26.
 - " Nitri 28.
 - " nitricum 28.
 - " oxalicum 28.
 - " phosphoricum 28.
 - " silicicum 145.
 - " sulphuricum 29.
 - " tartaricum 29.
 - " Vitrioli 29.
 - " zooticum 26.
- Ackerwinde 72.
- Aconit 29.
- Aconitum 29.
- Aconitum Cammarum, Napellus, Neomontanum, Stoeckeanum 29.
 - " Lycocotnum 110.
- Actaea 30.
- Actaea racemosa 30.
- Actaea spicata 30.
- Aerugo crystallisata 76.
- Aether 30.
 - " phosphoratus 129.
- Aether sulphuricus 30.
- Aethusa 30.
- Aethusa Cynapium 30.
- Aetzammon 34.
- Aetzkalk 55.
- Aetzstoff 63.
- Aetzstoffintkur 159.
- Agaricus 31.
- Agaricus muscarius 31.
- Agnus castus 31.
- Ail 32.
- Alaun 32.
- Alaunerde 32.
- Albin 31.
- Albinum 31.
- Alcohol 149.
 - " absolutus 149.
 - " dilutus 150.
 - " fortior 149.
 - " mitigatus 149.
 - " sulphuratus 159.

- Alcohol Sulphuris 61.
 All-heal 94.
 Allium 32.
 " Cepa 64.
 " sativum 32.
 Aloë 32.
 " lucida 32.
 " purpurascens 32.
 " Socotrina 32.
 " spicata 32.
 Alpenrose 137.
 Alum 32.
 Alumen 32.
 Alumina 32.
 Alumina-Kali sulphuric. cryst. 32.
 Alumine 32.
 Alun 32.
 Alveolinum 33.
 Amanita 31.
 " muscaria 31.
 Amanite fausse orange 31.
 Ambergis 33.
 Amberkraut 114.
 Ambra 33.
 Ambra gris 33.
 Ambra grisea 33.
 Ammon, kohlensaures 34.
 Ammoniacum 34.
 Ammonia 34.
 Ammoniakgummi 34.
 Ammoniaque gomme 34.
 Ammonium 34.
 " carbonicum 34.
 " chloratum 34.
 " muriaticum 34.
 " phosphoricum 35.
 Ammonphosphat 35.
 Ammonum 34.
 " carbonicum 34.
 " caust. liquid. 34.
 " phosphoricum 35.
 Amomum Zingiber 165.
 Ampfer, krausblättriger 138.
 Anacard. Anacarde 35.
 Anacardium 35.
 Anacardium longifolium 35.
 Anacardium orientale 35.
 Anagallis 36.
 " arvensis 36.
 " phoenicea 36.
 Anemone pratensis 134.
 Angelica 36.
 " Archangelica 36.
 Angelika 36.
 Angélique 36.
 Angostura Cuspare 36.
 " ferruginea 52.
 " ostindica 52.
 Angostura spuria 52.
 Angustura 36.
 " vera 36.
 Angusturarinde 36.
 Angustura bark 36.
 Angusture vraie 36.
 Animal charcoal 61.
 " oil, volatil 125.
 Anis étoilé 37.
 Anisum stellatum 37.
 Anihos 138.
 Anthracinum 37.
 Anthrakinum 37.
 Anthrakokali 37.
 " simplex 37.
 " sulphuratum 37.
 Antimoniated sulphur, brown 152.
 Antimonium 152.
 " sulphuratum 152.
 Antirrhinum Linaria 108.
 Apis 38.
 " mellifica 38.
 Apisium 38.
 Apium Petroselinum 128.
 Apocynum 38.
 " androsaemifolium 38.
 Aqua 38.
 " chlorata 66.
 " Chlora 66.
 " fortis 28.
 " oxymuriatica 66.
 " spirituosa 39.
 Aquila alba 98.
 Araignée porte-croix 39.
 Aranea 39.
 " diadema 39.
 Arbor vitae 158.
 Arbre de vie 158.
 Arbutus Uva ursi 161.
 Argent 39.
 Archangelica officinalis 36.
 Arctostaphylos officinalis 161.
 Argentum 39.
 " nitricum 40.
 " " cryst. 40.
 " praecipitat. 40.
 " vivum 95.
 Argilla 32.
 Argile à porcelaine 105.
 Aristoloche clématide 41.
 " longue 41.
 Aristolochia 41.
 " Clematidis 41.
 " longa 41.
 " officinalis 145.
 " Serpentaria 145.
 Armoise 43.
 Armoracia 41.

- Arnica 42.
 " montana 42.
 Arnikaflaster 166.
 Arséniate de chaux 54.
 Arséniate of lime 54.
 Arsenic 25.
 Arsenicum 25.
 " album 25.
 Arsenious acid. 25.
 Arsenite of copper 76.
 Arsénite de cuivre 76.
 Arsenium sulphuratum 42.
 " trisulphuratum 42.
 Artemisia 43.
 " Contra 67.
 " Lieberi 67.
 " vulgaris 43.
 Aron 43.
 " giftiger 54.
 Arthanita 78.
 Arum 43.
 " maculatum 43.
 " seginum 54.
 " tacheté 43.
 Asa foetida 43.
 Asand, stinkender 43.
 Asaraback 43.
 Asaret 43.
 Asarum 43.
 " Europaeum 43.
 Ascarides 44.
 Ascaridinum 44.
 Ascaris lumbricoides 110.
 Ascaris vermicularis 44.
 Asellus 117.
 Asparagus 44.
 " officinalis 44.
 Asperge 44.
 Aspidium Filix mas 87.
 Astacus fluviatilis 59.
 Asterias rubens 44.
 Asthma weed 109.
 Athamanta 126.
 " Oreoselinum 126.
 Athanasia 156.
 Atriplex 45.
 Atropa Belladonna 49.
 Atropin, schwefelsaures 45.
 Atropinum sulphuricum 45.
 Augeneiter 135.
 Augentrost 81.
 Auripigment 42.
 Auripigmentum 42.
 Auro-Natrium chloratum 45.
 Aurum 46.
 " chloratum 47.
 " chloratum natronatum 45.
 " muriaticum 47.
 Aurum muriaticum natronatum 45.
 " natronato-chlorat. 45.
 " natronato-muriatic. 45.
 " praecipitat. 46.
 " sulphuratum 47.
 " trichloratum 47.
 Avens 89.
 Azotate d'argent 40.
 " de potasse 104.
 " de soude 121.
 " de strychnine 154.
 Badaja 48.
 Badiaga 48.
 Badiana 37.
 Badiane 37.
 Balanorrhinum 48.
 Baldrian 161.
 Balsam of Copaiva 72.
 Balsamum Copaivae 72.
 Bandwurm 156.
 Bandwurm der Hunde 106.
 Banghee 60.
 Barbe, Barbeau 78.
 Barbel, Barber 78.
 Barberry 50.
 Barbotine 67.
 Bärenklau 94.
 Bärentraube 161.
 Bärlappsamen 111.
 Baryt, essigsaurer 48.
 " kohlsaurer 49.
 Baryta acetica 48.
 " carbonica 49.
 " muriatica 49.
 Baryum chloratum 49.
 Bear-berry 161.
 Beaume de Copahou 72.
 Bed-bug 67.
 Bee 38.
 Beifuss 43.
 Belladonne 49.
 Belladonna 49.
 Belle-dame 49.
 Benzoësaure 25.
 Benzoic acid 25.
 Berberis 50.
 " vulgaris 50.
 Berberitze 50.
 Berce 94.
 Bergpetersilie 126.
 Bête de la vierge 69.
 Bettwanze 67.
 Bibergeil 63.
 Bibernell 130.
 Bichromate of potassa 103.
 Bichrômäte de potasse 103.
 Biene 38.
 Bilsenkraut 100.

Carbonate of baryta 49.
 „ de baryte 49.
 „ de chaux 55.
 „ of copper 77.
 „ de cuivre 77.
 „ of lead 132.
 „ of lime 55.
 „ of lithia 109.
 „ de nickel 122.
 „ of nickel 122.
 „ d'oxyde de lithium 109.
 „ de plomb 132.
 „ of potassa 104.
 „ de potasse 104.
 „ of soda 121.
 „ de soude 121.
 „ of strontia 153.
 „ de strontiane 153.
 Carboneum sulphuratum 61.
 Carcinominum 61.
 „ axillare 61.
 Carduus benedictus 62.
 „ marianus 62.
 Cariesinum 62.
 Caryophyllata 89.
 Cascarilla 62.
 „ bark 62.
 Cascarille 62.
 Cassia lanceolata, lenitiva 144.
 „ obovata 144.
 Castor Fiber 63.
 Castoreum 63.
 „ Moscoviticum 63.
 „ Sibiricum 63.
 Causticum 63.
 Cedar, white 158.
 Cepa 64.
 Cephaëlis Ipecacuanha 102.
 Cerumen 64.
 Ceruminum 64.
 „ auris 64.
 Cévadilla seed 139.
 Cévadille 139.
 Chamaecistus 68.
 Chamomilla 64.
 Champignon des mouches 31.
 Chanvre 59.
 Charbon animal 61.
 „ de bois 61.
 „ d'éponge 150.
 Charcoal 61.
 Chardon beni 62.
 Chaste-tree 31.
 Chasua 70.
 Chaux 55.
 „ jodurée 56.
 Chélidoine 64.
 Chelidonium 64.

Chelidonium majus 64.
 Chenopodium 64.
 „ glaucum 64.
 „ olidum 45.
 „ Vulvaria 45.
 Cherry-laurel 107.
 China 65.
 China-clay 105.
 Chinin 66.
 Chinin, chlorwasserstoffsäures 65.
 „ phosphorsäures 65.
 „ schwefelsäures 66.
 Chininum hydrochloricum 65.
 „ muriaticum 65.
 „ phosphoricum 65.
 „ sulphuricum 66.
 Chinwood 157.
 Chiococca anguifuga 53.
 „ scandens 53.
 Chlorammonium 34.
 Chlorbaryum 49.
 Chlorate of potassa 104.
 „ de potasse 104.
 Chlore liquide 66.
 Chloride of barytium 49.
 „ of gold and soda 45.
 „ of iron 84.
 „ of magnesium 112.
 „ of sodium 120.
 Chlornatrium 120.
 Chloro-amidide of mercury 96.
 Chloro-amidure mercuriel 96.
 Chloroform. Chloroforme 66.
 Chloroformium 66.
 Chloroformylum 66.
 Chlormagnesium 112.
 Chlorum 66.
 Chlorure aurico-sodique 45.
 „ de baryum 49.
 „ de fer 84.
 „ de magnesium 112.
 „ de sodium 120.
 Chlorwasser 66.
 Chlorwasserstoffsäure 26.
 Cholelithinum 67.
 Cholelithus 67.
 Chrysomela septempunctata 69.
 Christophoriana 30.
 Christophoriane 30.
 Christophskraut 30.
 „ traubenartiges 30.
 Cicuta 72.
 Cicuta aquatica 67.
 Cicuta virosa 67.
 Cicutaria 67.
 Ciguë 72.
 Ciguë aquatique 67.
 Cimex lectularius 67.

- Cimicifuga racemosa* 30.
Cina 67.
Cinabre 100.
Cinchona Calisaya 65.
Cinchonin, schwefelsaures 68.
Cinchoninum sulphuricum 68.
Cinnabar 100.
Cinnabaris (facticia) 100.
Cinnamomum 68.
 " *acutum* 68.
 " *Ceylanicum* 68.
Cinnamon 68.
Cire des oreilles 64.
Ciste 68.
Cistenrö-lein, gemeines 68.
Cistus 68.
 " *Canadensis* 68.
 " *Helianthemum* 68.
Citri succus 68.
Citronensaft 68.
Citron-juice 68.
Clematis 69.
 " *erecta* 69.
Cloporte 117.
Cnicus benedictus 62.
Cobalt. *Cobaltum* 105.
Coca 69.
Coccionella 70.
Coccionella septempunctata 69.
Cocculus 69.
 " *palmatius* 70.
 " *Plukenetii* 69.
Coccus Cacti 70.
Cochenella. *Cochénille* 70.
Cochlearia Armoracia 41.
Cochineal 70.
Coenurinum ovium 70.
Coenurus cerebri 70.
Coffea 70.
 " *Arabica* 70.
Colchicum 71.
 " *autumnale* 71.
Colchique 71.
Colocynthis 71.
Colombo. *Colombo root* 71.
Coloquinte. *Coloquintida* 71.
Coluber Naja 120.
Columbo 71.
Comfrey 156.
Common arum 43.
Common blue flag 102.
Concombre sauvage 80.
Condylome 71.
Condylominum 71.
Confière 156.
Coni Lupuli 110.
Conium 72.
 " *maculatum* 72.
Convolvulus 72.
 " *arvensis* 72.
 " *Purga* 101.
Copaifera multijuga etc. 72.
Copaiva 72.
Copper 75.
Coques du Levant 69.
Cor au pied 93.
Corail rouge 73.
Coral, red 73.
Corallia rubra 73.
Corallium 73.
 " *rubrum* 73.
Corn 93.
Corn-bind 72.
Cornus circinata 73.
Cortex Cascarillae 62.
 " *Chinae regius* 65.
 " *radic. Granati* 91.
Coryzinum 73.
 " *Equorum* 73.
 " *Hominum* 73.
Cotyledon 73.
 " *Umbilicus Veneris* 73.
Cotyliophyllum Umbilicus 73.
Couleuvrée 52.
Coumarouna odorata 159.
Crab 59.
Crabrinum 74.
Crapaud 52.
Creosotum 106.
Créosote 106.
Crocus 74.
 " *sativus* 74.
Crocus Martis aperitivus 84.
Cross-spider 39.
Crotalinum 74.
Crotalus horridus 74.
Croton 74.
 " *Eluteria* 62.
 " *Pavana* 74.
 " *Tigilium* 74.
Crowfoot, acrid 135.
 " *bulbous rooted* 135.
 " *marsh* 136.
 " *smaller water* 135.
Croûtes laiteuses 88.
Cubeba 75.
 " *officinalis* 75.
Cubebes. *Cubebs* 75.
Cucumis Colocynthis 71.
Cuivre 75.
Cuprum 75.
 " *aceticum* 76.
 " *arsenicum* 76.
 " *carbonicum* 77.
 " *sulphuricum* 77.
Curcas purgans 101.

- Cyanide of zinc 164.
 Cyanure de zinc 164.
 Cyanwasserstoffsäure 26.
 Cynzink 164.
 Cyclamen 78.
 " Europaeum 78.
 Cynapium 30.
 Cyprinus 78.
 " Barbus 78.
 Daisy 70.
 Dakryadaesyringium 78.
 Dakrosyringium 78.
 Dandelion 157.
 Daphne Indica 78.
 " Mezereum 116.
 Darwel 110.
 Datura 153.
 " Stramonium 153.
 Deadly nightshade 49.
 Delphinium Staphisagria 151.
 Deutochloride of platinum 131.
 Deutochlorure de mercure 97.
 " de platine 131.
 Deutojodure de mercure 97.
 Deutoxyde de mercure 99.
 Dictamnus 79.
 " albus 79.
 Digitale 79.
 Digitalis 79.
 " purpurea 79.
 Diptam 79.
 Diptame blanc 79.
 Dipterix 159.
 " odorata 159.
 Diptanny, white 79.
 Doronic d'Allemagne 42.
 Douce-amère 79.
 Dracontium foetidum 133.
 Drehwurm 70.
 Dropwort, yellow 124.
 Drosera 79.
 " rotundifolia 79.
 Ducksfoot 133.
 Dulcamara 79.
 Dwale 49.
 Dysenterinum 80.
 Ear-wax 64.
 Earthmoos-seed 111.
 Eau 38.
 " spiritueuse 39.
 Echelons de pin 130.
 Ecrevisse commune 59.
 Eibenbaum 157.
 Eicheltripperschleim 48.
 Einbeere 127.
 Eisen 82.
 Eisenchlorid 86.
 Eisenchlorür 84.
 Eisenhut 29.
 Eisenjodür 85.
 Eisenoxyd, essigsäures 83.
 Eisenoxydul, kohlsäures 84.
 " milchsäures 86.
 " schwefelsäures 87.
 Elaterium 80.
 Elder 140.
 Elephantenlaus, Ostind. 35.
 Ellebore blanc 162.
 Elm-tree 160.
 Empyemium 80.
 Emplastrum Arnicae 166.
 Ergot 143.
 Eselsgurke 80.
 Enterohelcosinum 80.
 Enteropurinum 80.
 Enterosyringium 80.
 Enzianwurzel 88.
 Epeira diadema 39.
 Epinard des Indes 130.
 Epine-vinette 50.
 Eponge de rivière 48.
 Erythroxylon Coca 69.
 Essentia 12—13.
 Etain 150.
 Eher 30.
 Eugenia 80.
 " Jambosa 80.
 " vulgaris 80.
 Eupatorium Guaco 92.
 " saturejaefolium 92.
 Euphorbe 81.
 Euphorbia Canariensis 80.
 " officinarum 80.
 Euphorbium 81.
 Euphrasia 81.
 " officinalis 81.
 Euphrase. Euphrasy 81.
 Evonymus 81.
 " Europaeus 81.
 Eyebright 81.
 Faba Indica 101.
 " sancti Iognatii 101.
 " Pichurim major 130.
 " Tonco 159.
 Fabae Coffeae 70.
 Fallkraut 42.
 Faulkirsche 134.
 Feigwarze 155.
 Fell-wort 88.
 Fenouil d'eau 128.
 Fer 82.
 " oxydulé magnétique 86.
 Ferrum 82.
 " aceticum 85.

- Ferrum carbonicum** 84.
 „ chloratum 84.
 „ hydricum 84.
 „ jodatum 85.
 „ „ cum Sacch. lact. 85.
 „ lacticum 86.
 „ magneticum 86.
 „ muriatic. (oxydat.) 86.
 „ muriatic. oxydulat. 84.
 „ oxydatum fuscum 84.
 „ sesquichloratum 86.
 „ sulphuricum 87.
Feuerspinnchen 158.
Feuilles de Séné 144.
Fève de St. Ignace 101.
 „ Tonca 159.
Fichtensprossen 130.
Fic. Fig 155.
Ficus infernalis 101.
Figwort 142.
Filix. Filix mas 87.
Firnissumach 138.
Fistula ani 80.
 „ of the anus 80.
Fistule du boyau-culier 80.
Flammula 135.
Flattersimse 103.
Flax-weed 108.
Flechte 94.
Fleckenschierling 72.
Fleurs de Benjoin 25.
Fleurs blanches 108.
Flieder 140.
Fliegenschwamm 31.
Flores Acaciae nostratis 134.
 „ Benzoës 25.
 „ Zinci 165.
Flox-glove 79.
Fluor albus 108.
Fluoric acid 27.
Fluorwasserstoffsäure 27.
Fluss, weisser 108.
Flusssäure 27.
Foeniculum aquaticum 128.
Foirole 116.
Fools-parsley 30.
Formica 88.
 „ rufa 88.
Formylum chloridatum 66.
Fourmi des bois 88.
Fragaria 88.
 „ vesca 88.
Fragula 88.
Fraisier 88.
Fraxinella 79.
Freckle 111.
Frelon 74.
French mercury 116.
Fructus Capsici annui 60.
 „ Tetragoniae 81.
Fougère mâle 87.
Fusain 81.
Fussblatt, schildförmiges 133.
Fusssohlenhaut, hornige 133.
Fussschweiss 155.
Galactoplainum 88.
Galipea febrifuga 36.
Gallenstein 67.
Gallstone 67.
Gänsefuss, grauer 64.
Garden-angelika 36.
Garlick 32.
Gartengleise 30.
Gartenraute 139.
Gartenrettig 136.
Gauchheil 36.
Gebärmutterblutfluss 116.
Geffium 25.
Gehirnblasenwurm 70.
Gentiana 88.
 „ cruciata 89.
 „ lutea 88.
 „ rubra 88.
Gentiane croisetie 89.
Gentiane jaune 88.
Germander 114.
Germadrée maritime 114.
Gesichtsblüthen, eiternde 133.
Geum 89.
 „ urbanum 89.
Gichtrose 127.
Gichtrübe 52.
Gifthahnenfuss 136.
Giftapfel 147.
Giftlattig 107.
Giftumach 137.
Gingembre 165.
Ginger-root 165.
Ginseng 89.
Ginsengroot 89.
Glaieul bariolé 102.
Glanders 95.
Glaubersalz 121.
Globuli saccharati 139.
 „ saccharini 139.
 „ e Saccharo et Amylo parati 139.
Glonoïnum 89.
Glossolentorium 90.
Glycerinum nitrosatum 89.
Gold 46.
Goldchlorid 46.
Goldnatriumchlorid 45.
Goldschwefel 151.
Gonorrhinum 91.
Goose-foot, gray 64.
 „ stinking 45.

- Gottesgnadenkraut 91.
 Graecum album 31.
 Graines de Tilly 74.
 Grana Coccionellae 70.
 „ Tiglii 74.
 Granatum 91.
 Granatwurzelnrinde 91.
 Granular sugar 139.
 Graphites 91.
 Gratiola 91.
 „ officinalis 91.
 Grenadier 91.
 Grindkopf 159.
 Grippenschleim 102.
 Grippinum 102.
 Guaco 92.
 Guako 92.
 Guajac 92.
 Guajacum 92.
 „ officinale 92.
 Guajakharz 92.
 Gum ammoniac 34.
 Gummi ammoniacum 34.
 „ Gutti 92.
 Gummi-resina Euphorbii 81.
 Gunjah 60.
 Gutti 92.
 Gyps 57.
 Gypsum 57.
 Haematoxylon 92.
 „ Campechianum 92.
 Hahnenfuss, knolliger 135.
 „ kriechender 136.
 „ scharfer 135.
 Hanf 59.
 Harnabsatz 160.
 Harnstein 160.
 Hartriegel, rundblättriger 73.
 Hartsease pensies 100.
 Haselwort 43.
 Haselwurz 43.
 Hauhechel 126.
 Hautschunden 137.
 Hebradendron cambigioides 92.
 Hedge hyssop 91.
 Helianthemum 68.
 „ vulgare 68.
 Helianthus 93.
 „ annuus 93.
 Helinum 93.
 Hellebore 93.
 „ black 93.
 „ white 162.
 Hellebore blanc 162.
 Helleborus 93.
 „ albus 162.
 „ niger 93.
 Helmed-fish 108.
 Hemlock 72.
 Hemp 59.
 Henbane 100.
 Hepar Sulphuris calcareum 58.
 Heracleum 94.
 „ Sphondylium 94.
 Herba Aconitii 29.
 „ Clematidis erectae 69.
 „ Flammulae Jovis 69.
 Herbe au charpentier 116.
 Herbe à pauvre homme 91.
 Herbe Saint-Christophe 30.
 Herbstzeitlose 70.
 Herculinum 94.
 Herpe 94.
 Herpinum 94.
 Hippoestrinum 94.
 Hipposudorinum 94.
 „ humidum 94.
 „ siccum 94.
 Hippozaeninum 95.
 Hoglouse 117.
 Hollunder 140.
 Holmesweed 142.
 Holzameise 88.
 Holzkohle 61.
 Hop, common 110.
 Hopfen 110.
 Hornet. Hornisse 74.
 Horse radish 41.
 Horse-shoe 108.
 Houblon 110.
 Huflattig, grosser 159.
 Huile, animale volatile 125.
 „ de foie de Morue 125.
 „ de Térébinthine 125.
 Humaninum 95.
 Humulus Lupulus 110.
 Hundspetersilie 30.
 Hydatid in the brain of the sheeps 70
 Hydatide cérébrale 70.
 Hydrargyrum 95.
 „ aceticum 95.
 „ amidato-bichloratum 96.
 „ amidato-nitricum oxydulatum 96.
 „ ammoniato-muriat. 96.
 „ bichloratum 97.
 „ bijodatum 97.
 „ chloratum mite 98.
 „ jodatum flavum 98.
 „ muriatic. corros. 97.
 „ „ mite 98.
 „ nitricum 98.
 „ „ oxydulat. 98.
 „ „ „ cryst. 98.
 „ oxydatum rubrum 99.
 „ oxydulat. ammoniat. 96.
 „ oxydulat. Hahnemanni 96.

Hydrargyrum oxydulat. nigrum 96.
 „ phosphoricum 99.
 „ „ oxydulat. 99.
 „ sulphuratum rubrum 100.
 Hydrochlorate d'ammoniaque 34.
 „ of Quinia 65.
 „ de Quinine 65.
 Hydrochloric acid 26.
 Hydrocyanic acid 26.
 Hydrofluoric acid 27.
 Hydrophobinum 100.
 Hyoscyamus 100.
 „ niger 100.
 Hypericum 100.
 „ perforatum 100.
 Jacea 100.
 Jalap 101.
 Jalapa 101.
 Jalappe 101.
 Jambusenmyrte, wilde 80.
 Jamrose 80.
 Jatropha 101.
 „ Curcas 101.
 „ purgans 101.
 Ichweed (Helleb. alb.).
 If 157.
 Ignatia 101.
 „ amara 101.
 Ignatius-bean 101.
 Ignatiusbohne 101.
 Illicium anisatum 37.
 India berries 69.
 Indian blue 101.
 Indicum 101.
 Indig 191.
 Indigo 101.
 Indigofera 101.
 „ tinctoria, Anil 101.
 Influenzinum 102.
 Ingwer 165.
 Jod. Jode 102.
 Jodina. Jodine 102.
 Jodic lime 56.
 Jodide of iron 85.
 „ of potassium 105.
 Jodkalium 105.
 Jodkalk 56.
 Jodum 102.
 Jodure de fer 85.
 „ de mercure 98.
 „ de potasse 105.
 Johanneskraut 100.
 Johanneswurzel 87.
 St. Johnswort 100.
 Ipecacuanha 102.
 Ipomoea Purga 101.
 Iris nobilis 73.
 Iris versicolor 102.

Iron 82.
 Juglans 103.
 „ regia 103.
 Juncus effusus 103.
 „ pilosus 103.
 Juniperus Sabina 140.
 Jus de citron 68.
 Jusquiam 100.
 Ivraie 110.
 Kadmium 52.
 „ schwefelsaures 53.
 Kaffe 70.
 Kaiserthee 157.
 Kali bichromicum 103.
 „ carbonicum 104.
 „ chloricum 104.
 „ chlorsaures 104.
 „ chromicum rubrum 103.
 „ doppelt chromsaures 103.
 „ hydrobromicum 104.
 „ hydrojodicum 105.
 „ kohlenaures 104.
 „ nitricum 104.
 „ salpetersaures 104.
 Kalium bromatum 104.
 „ jodatium 105.
 Kalk, gebrannter 55.
 Kalkerde, arsensaure 54.
 „ essigsäure 54.
 „ kohlenaure 55.
 „ phosphorsaure 57.
 „ schwefelsäure 57.
 Kalkschwefelleber 58.
 Kalmia 105.
 „ latifolia 105.
 Kalmie 105.
 Kalomel 98.
 Kamille 64.
 Kampf 59.
 Kaolinum 105.
 Karbunkelleiter 37.
 Kardobenedicten 62.
 Karkininum 105.
 Kaskarille 62.
 Katzengamander 114.
 Kellerassel 117.
 Kermes 152.
 „ minerale 152.
 Kermesbeere 130.
 Keuschbaum 31.
 Kieselerde. Kieselsäure 145.
 Kirschlorbeer 107.
 Klapperschlangengift 74.
 Klauenseucheneiter 52, 124.
 Kleesäure 28.
 Knoblauch 32.
 Knochenerde 57.
 Knochenfrassjauche 62.

- Kobalt 105.
 Kobaltum 105.
 Kochsalz 120.
 Kockelskörner 69.
 Kohle, thierische 61.
 Koka 69.
 Koloquinte 71.
 Kolumbowurzel 71.
 Kondylom 71.
 Königsschina 65.
 Königskerze 162.
 Königskrabbe 108.
 Kopaivabalsam 72.
 Kopfergrind 159.
 Koralle, rothe 73.
 Koschenille 70.
 Kraftwurzel 89.
 Krameria triandra 136.
 Krätzpustel 142.
 Krebs 59.
 Krebsseiter 61, 105.
 Kreosot. Kreosote 106.
 Kreosotum 106.
 Kreuzenzian 89.
 Kreuzspinne 39.
 Kropfwurzel 142.
 Kröte 52.
 Kubeben 75.
 Küchenschelle 134.
 Kupfer 75.
 Kuhpockenstoff 161.
 Kupferoxyd, arsenigsaures 76.
 „ essigsaures 76.
 „ kohlenisaures 77.
 „ schwefelsaures 77.
 Kynoluium 106.
 Kynotorrhinum 106.
 Lachesinum 106.
 Lachesis 106.
 Lacryminum 107.
 Lactate de fer 86.
 „ of iron 86.
 Lactuca 107.
 „ virosa 107.
 Lady-bird. Lady-cow 69.
 Laitue vireuse 107.
 Lamium 107.
 „ album 107.
 Lapis magneticus 86.
 Larmes 107.
 Laryngophthisinum 107.
 Laudanum 126.
 Laureole femelle 116.
 Laurier-cérise 107.
 „ rose 125.
 Laurocerasus 107.
 Laurose 125.
 Laurus Camphora 59.
 Laurus Sassafras 141.
 Läusekörner 139.
 Lead 131.
 Leberfleck 111.
 Leberthran 125.
 Ledum 108.
 „ palusire 108.
 Leichdorn 93.
 Leinkraut 108.
 Leopard's bane 42.
 Lesser hemlock 30.
 Lettuce, acrid 107.
 Leucorrhinum 108.
 Liebesapfel 147.
 Lignum Campechianum 92.
 Lime 55.
 Limus Cyclops 108.
 Linaire 108.
 Linaria 108.
 „ vulgaris 108.
 Linde. Linden 158.
 Liondent 157.
 Lippitudinum 109.
 Liquor Ammonii caust. 34.
 „ Chlori 66.
 Liseron, petit 72.
 Liset 72.
 Lithanthrakokali 37.
 „ sulphuratum 37.
 Lithion carbonicum 109.
 Lithium 109.
 Lithon, kohlenisaures 109.
 Lithonum carbonicum 109.
 Liver-oil 125.
 Lobelia 109.
 „ common 109.
 „ inflata 109.
 Lobelie 109.
 „ enflée 109.
 Log-wood 92.
 Lolium 110.
 „ temulentum 110.
 Long-rooted birthwort 41.
 Love-apple 147.
 Löwenzahn 157.
 Lufröhreneiter 107.
 Lumbricinum 110.
 Lungengeschwürreiter 80.
 Lungenschwindsuchtereiter 132.
 Lungenstein 132.
 Lupulus 110.
 Luzula pilosa 103.
 „ vernalis 103.
 Lycoctonum 110.
 Lycopode 111.
 Lycopodium 111.
 „ annotinum 111.
 „ clavatum 111.

Lycopodium complanatum 111.
Lytta vesicatoria 60.
Macula hepatica 111.
Macula hepaticum 111.
 Magistère de bismuth 50.
Magisterium Bismuthi 50.
 Magistery of bismuth 50.
Magnesia alba 111.
 „ *carbonica* 111.
 „ (*kohlensaure*) 111.
 „ *muratica* 112.
 „ *sulphurica* 111.
Magnesium chloratum 112.
 Magneteisenstein 86.
 Magnetic iron ore 86.
 „ *ironstone* 86.
 Magnetstein 86.
 Maiapfel 133.
 Maiwurm 115.
 Majoram 112.
 Majorana 112.
 Malacca bean 35.
 Male fern 87.
Manganese aceticum 113.
 „ *carbonicum* 113.
 „ *oxydat. nativ.* 114.
Manganhyperoxyd 114.
Manganoxydul, essigsaures 113.
 „ *kohlensaures* 113.
Manganum aceticum 113.
 „ *carbonicum* 113.
 „ *hyperoxydatum* 114.
 „ *superoxydatum* 114.
 Man's excrements 93.
Marcasita alba 50.
 Marienkäfer 69.
 Marjolaine 112.
 Mars 82.
 Marum 114.
 „ *verum* 114.
 Marygold 59.
 Masernschuppen 117.
 Mastdarmfistel 80.
Mastocarcinominum 115.
 Mastwurm 44.
Matricaria Chamomilla 64.
 Mauerpfeffer 143.
 Maulseuchenschleim 52.
 Maw-worm 110.
 May-apple 133.
 Mayran 112.
 May-worm 115.
 Meadow-saffron 70.
 Meconium 126.
 Medorrhinum 115.
 Meerrettig 41.
 Meerschwamm, gerösteter 150.

Meerstern, rother 44.
Melampodium 93.
 Melde, graue 64.
 Melde, stinkende 45.
Meletinum 115.
 Meloë 115.
 „ *proscarabaeus* 115.
 „ *vesicatorius* 60.
 „ *violaceus* 115.
Menispermum Cocculus 69.
 „ *palmatum* 71.
 Menschenkoth 95.
 Menyanthes 115.
 „ *trifoliata* 115.
 Mephitis 115.
 „ *Putorius* 115.
 Mercure 95.
 „ *praecipité blanc* 96.
 „ *soluble de Hahnemann* 96.
 Mercuriale 116.
Mercurialis perennis 116.
Mercurius aceticus 95.
 „ *bijodatus* 97.
 „ *corrosivus* 97.
 „ *dulcis* 98.
 „ *jodatus* 98.
 „ „ *ruber* 97.
 „ *nitricus* 98.
 „ *nitrosus* 98.
 „ *phosphoratus* 99.
 „ *phosphoricus* 99.
 „ *praecipitatus albus* 96.
 „ „ *ruber* 99.
 „ *protojodatus* 98.
 „ *solubilis* 96.
 „ *sublimatus* 97.
 „ *vivus* 95.
 Mercury 95.
 Mercury, french 116.
 Merde 95.
 Metorrhaginum 116.
 Mezereon 116.
Mezereum 116.
Mikania Guaco 92.
 Milchschorf 88.
 Milchzucker 139.
 Milk-scab 88.
 Milkwort 144.
 Mille feuille 116.
 Millefolium 116.
 Millepertuis 100.
 Millepès 117.
 Mocca. Mockakaffe 70.
 Mocca-Coffee-berry 70.
 Molluca-grains 74.
Molybdaena 117.
 Molybdänsäure 28.

Molybdaenum sulphuratum 117.
Molybdic acid 28.
Momordica 80.
 „ *Elatium* 80.
Mönchspfeffer 31.
Monkshood 29.
Monoculus Polyphemus 108.
Morbillinum 117.
Morelle 147.
Morelle à grappes 130.
Morphia 117.
Morphin 117.
Morphin, chlorwasserstoffsäures 118.
 „ *essigsäures* 118.
 „ *schwefelsäures* 118.
Morphine 117.
Morphinum 117.
 „ *aceticum* 118.
 „ *hydrochloricum* 118.
 „ *sulphuricum* 118.
Morphium 117.
 „ *aceticum* 118.
 „ *muraticum* 118.
 „ *sulphuricum* 118.
Moschus 118.
Moschus Tunquinensis 118.
 „ *moschiferus* 118.
Moschuswurzel 155.
Mother of thyme 145.
Mouffette 115.
Mountain-arnica 42.
 „ *parsley* 126.
Mouron 36.
Mucosité catharrale 73.
Mucosité de la fistule lacrymale 78.
Mucus 73.
 „ *of weeping fistula* 78.
Mugwort 43.
Mullein, yellow 162.
Murex 119.
 „ *inflatus* 119.
 „ *purpureus* 119.
Muriatic acid 26.
Musc. Musk 118.
Muskatnuss 123.
Mutterkorn 143.
Myristica aromatica 123.
Myristica moschata 123.
Myrte 119.
Myrtle 119.
Myrtus 119.
 „ *communis* 119.
Nabelkraut 73.
Nachtschatten, schwarzer 147.
Neja tripudians 120.
Nasengeschwürreiter 127.
Nasenpolyp 133.
Natrium chloratum 120.

Natrium sulphuratum 120.
Natron, kohlenaures 121.
 „ *salpetersäures* 121.
 „ *schwefelsäures* 121.
Natrum 121.
 „ *boracicum natronatum* 50.
 „ *carbonicum* 121.
 „ *hydrochloricum* 120.
 „ *muraticum* 120.
 „ *nitricum* 121.
 „ *sulphuratum* 120.
 „ *sulphuricum* 121.
Navel-wort 73.
Nectandra Puchury major 130.
Nelkenwurzel 89.
Nénuphar jaune 124.
Nephraposteminum 121.
Nephrolithinum 122.
Nerium 125.
 „ *Oleander* 125.
Nessel, weisse 107.
Nettle, stinging 160.
Nettle, withe 107.
Niccolum 122.
 „ *carbonicum* 122.
Nickel 122.
Nickeloxydul, kohlenaures 122.
Nicotiana 156.
 „ *Tabacum* 156.
Nicotiane 156.
Nierenstein 122.
Nieswurz, schwarze 93.
 „ *weisse* 162.
Night-shade 79.
Nitrate d'argent 40.
 „ *of bismuth* 50.
 „ *of potassa* 104.
 „ *de potasse* 104.
 „ *of silver* 40.
 „ *of soda* 121.
 „ *of strychnine* 154.
Nitric acid 28.
Nitroglycerinum 89.
Nitrum 104.
 „ *cubicum* 121.
Nixblume 124.
Noix de Barbades 101.
 „ *de Muscade* 123.
Noix purgatives 74.
 „ *vomique* 123.
Nombril de Venus 73.
Nonpareille 139.
Noyer 103.
Nuces Sassafras 130.
Nuphar luteum 124.
Nutmeg 123.
Nux cathartica Americ. 101.
Nux moschata 123.

- Nux vomica 123.
 Nymphaea lutea 124.
 Odontonecrosinum 124.
 Odontosyringium 124.
 Oenanthe 124.
 " crocata 124.
 " jaune 124.
 Ohrdrüsenleite 127.
 Ohrenausfluss der Hunde 106.
 " des Menschen 127.
 Ohrenschmalz 64.
 Ohrwurmer 106.
 Oignon 64.
 Oil-beetle 115.
 Oipodopurinum 124.
 Oleander 125.
 Oleum animale 125.
 " Cornu Cervi rectif. 125.
 " Dippellii 125.
 " Jecoris Aselli 125.
 " Terebinthinae 125.
 " Vitrioli 29.
 Onion 64.
 Oniscus 117.
 " Asellus 117.
 Ononis 126.
 " spinosa 126.
 Ophiotoxinon 125.
 Opium 126.
 Oreille d'ane 126.
 Oreoselinum 126.
 Orme 160.
 Orpiment 42.
 Ortie 160.
 Ortie blanche 107.
 Osterluzei 41.
 " lange 41.
 Otorrhinum 127.
 " hominum 127.
 Oxalic acid. 28.
 Oxyd of zinc 165.
 Ozaeninum 127.
 Padus 134.
 Paeonia 127.
 " officinalis 127.
 " peregrinus 127.
 Pacony, common 127.
 Pain de pourceau 78.
 Panax 89.
 " quinquifolium 89.
 Päonie 127.
 Papaver somniferum 126.
 Paris 127.
 " quadrifolia 127.
 Parisette 127.
 Parotidipurinum 127.
 Parsley 128.
 Passe-rage 41.
 Patte d'oie 45.
 " " grise 64.
 Pensée tricolore 100.
 Perchloride of gold 47.
 " of mercury 97.
 Perchlorure d'or 47.
 Perjodide of mercury 97.
 Periwinkle, lesser 163.
 Perilthee 157.
 Persil 128.
 " de bouc 130.
 Peroxyde de manganèse 114.
 " of manganese 114.
 " of mercury 99.
 Persulfure d'antimoine 151.
 Pervenche petite 163.
 Pervinca 163.
 Pestwurzel 159.
 Petasite 159.
 Petasites 159.
 " officinalis 159.
 " vulgaris 159.
 Petersilie 128.
 Petite ciguë 30.
 Pétrole 128.
 Petroleum 128.
 Petroselinum 128.
 " montanum 126.
 " sativum 128.
 Peucedanum 126.
 " Oreoselinum 126.
 Pfaffenhütchen 81.
 Pfeffer, spanischer 60.
 Pferdehufeiter 133.
 Pferdeschweiss 94.
 Pferdestaub 94.
 Pharmacolithos 54.
 Phellandre 128.
 Phellandrium 128.
 " aquaticum 128.
 Phosphor. Phosphore 128.
 Phosphoric acid 28.
 Phosphorsäure 28.
 Phosphate of ammonia 35.
 " d'ammoniaque 35.
 Phosphate de chaux 57.
 " of lime 57.
 " of Quinia 65.
 " de Quinine 65.
 Phosphorus 128.
 " Aethere solutus 129.
 " Spiritu vini solutus 129.
 Phytolacca 130.
 " decandra 130.
 Phytolaque 130.
 Pichurim 130.
 Pichurimbohne 130.
 Pierre de fiel 67.

- Pignons d' Inde 101.
 Pimpinella 130.
 „ nigra saxifraga 130.
 Pine-strobiles 130.
 Pink-root 89.
 Pinus silvestris 130.
 Piper caudatum 75.
 „ Cubeba 75.
 Piper Hispanicum 60.
 Pissenlit 157.
 Pivoine 127.
 Platin 131.
 Platina. Platine 131.
 Platinechlorid 131.
 Platinum 131.
 „ bichloratum 131.
 „ divisum 131.
 „ muriaticum 131.
 Plomb 131.
 Plombagine 91.
 Plumbago 91.
 Plumbum 131.
 „ aceticum 132.
 „ carbonicum 132.
 „ divisum 132.
 „ praecipitatum 132.
 Pneumolihinum 132.
 Pneumophthisinum 132.
 Pockenstoff, unction 162.
 Podocladinum 133.
 Podophylle 133.
 Podophyllum 133.
 „ peltatum 133.
 Podopyoninum equorum 133.
 Poissonnet 123.
 Poivre d'Espagne 60.
 „ de muraille 143.
 Pol-cat 115.
 Polygala Senega 144.
 Polype au nez 133.
 Polypinum narium 133.
 Polypodium Filix mas 87.
 Polypus of the nose 133.
 Pomegranate 91.
 Pomme d'amour 147.
 „ poison 147.
 Porcellion 117.
 Porke physic 130.
 Porkweed 130.
 Porzellanerde. Porcellanthon 105.
 Potassio-tartrate of antimony 151.
 Pothos foetidus 133.
 Praecipitat, weisser 96.
 Praecipitate, white 96.
 Prosopopurinum 133.
 Protoacétate de manganèse 113.
 Protoacetate of manganese 113.
 Protocarbonate de manganèse 113.
 Protocarbonate of manganese 113.
 Protochloride of mercury 98.
 Protochlorure de mercure 98.
 Protojodide of mercury 98.
 Protonitrate of mercury 98.
 Protonitrate de mercure 98.
 Protosphosphate de mercure 99.
 „ of mercury 99.
 Protosulfure d'antimoine, noire 152.
 „ d'antimoine, rouge 152.
 Protosulfure de molybdaene 117.
 „ d'or 47.
 Protosulphide of antimony, grey 152.
 Protosulphide of molybden 117.
 Protosulphuret of gold 47.
 Prunier épineux 134.
 Prunus Laurocerasus 107.
 Prunus Padus 134.
 „ spinosa 134.
 Prussic acid 26.
 Pseudoangustura 52.
 Psorinum hominum 142.
 Puck-fist 51.
 Pulsatilla 134.
 Pulsatille 134.
 Punaise 67.
 Purgirkörner 74.
 Purple 119.
 Pourpre 119.
 Purpurschnecke 119.
 Putamina Nuc. Juglandis 103.
 Putier 134.
 Pyoninum bubonum 134.
 Pyoninum oculorum 135.
 Quecksilber 95.
 „ Hahnemann's auflösliches 96.
 Quecksilberamidchlorid 96.
 Quecksilberchlorid 97.
 Quecksilberchlorür 98.
 Quecksilberjodid 97.
 Quecksilberjodür 98.
 Quecksilberoxyd 99.
 Quecksilberoxydul, essigsures 95.
 „ phosphorsures 99.
 „ salpetersures 98.
 Quecksilberoxydulamid, salpetersures 96.
 Queesenwurm 70.
 Quendel 145.
 Quicksilver 95.
 Quinquina Calisaga 65.
 „ jaune royal 65.
 Racine de sumbul 155.
 Radish 136.
 Radix Ninsi 89.
 Raifort 41.
 Rainfarn 156.
 Rana Bufo 52.

- Ranunculus acris* 135.
 „ *bulbosus* 135.
 „ *Flammula* 135.
 „ *repens* 136.
 „ *sceleratus* 136.
Raphanus 136.
 „ *rusticanus* 41.
 „ *sativus* 136.
Ratanha 136.
Ratanhawurzel 136.
Ratanhia 136.
Rattlesnake 144.
Rave 136.
Rebendolde, giftige 124.
Recise 89.
Red sulphuret of mercury 100.
Redroot 141.
Refined borax 50.
Renoncule acre 135.
 „ *bulbeuse* 135.
 „ *flammule* 135.
 „ *rampante* 136.
 „ *scélérate* 136.
Resina Guajaci 92.
Restharrow 126.
Rettig 136.
Rhabarbarum 137.
Rhabarber 137.
Rhagades syphiliticae 137.
Rhagadinum 137.
Rheum 137.
Rhododendron 137.
 „ *Chrysanthum* 137.
Rhubarb 137.
Rhubarbe 137.
Rhus 137.
 „ *radicans* 137.
 „ *Toxicodendron* 137.
 „ *venenata* 138.
 „ *Vernix* 138.
Rinderpestgift 51.
Ringelblume 59.
Rocke-rose 68.
Roggen 143.
Romarin 138.
Romarin sauvage 108.
Rorella 79.
Rorelle 79.
Ros solis 79.
Rosebay 137.
Rose-laurel 125.
Rose de Sibérie 137.
Rosemary, wild 108.
 „ *common* 138.
Rosmarin 138.
Rosmarinus 138.
 „ *officinalis* 138.
Rotzeiter 95.
Round worm 110.
Royal bark 65.
Rue 139.
 „ *common* 139.
Rumex crispus 138.
Ruta 139.
 „ *graveolens* 139.
Rye 143.
Sabadilla 139.
 „ *officinalis* 139.
Sabadillkörner 139.
Sabina 140.
 „ *officinalis* 140.
Sabine 140.
Saccharum granulatum 139.
 „ *lactis* 139.
 „ *Saturni* 132.
Sadebaum 140.
Safran. Saffron 74.
Sal amarum 111.
Sal amoniacum 34.
Sal ammoniacque 34.
Sal Anglicum 111.
Sal auri Figuieri 45.
Sal culinare 120.
Sal Tartari 104.
Salmiak 34.
Salmiakgeist 34.
Salmonde 89.
Salpeter 104.
Salpetersäure 28.
Salsepareille 141.
Salzsäure 26.
Sambucus 140.
 „ *nigra* 140
Samenflüssigkeit 91.
Sanguinaire de Canada 141.
Sanguinaria 141.
 „ *Canadensis* 141.
Sarsaparilla 141.
Sassafras 141.
 „ *officinalis* 141.
Sassaparilla 141.
Sassaparille 141.
Saubrod 78.
Savin 140.
Saxifraga 130.
Scabby-scall 159.
Scabiesinum 142.
Scarabé onctueux 115.
Scarlatinum 142.
Schafgarbe 116.
Scharlachbeere 130.
Scharlachschnuppe 142.
Scheel'sches Grün 76.
Scheidewasser 28.
Schierling 72.
Schlangengift 125.

- Schlangenwurz, Virginische 145.
 Schleedorn 134.
 Schnupfenausfluss 73.
 Schöllkraut 64.
 Schraubenwurm 94.
 Schwammkohle 150.
 Schwarzwurz 156.
 Schwefel 155.
 Schwefelcalcium 58.
 Schwefelgold 47.
 Schwefelkohlenstoff 61.
 Schwefelmolybdän 117.
 Schwefelnatrium 120.
 Schwefelsäure 29.
 Schwefelspiegelschwarz, pomeranzenfarb. 151.
 „ rother 152.
 „ schwarzer 152.
 Schweiss, kolloquativer 155.
 Schwerdtlilie, bunte, 102.
 Seilla 142.
 „ maritima 142.
 Seille 142.
 Scrophulaire 142.
 Scrophularia 142.
 „ nodosa 142.
 Scrophulinum 143.
 Secale cereale 143.
 „ cornutum 143.
 Sedon 143.
 Sedum acre 143.
 Seidelbast 116.
 Seigle 143.
 Selen 144.
 Selene 144.
 Selenium 144.
 Selenum 144.
 Selenum Oreoselinum 126.
 Semecarpus Anacardium 35.
 Semen Cardui Mariae 62.
 „ Cataputiae min. 74.
 „ Cinae 67.
 „ Cocculi 69.
 „ Coffeae 70.
 „ Lycopodii 111.
 „ Ricini majoris 101.
 „ Santonici 67.
 Semen-Contraria 67.
 Semence de chardon-marie 62.
 Semina Staphidis agrariae 151.
 Senega 144.
 Senega 144.
 Senna 144.
 Senna leaves 144.
 Sennesblätter 144.
 Sepia 144.
 „ octopoda 144.
 „ officinalis 144.
 Sepia. Sepie 144.
 Serpent à lunettes 120.
 Serpentaire de Virginie 145.
 Serpentaria 145.
 „ Brasiliana 53.
 Serpolet 145.
 Serpyllum 145.
 Service-berry 134.
 Sesqui-carbonate of ammonia 34.
 „ d'ammoniaque 34.
 Sesquichloride of iron 86.
 Sesquichlorure de fer 86.
 Sevenbaum 140.
 Shumac 137.
 Sidhee 60.
 Silber 39.
 Silberoxyd, salpetersaures 40.
 Silica. Silice 145.
 Silicea 145.
 Silicia 145.
 Silybum marianum 62.
 Silver 39.
 Simse, haarige 103.
 Skrofelneiter 143.
 Skunk 115.
 Sloetree 134.
 Small worms 44.
 Smilax 141.
 Smyrnum 146.
 „ aureum 146.
 Snakeroot, Virginian 145.
 Soda 121.
 Solan'n 146.
 Solaninum 146.
 Solanum Dulcamara 79.
 „ lignosum 79.
 „ lycopersicum 147.
 „ mammosum 147.
 „ nigrum 147.
 Solution of chlorine 66.
 Sonnenblume 93.
 Sonnenkäfer 69.
 Sonnentau 79.
 Souci des jardins 59.
 „ de soleil 59.
 Soufre 155.
 Sousborate de soude 50.
 Souscarbonate de fer 84.
 „ of magnesia 111.
 „ de magnésie 111.
 Sousnitrate de bismuth 50.
 Sow-bread 78.
 Spanische Fliegen 60.
 Spanish blistering flies 60.
 Spargel 44.
 Sparrow-grass 44.
 Spear wort 135.
 Speichel Wasserscheukranker 100.

- Sphondilium 94.
 Spectacle-snake 120.
 Spelter 163.
 Spiauter 163.
 Spiessglans 152.
 Spigelia 148.
 " anthelmia 148.
 Spillbaum 81.
 Spindlebush 81.
 Spirituous water 39.
 Spiritus Aetheris nitrosi 148.
 " Calcariae 55.
 " Nitri dulcis 148.
 " nitrico-aethereus 148.
 " vini 149.
 " " absolutus 149.
 " " alcoholisatus 149.
 " " dilutus 150.
 " " rectificatissimus 149.
 " " rectificatus 149.
 " " sulphuratus 159.
 Spondyle 94.
 Sponge, burnt 150.
 Spongia 150.
 " lacustris 48.
 " marina tosta 150.
 " palustris 48.
 " tosta 150.
 " usta 150.
 Spongilla lacustris 48.
 Springgurke 80.
 Springwurm 44.
 Spulwurm 110.
 Spurred-rye 143.
 Squill, officinal 142.
 Squilla 142.
 Squirting cucumber 80.
 St. Mary's thistle-seeds 62.
 Stannum 150.
 " praecipitatum 150.
 Staphisagria 151.
 Staphisaigre 151.
 Staranise 37.
 Staubschwamm 51.
 Stavesacre 151.
 Stechapfel 153.
 Steinkohlenkali 37.
 " geschwefeltes 37.
 Steinöl 128.
 Stephanskörner 151.
 Sternanis 37.
 Stiefmütterchen 100.
 Stibio-Kali tartaricum 151.
 Stibium sulphurat. aurant. 151.
 " sulphurat. nigrum 152.
 " sulphurat. rubeum 152.
 Stichkörner 62.
 Stinking assa 43.
 Stingking goose-foot 45.
 Stinkthier 115.
 Stone-crop 143.
 Stramonium 153.
 Stramony 153.
 Strawberry, wild 88.
 Streukügelchen 139.
 Strobili Lupuli 110.
 Strongle 110.
 Strontiana 153.
 " carbonica 153.
 Strontianerde 153.
 Strychnin 154.
 " salpetersaures 154.
 " schwefelsaures 154.
 Strychnina 154.
 Strychnine 154.
 Strychninum 154.
 " nitricum 154.
 " sulphuricum 154.
 Strychnium 154.
 Strychnos Ignatii 101.
 Strychnos nux vomica 52, 123.
 Sturmhut 29.
 " gelber 110.
 Sublimat 97.
 Succus Citri 68.
 " Sepiae 144.
 " Thebaicus 126.
 Sucre de lait 139.
 Sudorinum pedum 155.
 " phthisicum 155.
 Sueur de cheval 94.
 Sugar-globulets 139.
 Sugar of milk 139.
 Sulfate d'atropine 45.
 " de cadmium 53.
 " de chaux 57.
 " de cinchonine 68.
 " de cuivre 77.
 " de fer 87.
 " de magnesia 111.
 " de morphine 118.
 " de quinine 66.
 " de soude 121.
 " de strychnine 154.
 " de zinc 165.
 Sulfure de carbone 61.
 " de chaux 58.
 " de sodium 120.
 Sulphate of atropia 45.
 " of cadmium 53.
 " of cinchonine 68.
 " of copper 77.
 " of iron 87.
 " of lime 57.
 " of magnesia 111.
 " of morphia 118.

- Sulphate of Quinia 66.
 " of soda 121.
 " of strychnine 154.
 " of zinc 165.
 Sulphide of sodium 120.
 Sulphur 155.
 " auratum 151.
 " carbonatum 61.
 " stibiatus aurant. 151.
 " stibiatus rubeum 152.
 " sublimat. lotum 155.
 Sulphuret of antimony, yellow 151.
 " of carbon 61.
 " of lime 58.
 Sulphuretum Arsenici flav. 42.
 Sulphuric acid 29.
 Sumac vénéneux 137.
 Sumbul 155.
 Sumbul-root 155.
 Sumpfporst 108.
 Sumpffranckel 135.
 Sundew 79.
 Sunflower, large, of Mexico 93.
 Sureau 140.
 Sweat of the horses 94.
 Sycosinum 155.
 Symphytum 156.
 " officinale 156.
 Symplocarpus 133.
 Syphilinum Brossulinum 51.
 Syphiliseiter 51.
 Tabac. Tabacco 156.
 Tabacum 156.
 Tabak 156.
 Taenia cucurbitina 156.
 " lata, solium 156.
 " vulgaris 156.
 Taeninum 156.
 Taffetas Arnicae 166.
 Tanacetum 156.
 " vulgare 156.
 Tanaisie 156.
 Tansy, common 156.
 Tapeworm 156.
 Tape-worm of dogs 106.
 Taraxacum 157.
 " officinale 157.
 Tartar emetic 151.
 Tartaric acid 29.
 Tartarus emeticus 151.
 " stibiatus 151.
 Tartrate de potasse antimonié 151.
 Tartre stibié 151.
 Taumellolch 110.
 Taxus 157.
 " baccata 157.
 Tea, imperial 157.
 Tears 107.
 Teichschwamm 48.
 Teigne 159.
 Teiled pepper 75.
 Tellur 157.
 Tellurium 157.
 Ténia 156.
 Ténia des chiens 106.
 Terpenthinöl 125.
 Terra silicea 145.
 Tetter 94.
 Teucrium marum 114.
 Thea 157.
 " caesarea 157.
 Thé imperial 157.
 Theridium 158.
 " Currassavicum 158.
 Thieröl, aetherisches 125.
 Thonerde 32.
 Thorn-apple 153.
 Thränen 107.
 Thränenfistelschleim 78.
 Thuja 158.
 " occidentalis 158.
 Thym sauvage 145.
 Thymus Serpyllum 145.
 Tigllium 74.
 Tilia 158.
 " Europaea 158.
 " platyphylla 158.
 Tilleul 158.
 Tin 150.
 Tineinum 159.
 Tininum 159.
 Tinctura 12—13.
 " acris sine Kali 159.
 " Gefli 25.
 " Sulphuris 159.
 Tineinum 159.
 Toad 52.
 Toatsstoot 31.
 Tollkirsche 49.
 Tollkraut 49.
 Tomate 147.
 Tonca 159.
 Tonco 159.
 Tonga. Tongo 159.
 Tonkabohne 159.
 Topinambour 93.
 Toxicodendron 137.
 Traubenkirsche 134.
 Trèfle des marais 115.
 Trifolium fibrinum 115.
 Tripperschleim 115.
 True-love 127.
 Tue-chien 70.
 Turiones Pini 130.
 Turpentine-oil 125.
 Tussilago 159.

- Tygium 74.
 Ulme 160.
 Ulmus 160.
 „ campestris 160.
 „ effusa 160.
 Umbilicus Veneris 73.
 Upright birthwort 41.
 Ureinum 160.
 Urolithinum 160.
 Urtica 160.
 „ urens 160.
 Uva Ursi 161.
 Vaccinium 161.
 Vache de Dieu 69.
 Valerian 161.
 Valeriana 161.
 „ officinalis 161.
 Valériane 161.
 Variolinum 161.
 Varioloïdinum 162.
 Varicellinum 162.
 Veilchen 163.
 Venin de serpent 125.
 Venom of serpents 125.
 Venusnabel 73.
 Verge d'aron 43.
 Veratrin. Veratrina. Vêratrine 162.
 Veratrinum. Veratrium 162.
 Veratrum 162.
 „ album 162.
 „ officinale 139.
 „ Sabadilla 139.
 Verbascum 162.
 Verbascum Thapsus 162.
 Verbena. Cf. Corrigenda et Add.
 Vernis de la Chine 138.
 Vespa Crabro 74.
 Vesse de loup 51.
 Vif argent 95.
 Vinca 163.
 „ minor 163.
 Vinettier 50.
 Vipera Redi et Torva. Cf. Lachesis.
 Volatil animal oil 125.
 Viola 163.
 „ odorata 163.
 „ tricolor 100.
 Violet. Violette 163.
 Vitriolum album 165.
 „ Cupri 77.
 „ Martis 87.
 Viverra Putorius 115.
 Vulvaria 45.
 Wacke robin 43.
 Wahoon 81.
 Waldameise 88.
 Walderdbeere 88.
 Wallnuss. Walnut 103.
 Wall pepper 143.
 Wasser 38.
 Wasser weingeisthaltiges 39.
 Wasserblei 91.
 Wasserfenchel 128.
 Wasserlilie, gelbe 124.
 Wasserschieferling 67.
 Water 38.
 „ hemlock 67.
 Water-fennel 128.
 Waterlily, yellow 124.
 Weingeist 149.
 „ gewässerter 150.
 „ rektificirter 149.
 „ starker 149.
 „ verstärkter 149.
 „ wasserfreier 149.
 Weinsteinssäure 29.
 Wermuth 25.
 Whites 108.
 Wind-flower 134.
 Wintergrün 163.
 Wismuth. Wismuthpraecipitat 50.
 Wohlverleih 42.
 Wood-ant 88.
 Woodlouse 117.
 Wormseed 67.
 Wormwood 25.
 Xiphosura Americana 108.
 Yarrow, common 116.
 Yellow arsenic. 42.
 Yellow bark 65.
 Yew 157.
 Zahn cariöser 124.
 Zahnfisteleiter 124.
 Zahnhöhleneiter 33.
 Zaunrübe 52.
 Zinc 163.
 Zinc oxyd 165.
 Zincum 163.
 „ aceticum 164.
 „ cyanatum 164.
 „ hydrocyanicum 164.
 „ oxydatum 165.
 „ praecipitatum 164.
 „ sulphuricum 165.
 Zimmtrinde, echte 68.
 Zingiber 165.
 Zink 163.
 Zinkoxyd 165.
 „ essigsäures 164.
 „ schwefelsäures 165.
 Zinn 150.
 Zinnober 100.
 Zittwersamen 67.
 Zizia aurea 146.
 Zizie, goldene 146.
 Zungenbeleg 90.
 Zwiebel 64.

Corrigenda et Addenda.

- Pag. 7. Lin. 9 ab ultima. Loco § 10. lege § 11.
Pag. 8. Lin. 6. Loco *notato* lege *notata*.
Pag. 14. Lin. 15. ab ultima. Loco *in frustulas et taleolas* lege *in frustula et taleolas dissectae*.
Pag. 30. Lin. 5. ab ultima loco *Pfarsley* pone *Parsley*.
Pag. 45. Lin. 8. Loco *Chenopodium*. *Vulvaria* lege *Chenopodium Vulvaria*.
Pag. 49. Lin. 12. ab ultima. Loco *Belladone* lege *Belladonne*.
Pag. 62. Lin. 14. Loco *thisle-seeds* lege *thistle-seeds*.
Pag. 68. Lin. 16. ab ultima. Loco *Helianthemus* lege *Helianthemum*.
Pag. 71. Lin. 15. ab ultima. Loco *Menispermium* lege *Menispermum*.
Pag. 77. Lin. 6. ab ultima. Loco *Sulphate* lege *Sulfate*.
Pag. 86. Lin. 6. ab ultima. Loco *Sesquichloride* lege *Sesquichlorure*.
Pag. 97. Lin. 8. Loco *Deutochloride* lege *Deutochlorure*.
Pag. 110. Lin. 16. Deleatur (*s. Coni*).
Pag. 117. Lin. 13. Loco *Protosulfide of molybden* lege *Protosulphide of molybden*.
Lin. 15. abultima. Loco *Maserschuppen* lege *Masernschuppen*.
Pag. 148. Lin. 14. et 19. ab ultima Loco *nitrosus* lege *nitrosi*.
Pag. 163. insere.
-

Verbena.

Eisenkraut. Vervain. Verveine.

Verbena officinalis L., planta perennis in ruderatis frequens, e familia Verbenacearum. Differt ab aliis speciebus sui generis: caule subsolitario erecto ramoso; foliis ovato-oblongis subpinnatifidis scabris, in basi angustatis; spicis terminalibus filiformibus paniculatis.

Planta tota floescens recens, radice resecta. Colligitur mensibus Julio et Augusto.

Essentia Verbenae modo § 15. notato paretur.

CONTENTS OF VOLUME

1. The first part of the volume contains a general introduction to the subject of the history of the human mind, and a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

2. The second part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

3. The third part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

4. The fourth part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

5. The fifth part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

6. The sixth part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

7. The seventh part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

8. The eighth part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

9. The ninth part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

10. The tenth part of the volume contains a description of the various faculties of the human mind, and the manner in which they are exercised. This part is divided into three sections, the first of which is devoted to the history of the human mind, the second to the history of the human body, and the third to the history of the human soul.

Ph

Sectio prima

Pharmacopoeae homoeopathicae novae.

Praemonenda.

Uebersetzt von **Eduard Hahn.**



Als Beilage zur *Pharmacopoea homoeopathica nova*
Hageri.



§ 1. Eine homöopathische Apotheke oder der Raum, in welchem homöopathische Arzneien angefertigt, aufbewahrt und dispensirt werden, muss von der allopathischen Apotheke gänzlich getrennt sein. *) Dieser Raum soll hell sein, ist aber gegen das Eindringen des vollen Sonnenlichtes, des Staubes, Rauches, sowohl angenehmer als stinkender Gerüche zu schützen. Die grösste Reinlichkeit und Sauberkeit ist ein nothwendiges Erforderniss. Die Luftwärme in einer homöopathischen Apotheke überschreite niemals die Temperatur unserer Wohnzimmer; ebenso schütze man diesen Raum gegen Kälte. Die Temperatur der Apotheke sei möglichst gleichmässig zwischen 15—20° C.

Geräthschaften und Gefässe.

§ 2. Die Apotheke sei mit allen nothwendigen Gegenständen und Geräthschaften versehen, damit in jeder Hinsicht nicht nur den Anforderungen der homöopathischen Aerzte, sondern auch der pharmaceutischen Kunst Genüge geleistet werde.

Geräthschaften und Gefässe müssen ihrer Bestimmung, diese mag nun die Darstellung oder die Aufbewahrung der Medikamente zum Zwecke haben, angemessen sein.

Die Gefässe sollen eine leserliche Signatur tragen, welche den Namen des in ihnen befindlichen Medicamentes angiebt.

Medikamente verschiedener Art dürfen niemals in einem und demselben Gefässe aufbewahrt werden. Eine Ausnahme hiervon ist nur bei den potenzierten Verreibungen und Verdünnungen eines und desselben Medicinstoffes erlaubt.

Vorhanden sollen sein: porcellanene, steinerne und eiserne Mörser, hörnerne oder knöcherne Löffel, hörnerne Spatel, gläserne Stehkolben, gläserne Schälchen (Uhrgläser), gläserne Trichter, eine Presse mit porcellanem Becken, (zur Bereitung der Tinkturen reicht eine solche mit zinnernem Becken aus), stählerne Schneideinstrumente, genau ziehende Wagen verschiedener Grösse, Gewichte, **) leinene Seihetücher mit ihren Signaturen, Kork-

*) Im Nothfalle können chemische Präparate in dem Laboratorium der allopathischen Apotheke dargestellt werden.

**) Die homöopathischen Aerzte pflegen das Nürnberger Medicinalgewicht anzuwenden und rechnen in der Regel den Tropfen jeder beliebigen Flüssigkeit gleich Einem Gran dieses Gewichts. Andere Gewichte, welche in Hinsicht auf Eintheilung und Schwere dem Nürnberger Gewichte ziemlich gleich kommen, können ebenfalls in Anwendung gebracht werden; sind jedoch Gewichte dieser Art nicht im Gebrauche, so ist der Tropfen auf das Gewicht zu prüfen.

stopfen der besten Art und von verschiedener Grösse, eine Korkzange zum Pressen der Korke, aus reinem weissen Papier gefaltete Kapseln, hörnerne Pulverschiffchen etc., ausserdem zur Darstellung von potenzirten Verdünnungen cylindrische Mensurir-Gefässe, um darin 90, 180, 270, 360, 450 etc. Tropfen Wasser oder Weingeist abzumessen, endlich Glastöpfchen und Fläschchen zur Dispensation der Arzneien.

So weit es nur immer geschehen kann, sind kupferne oder messingene Mörser und Gefässe zu vermeiden, so auch Gefässe aus einem Glase, welches Arsen, Blei, Mangan etc. enthält. Das Glas soll Kali- oder Natronglas sein.

Verfahren die Gefässe zu reinigen.

§ 3. Alle Gefässe, sie mögen neu oder schon öfterer gebraucht sein, erfordern eine sehr sorgfältige Reinigung. Erst werden sie mit Wasser und Weingeist ausgewaschen, dann in einer Wärmröhre ausgetrocknet, damit etwa anhängende Gerüche vollständig verjagt werden. Aehnlich reinigt man auch die Mörser, in welchen Verreibungen gemacht wurden; sie werden aber zuerst mit feuchtem Sande ausgerieben. Die Mörser, in welchen Metalle gerieben und lävigirt worden sind, werden zuerst mit Hülfe von Säuren und dann mit Wasser gereinigt. Niemals bewahre man ein Medikament in einem schon früher zu einem anderen Medikamente benutzten Glase etc. auf.

Pharmaceutische Operationen.

§ 4. Die pharmaceutischen Operationen zum Zwecke der Bereitung homöopathischer Arzneimittel unterscheiden sich in vielen Stücken nicht von denen in den allopathischen Apotheken. Einige Punkte sind jedoch noch in Erinnerung zu bringen.

Das Zerquetschen. Feuchte Substanzen, wie frische Vegetabilien und lebende Thiere, müssen meist zu einem Brei zerquetscht und zerstoßen werden. Das Zerquetschen geschieht stets in porcellanen oder steinernen Mörsern und zwar so, dass Anfangs mit dem Pistill gerieben, später gestossen wird. Um während des Zerquetschens einen Verlust an Saft durch Aufspritzen und Hinwegspritzen desselben zu vermeiden, bedeckt man während der Operation den Mörser mit einem in der Mitte durchbohrten Deckel aus hartem Holze.

Das Pulverisiren geschieht auf verschiedene Weise. Harte und zähe Substanzen werden vor dem Pulvern zerschnitten und an einem nur lauwarmen Orte (bei 25–30° C.) vorsichtig getrocknet, damit sie an ihren flüchtigen Bestandtheilen keine Einbusse erleiden. Harze und Gummiharze, welche bekanntlich in der Wärme weich werden, sind in der Kälte oder im Winter zu pulvern. Diejenigen Substanzen aus dem Thier- und Pflanzenreiche, welche sehr feine flüchtige Heilstoffe und zu-

gleich Feuchtigkeit enthalten (wie Moschus, Castoreum, Lactucarium, Opium) hüllt man möglichst klein geschnitten in trockene Kalbsblase, umwickelt diese mit Bindfaden und legt sie zum Trocknen an einem trocknen Orte bei Seite. Eine Substanz von so verschiedener Textur, dass sich ein Theil derselben leicht, der andere aber schwieriger in Pulver verwandeln lässt, muss ganz und gar zu Pulver gemacht und dieses dann gehörig durch einander gemischt werden.

Das Pulverisiren der Vegetabilien kann in einem eisernen Mörser geschehen, dagegen das der Salze, der Metallpräparate, der sauren Substanzen nur in einem porcellanen oder steinernen Mörser.

Steinere oder porcellanene Mörser sind denen von Eisen übrigens immer vorzuziehen.

Das genaue Verreiben trockener Substanzen wird in unglasirten Porcellanmörsern, das einer pulverigen mit einer flüssigen Substanz hingegen gewöhnlich in glasirten Porcellanmörsern ausgeführt.

Jede Maceration geschehe ohne Anwendung von Wärme bei mittlerer Temperatur, welche 20°C . niemals überschreiten darf.

Die Theilung eines Medikamentes geschieht entweder dem Gewichte, oder dem Volumen, oder der Zahl nach.

Die Verdünnung ist doppelter Art, entweder eine mechanische oder eine potenzierte. Mechanisch heisst eine Verdünnung dann, wenn sie, ohne besonderen Endzweck ausgeführt, nur darauf hinzielt, das Volumen eines Medicinstoffes zu vergrössern; potenziert hingegen wird eine Verdünnung dann genannt, wenn durch dieselbe die Heilkraft einer Substanz bekräftigt und verstärkt wird. Letztere Art der Verdünnung erfordert ein eigenes Verfahren: die Medikamente zu potenziren. Dieses Verfahren besteht in der bestimmten, begrenzten und genauen Verdünnung einer Heilsubstanz mittelst eines Vehikels (Milchzucker, Wasser oder Weingeist). Jetzt ist für gewöhnlich die sogenannte Decimalpotenzirung angenommen, welche durch Vermischen des Medicinstoffes mit seiner neunfachen Menge des Vehikels bewirkt wird, so dass zehn Theile der Mischung Einen Theil des Medicinstoffes enthalten.

Von der früher gebräuchlichen sogenannten Centesimalpotenzirung ist in der Anmerkung zu § 11. die Rede.

Verfahren bei Darstellung der Verreibungen.

§ 5. Eine Verreibung geschieht in drei Zeiträumen:

a) Erster Zeitraum der Verreibung. Man schüttet Einen Theil des trocknen Medicinstoffes und zwei Theile grobgepulverten Milchzuckers in einen Porcellanmörser und reibt, ein Aufdrücken mit dem Pistill vermeidend, unter biswei-

ligem Zusammenscharren und Abkratzen des Pistills mittelst eines Hornspatels, so lange, bis die Mischung ein höchstfeines und gleichmässiges Pulver darstellt, dieselbe also eine vollständige ist. Die zu dieser Verreibung nöthige Zeit soll wenigstens eine halbe Stunde währen.

b) Zweiter Zeitraum der Verreibung. Nachdem diese erste Verreibung geschehen ist, schüttet man weitere drei Theile höchst feingepulverten Milchzucker hinzu und setzt wie vorhin das Reiben eine Viertelstunde fort.

c) Dritter Zeitraum der Verreibung. Hierauf werden endlich noch vier Theile höchst fein gepulverten Milchzucker hinzugehan und wiederum während der Dauer einer Viertelstunde unter anhaltendem Reiben dazu gemischt.

Das Verfahren bei der Verreibung eines flüssigen Medicinstoffes ist ähnlich, jedoch wird dieselbe in nur zwei Zeiträumen ausgeführt.

Im ersten Zeitraume erfolgt nämlich die Mischung Eines Theiles des Medicinstoffes mit fünf Theilen Milchzucker und im zweiten werden noch vier Theile Milchzucker hinzugemischt. Man pflegt stets Einen Tropfen des flüssigen Stoffes mit erst fünf und darauf vier Granen (des Nürnberger Medic.-Gew.) Milchzucker zu verreiben. Der Tropfen wird gleich Einem Gran dieses Gewichts angenommen. (Quecksilber wird gewogen.)

Eine Verreibung ist jeder Zeit ohne Unterbrechung fertig zu machen.

Potenzirte Verreibungen oder potenzirte durch Verreiben bewirkte Verdünnungen.

§ 6. Die erste Verreibung (Potenz). Die Pulvermischung, welche auf die in § 5. angegebene Weise in drei oder zwei Zeiträumen erhalten wird, ist die erste Verreibung, welche mit der Ziffer **1** zu signiren ist.

Diese Verreibung enthält $\frac{1}{10}$ ($=0,1$) des Medicinstoffes.

Die zweite Verreibung (Potenz), welche mit **2** signirt wird, wird (nach § 5.) durch ein drei Viertelstunden andauerndes Zusammenreiben und Mischen Eines Theiles der ersten Verreibung mit neun Theilen höchst fein gepulvertem Milchzucker dargestellt.

Diese Verreibung enthält $\frac{1}{100}$ ($=0,01$) des Medicinstoffes.

Die dritte Verreibung (Potenz), welche mit **3** signirt wird, entsteht durch ein halbstündiges Verreiben und Vermischen von Einem Theile der zweiten Verreibung mit neun Theilen höchst fein gepulvertem Milchzucker.

Diese Verreibung enthält $\frac{1}{1000}$ ($=0,001$) des Medicinstoffes.

In der Regel wird die dritte Verreibung in der neunfachen Menge Wasser oder weingeistigem Wasser (Aqua spirituosa)

aufgelöst und dadurch die vierte Verdünnung (Potenz) erhalten, welche mit 4 zu signiren ist. Vergleiche § 10.

Diese vierte Verdünnung enthält $\frac{1}{10000}$ ($=0,0001$) des Medicinstoffes.

In ähnlicher Weise bereitet man, wenn es verlangt werden sollte, die vierte (4), fünfte (5), sechste (6), siebente (7), achte (8), neunte (9), zehnte (10), elfte (11), zwölfte (12), dreizehnte (13), vierzehnte (14), fünfzehnte (15), sechzehnte (16), siebenzehnte (17), achtzehnte (18), neunzehnte (19), zwanzigste (20), einundzwanzigste (21), zweiundzwanzigste (22), dreiundzwanzigste (23), vierundzwanzigste (24), fünfundzwanzigste (25), sechsundzwanzigste (26), siebenundzwanzigste (27), achtundzwanzigste (28), neunundzwanzigste (29) und dreissigste (30) Verreibung. Es wird immer zur Darstellung irgend einer Verreibung Ein Theil der vorhergehenden Verreibung mit neun Theilen höchst fein gepulvertem Milchzucker vermischt.

Anmerkung. Alle in Wasser nur wenig oder kaum löslichen Substanzen werden erst in der fünften oder sechsten Verreibung durch Auflösen in der neunfachen Menge Wasser oder weingeistigem Wasser weiter potenziert. Vergl. § 11.

In Betreff des von Hahnemann vorgeschriebenen Potenzirverfahrens vergleiche die Anmerkung zu § 11.

Verfahren bei dem Verdünnen von Flüssigkeiten.

§ 7. Eine potenzierte Verdünnung wird durch Vermischen von zehn Tropfen (oder Theilen) der flüssigen Arzneisubstanz mit neunzig Tropfen (oder Theilen) Weingeist oder Wasser in einem Fläschchen bewerkstelligt und nach Aufsetzung eines Stopfens durch zehn Schüttelschläge vervollständigt. Zu diesem Behufe darf eben das Fläschchen nur zu drei Viertheilen seines Rauminhalts angefüllt sein.

Jede Verdünnung soll eine vollständig klare Flüssigkeit darstellen, wesshalb das Vehikel mit Rücksicht hierauf zu wählen ist. Trübe und einen Bodensatz bildende Verdünnungen sind zu verwerfen.

Potenzirte Verdünnungen.

§ 8. Die erste Verdünnung (Potenz), welche mit der arabischen Ziffer 1 zu signiren ist, geschieht auf die in § 7. angegebene Weise durch Vermischen von zehn Tropfen (Theilen) der flüssigen Arzneisubstanz (z. B. einer Lösung, eines ätherischen Oeles, einer Tinktur) mit neunzig Tropfen (Theilen) höchstrectificirtem Weingeist.

Ist die Arzneisubstanz eine (primitive oder Ur-) Essenz, so nehme man zu dieser Verdünnung nur rectificirten Weingeist, um das Entstehen eines Bodensatzes zu vermeiden.

Ist die flüssige Substanz in höchstrectificirtem Weingeist löslich und giebt sie mit demselben eine völlig klare Lösung,

so ist dieser Weingeist auch immer bei dem Pontenziren anzuwenden.

Ist die flüssige Substanz in Wasser leicht, in Weingeist wenig oder kaum löslich, so nimmt man zur ersten Verdünnung entweder Wasser oder Aqua spirituosa.

Die zweite Verdünnung (Potenz), welche mit **2** zu signiren ist, entsteht auf die in § 7. angegebene Weise durch Vermischen von zehn Tropfen (Theilen) der ersten Verdünnung mit neunzig Tropfen (Theilen) höchstrectificirtem Weingeist.

Wo zur ersten Verdünnung aber Wasser genommen wurde, wird zur zweiten Verdünnung Aqua spirituosa genommen; ebenso nehme man in der zweiten Verdünnung verdünnten Weingeist, wo Aqua spirituosa bei der ersten Verdünnung zur Verwendung kam, und rectificirten Weingeist, wo vorher verdünnter Weingeist verwendet wurde.

Die dritte Verdünnung (Potenz) wird mit **3** signirt und entsteht durch Vermischen von zehn Tropfen (Theilen) der zweiten Verdünnung mit neunzig Tropfen (Theilen) höchstrectificirtem Weingeist.

Die mit Aqua spirituosa bereitete zweite Verdünnung wird mit verdünntem Weingeist, ist aber jene mit verdünntem Weingeist bereit, so wird sie um die dritte Verdünnung darzustellen, mit rectificirtem Weingeist gemischt.

Die vierte Verdünnung (Potenz) wird mit **4** signirt und entsteht durch Vermischen von zehn Tropfen (Theilen) der dritten Verdünnung mit neunzig Tropfen (Theilen) höchstrectificirtem Weingeist.

War die dritte Verdünnung aber nur mit verdünntem Weingeist bereit, so nehme man zur vierten Verdünnung rectificirten Weingeist.

Die fünfte (**5**), sechste (**6**), siebente (**7**), achte (**8**), neunte (**9**), zehnte (**10**), elfte (**11**), zwölfte (**12**), dreizehnte (**13**), vierzehnte (**14**), fünfzehnte (**15**), sechzehnte (**16**), siebenzehnte (**17**), achtzehnte (**18**), neunzehnte (**19**), zwanzigste (**20**), einundzwanzigste (**21**), zweiundzwanzigste (**22**), dreiundzwanzigste (**23**), vierundzwanzigste (**24**), fünfundzwanzigste (**25**), sechsundzwanzigste (**26**), siebenundzwanzigste (**27**), achtundzwanzigste (**28**), neunundzwanzigste (**29**) und dreissigste (**30**) Verdünnung (Potenz) werden in ähnlicher Weise dargestellt. Zur Erzeugung irgend einer dieser Potenzen wird stets die vorhergehende Verdünnung mit der neunfachen Menge höchstrectificirtem Weingeist verdünnt oder vermischt, um die nächstfolgende Verdünnung zu erzeugen.

Jede Verdünnung sei völlig klar. Eine trübe oder einen Bodensatz bildende ist stets zu verwerfen.

Durch Auflösen bereitete Verdünnungen.

§ 9. Die erste Verdünnung (Potenz) (1) von Salzen und Stoffen, welche in Wasser vollständig, in Weingeist aber nur wenig oder kaum löslich sind, geschieht durch Auflösung in Wasser; die erste Verdünnung aber von in Weingeist mehr oder weniger löslichen Salzen und Substanzen wird (je nach der Löslichkeit) entweder mit Aqua spirituosa oder verdünntem Weingeist, oder rektificirtem oder höchstrectificirtem Weingeist bewirkt. Ein Theil des Salzes oder des sonstigen Stoffes wird in neun Theilen Wasser oder Weingeist gelöst.

Salze, welche mehr als zehn Theile Wasser zur Auflösung erfordern, müssen je nach Erforderniss in 20, 30, 40, 50 etc. Theilen Wasser gelöst werden. Die Potenzirung geschieht in diesem Falle immer so, dass die Verdünnung (Potenz) 2 $\frac{1}{100}$, die Verdünnung 3 $\frac{1}{1000}$, die Verdünnung 4 $\frac{1}{10000}$ des Salzes etc. enthält.

Die Lösung des Salzes soll durch Umschütteln und Maceriren immer bei einer mittleren Temperatur (15–20° C.) ausgeführt werden. Die Aufbewahrung der Lösung soll auch an einem Orte, dessen Temperatur zwischen 15 bis 20° C. liegt, geschehen.

Die zweite Verdünnung (Potenz) oder die Verdünnung 2 wird, wenn das Salz in Weingeist nicht löslich war, mit Aqua spirituosa und zwar durch Vermischen von zehn Tropfen (Theilen) Aqua spirituosa dargestellt. Sehr häufig ist es jedoch nöthig, auch die zweite Verdünnung mit Wasser darzustellen, wenn nämlich der Salzkörper in Wasser schwer, in Weingeist kaum löslich ist. Ist das Salz in Weingeist löslicher, so wird die zweite Verdünnung mit rektificirtem oder verdünntem Weingeist bereit.

Die dritte Verdünnung (Potenz) wird je nach der Löslichkeit des Körpers mit verdünntem, rektificirtem oder höchstrectificirtem Weingeist dargestellt.

Die Verdünnungen 4, 5, 6, 7 u. s. w. bis 30 geschehen mit höchstrectificirtem Weingeist.

Jede Verdünnung soll so bereit sein, dass ihre Entmischung niemals stattfinden kann.

Anmerkung. Die Aufeinanderfolge des zu den Verdünnungen 1, 2, 3, 4, 5 anzuwendenden Lösungsmittels ist gewöhnlich folgende:

1. Wasser	Wasser	Aq. spirit.	verd. Weing.	rekt. Weing.
2. Wasser	Aq. spirit.	verd. Weing.	rekt. Weing.	höchstrekt. Wgst.
3. Aq. spirit.	verd. Weing.	rekt. Weing.	höchstrekt. Wgst.	höchstrekt. Wgst.
4. verd. Weing.	rekt. Weing.	höchstrekt.	Wgst. höchstrekt.	Wgst. höchstrekt. Wgst.
5. rekt. Weing.	höchstrekt. Wgst.	höchstrekt.	Wgst. höchstrekt.	Wgst. höchstrekt. Wgst.

Auflösung und weitere Potenzirung der potenzirten Verreibungen.

§ 10. Bei der weiteren Potenzirung der Medikamente ist

es Gebrauch, meist schon die dritte Verreibung (Potenz) (3) in die flüssige Form durch Auflösen in reinem oder weingeisthaltigem Wasser überzuführen. Die wässrige Lösung kann, weil sie bald verdirbt, nicht aufbewahrt werden, die mit Aqua spiritiosa bereite hält sich länger.

Die Auflösung geschieht auf folgende Weise: In ein Fläschchen werden zehn Theile der dritten Verreibung (Potenz) geschüttet, dazu behutsam neunzig Theile Wassers oder Aqua spiritiosa gegossen, und nun, nachdem die Oeffnung des Fläschchens mit einem Korke oder dem Mittelfinger geschlossen ist, so lange geschüttelt und bei Seite gestellt, bis eine vollständige Lösung stattgefunden hat. Diese Lösung ersetzt die vierte Verdünnung oder Potenz und wird mit der Ziffer 4 signirt.

Da ein Tropfen einem Gran des Medicinalgewichts entspricht, so werden zehn Gran der dritten Verreibung (3) in neunzig Tropfen Wasser oder Aqua spiritiosa gelöst.

Die fünfte Verdünnung (Potenz) (5) geschieht, je nachdem der Medicinstoff mehr oder weniger in Wasser oder Weingeist löslich ist, entweder mit verdünntem oder, wie in der Regel, mit rektificirtem Weingeist. Zehn Theile (Tropfen) der vierten Verdünnung (Potenz) werden mit neunzig Theilen (Tropfen) des weingeistigen Vehikels verdünnt.

Die Verdünnung 6, 7, 8 u. s. w. bis 30 stellt man mit höchstrectificirtem Weingeist dar. Zehn Tropfen einer beliebigen Verdünnung werden immer mit neunzig Tropfen höchstrectificirtem Weingeist verdünnt und vermischt, um die folgende Verdünnung zu erhalten.

§ 11. Eine potenzierte Verreibung, welche einen in Wasser fast unlöslichen Medicinstoff enthält, ist von der in § 10. aufgestellten Regel auszuschliessen. Eine Verreibung dieser Art wird (nach der in § 6. angegebenen Methode) bis zur sechsten Verreibung *) fortgesetzt, und erst diese in die flüssige Form übergeführt. Die siebente Verdünnung bereitet man mit Aqua spiritiosa, die achte mit rektificirtem, die neunte, so wie die folgenden, mit höchstrectificirtem Weingeist.

Eine in Wasser wenig lösliche Substanz wird gemeinlich bis zur fünften Potenz verrieben und dann in die sechste flüssige Verdünnung übergeführt.

Anmerkung. Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, schreibt eine andere Methode, die Heilstoffe zu potenziren, vor.

Diese Methode heisst die hunderttheilige oder Centesimalmethode, nach welcher:

*) Bei Potenzirung der metallischen Körper ist selbst eine siebente Verreibung noch nöthig.

			Bezeichnung.	
			jetzige	frühere
die erste Verdünnung (Potenz)	0,01 des Medicinstoffes enthält		1	1
„ zweite „ „	0,0001 „ „		2	2
„ dritte „ „	0,000001 „ „		3	I
„ vierte „ „	0,00000001 „ „		4	¹ /I
„ fünfte „ „	0,0000000001 „ „		5	² /I
„ sechste „ „	0,000000000001 „ „		6	II
„ siebente „ „	0,00000000000001 „ „		7	¹ /II
„ achte „ „	0,0000000000000001 „ „		8	² /II
„ neunte „ „	0,000000000000000001 „ „		9	III
„ zehnte „ „	0,00000000000000000001 „ „		10	¹ /III
„ elfte „ „	0,0000000000000000000001 „ „		11	² /III
„ zwölfte „ „	0,000000000000000000000001 „ „		12	IV
„ dreizehnte „ „	0,00000000000000000000000001 „ „		13	¹ /IV
„ vierzehnte „ „	0,0000000000000000000000000001 „ „		14	² /IV
„ fünfzehnte „ „	0,000000000000000000000000000001 „ „		15	V
„ sechzehnte „ „	0,00000000000000000000000000000001 „ „		16	¹ /V
„ siebzehnte „ „	etc.		17	² /V
„ achtzehnte „ „	etc.		18	VI
„ neunzehnte „ „	etc.		19	¹ /VI
„ zwanzigste „ „	etc.		20	² /VI
„ einundzwanzigste „ „	etc.		21	VII
„ zweiundzwanzigste „ „	etc.		22	¹ /VII
„ dreiundzwanzigste „ „	etc.		23	² /VII
„ vierundzwanzigste „ „	etc.		24	VIII
„ fünfundzwanzigste „ „	etc.		25	¹ /VIII
„ sechsundzwanzigste „ „	etc.		26	² /VIII
„ siebenundzwanzigste „ „	etc.		27	IX
„ achtundzwanzigste „ „	etc.		28	¹ /IX
„ neunundzwanzigste „ „	etc.		29	² /IX
„ dreissigste „ „	etc.		30	X

Die Medicinstoffe werden nur bis zur dritten Verreibung, welche $\frac{1}{1000000}$ des Medicinstoffes enthält, potenziert, und diese durch Auflösen in der 99 oder 100fachen Menge verdünntem Weingeist in die vierte Verdünnung übergeführt. Die folgenden Verdünnungen werden mit höchstrectificirtem Wein-geiste bewerkstelligt.

In neuerer Zeit haben die meisten homöopathischen Aerzte die andere Methode, die zehntheilige oder Decimal-Verdünnung, als richtiger und den Gesetzen der Arithmetik mehr entsprechend, in Aufnahme gebracht. Auch vorliegende Pharmacopöe hat das letztere Verfahren acceptirt.

Dem Arzte steht es natürlich frei, nach ersterer oder letzterer Methode zu potenziren, wenngleich die zehntheilige Verdünnungsmethode die gebräuchlichste ist. Das Verhältniss beider zu einander ist folgendes:

Neuere oder Decimal-Verdünnungsmethode.	Centesimal- oder Hahnemann's Verdünnungsmethode.			
Verdünnung 2 ist gleich der	Verdünnung 1			
„ 4 „ „ „ „	2			
„ 6 „ „ „ „	3			

Neuere oder Decimal- Verdünnungsmethode.		Centesimal- oder Hahnemann's Verdünnungsmethode.	
Verdünnung	8 ist gleich der	Verdünnung	4
"	10 "	"	5
"	12 "	"	6
"	14 "	"	7
"	16 "	"	8
"	18 "	"	9
"	20 "	"	10
"	22 "	"	11
u. s. w.		u. s. w.	

Signirung.

§ 12. Jede potenzirte Verreibung oder Verdünnung muss sogleich mit ihrer Zahl signirt werden. Das Fläschchen, in welchem die Aufbewahrung geschieht, ist sogleich mit einem Korke zu verschliessen, welcher ebenfalls mit der Zahl der Potenz bezeichnet werden soll.

Essenzen und Tinkturen.

§ 13. Essenzen und Tinkturen haben in der homöopathischen Heillehre dieselbe Kraft und der Arzt gebraucht an Stelle des Wortes „Essenz“ das Wort „Tinktur“, in der pharmaceutischen Kunst aber werden diese beiden Bezeichnungen wohl unterschieden.

Essenzen werden aus Theilen von Thieren und frischen Pflanzen, so wie aus dem Saft frischer Pflanzentheile mit Hülfe von Weingeist bereitet, die Tinkturen dagegen aus trocknen Arzneisubstanzen durch Maceration mittelst des Weingeistes. Die Essenzen und Tinkturen werden primitive oder Ur-Essenzen, Ur-Tinkturen genannt.

Es giebt zweierlei Essenzen, je nachdem sie aus saftreichen oder saftarmen Substanzen bereitet werden.

Bereitungsweise der Essenzen.

§ 14. Frisch gesammelte saftreiche Pflanzen oder Theile derselben werden gehörig gereinigt zuerst zerschnitten, hierauf in einem steinernen Mörser zu einem Brei zerstoßen und dann mit Hülfe der Presse ausgedrückt. Den ausgepressten Saft setzt man vorläufig an einen kalten Orte bei Seite. Den Pressrückstand zerstösst man nochmals, übergiesst ihn dem Gewichte nach mit ebensoviel höchstrectificirtem Weingeist, als Saft gewonnen wurde, lässt ihn in einem verschlossenen Gefässe an einem dunklen Orte einen Tag über maceriren und presst ihn wiederum aus. Die ausgepresste weingeistige Flüssigkeit vermischt man alsbald mit dem zurückgesetzten Saft und lässt die Mischung in einer verschlossenen Flasche zehn Tage lang

an einem kühlen Orte absetzen; hierauf filtrirt man. Das Filtrat, welches vom Lichte entfernt aufzubewahren ist, stellt die primitive oder Ur-Essenz dar.

§ 15. Frische, saftarme Pflanzen oder Theile derselben werden durch Zerschneiden und Zerstossen möglichst zerkleinert, in einem gläsernen Kolben mit der doppelten Menge höchstrectificirtem Weingeist übergossen und damit gehörig vermischt. Dann lässt man vierzehn Tage lang an einem schattigen Orte maceriren, presst hierauf aus, stellt die Flüssigkeit einige Tage bei Seite und filtrirt. Die Maceration darf durch Wärme nicht unterstützt werden. Das Filtrat, welches vom Lichte entfernt aufzubewahren ist, stellt eine primitive oder Ur-Essenz dar.

Bereitungsweise der Tinkturen.

§ 16. Tinkturen sind weingeistige Auszüge aus gewöhnlich trockenen Substanzen, besonders aus getrockneten Kräutern, Blättern, Wurzeln, Rinden, Samen. Die kontundirten oder gröblich gepulverten Substanzen werden in einem Glaskolben mit der zehnfachen Menge höchstrectificirtem (seltner rectificirtem) Weingeist übergossen, damit gemischt und hierauf, nachdem der Kolben verstopft worden, bei mittlerer Temperatur (15 bis 20° C.) an einem schattigen Orte bei Seite gestellt und öfters umgeschüttelt. Zuletzt wird, wenn es nöthig ist, ausgepresst und filtrirt.

Vegetabilische Substanzen, welche in Weingeist schwer löslich, von dichter Textur oder sehr hart sind, werden feiner gepulvert und drei Wochen hindurch macerirt.

Das Filtrat, welches vom Lichte entfernt aufzubewahren ist, stellt eine primitive oder Ur-Tinktur dar.

Ueber die Auswahl, das Einsammeln, Trocknen, Reinigen, Aufbewahren und Erneuern der Arzneisubstanzen.

§ 17. Alle Arzneisubstanzen, welche der Pharmaceut bedarf, sollen unverfälscht, rein und von bester Beschaffenheit sein. Die Vegetabilien sind zu einer Zeit, in welcher sie die grösste Heilkraft besitzen, zu sammeln. Die einzusammelnden Pflanzentheile, welche Anwendung finden, müssen gehörig entwickelt, aber auch nicht zu alt und zu gereift sein. Die wildwachsenden Pflanzen, wenige ausgenommen sind den kultivirten vorzuziehen. Standort und auch die Einsammelungszeit, in welcher die Pflanzen recht kräftig wachsen, sind wohl zu beachten und zu notiren.

Blüthen, Blätter und Kräuter müssen stets, wenn es geschehen kann, bei trockner Witterung und zwar Vormittags oder um Mittag, wenn sie nicht mehr vom Thau feucht sind, gesammelt werden. Die Pflanze, von welcher die Blumen, Blät-

ter oder das Kraut genommen werden, sei unverletzt, vollständig und von kräftigem Wachstume; krüppelig gewachsene, beschädigte, verdorrnde oder welke Pflanzen sind zu verwerfen.

Sehr saftreiche Wurzeln müssen ganz eingesammelt werden, beschädigte oder angefressene sind zu verwerfen. Mit möglichst kaltem Wasser werden sie schnell abgewaschen, mit Hülfe einer Bürste vom Schmutze gereinigt und nachdem sie mit einem leinenen Tuche abgewischt und abgetrocknet sind, von den Ueberresten der Blätter, der Stengelbasis, Fasern und Zäsern befreit, wenn der Arzt oder die Pharmacopoe nicht ein Anderes vorschreibt. Die Wurzeln, welche getrocknet werden sollen, aber sehr gross und fleischig sind, schneidet man in kleine Stücke und Scheiben, reiht diese auf Bindfaden und hängt sie an einem trocknen lauwarmen Orte auf.

Die Samen sollen reif sein und von verletzten, so wie auch tauben Körnern, ebenso von Spreu und Stengeln völlig befreit werden.

Die Rinden sind im Frühjahr vor der Entwicklung der Blätter und Blüthen einzusammeln. Man nehme sie von nicht zu jungen, noch von kranken oder verletzten Zweigen.

Die Trocknung der verschiedenen Vegetabilien, wenn dieselbe vorgeschrieben ist, werde immer an einem trockenen luftigen Orte, dessen Temperatur nicht 35° C. überschreitet, ausgeführt; die Trocknung der ölreichen Samen darf jedoch nur bei mittlerer Temperatur geschehen. Die frisch gesammelten Vegetabilien sind gereinigt bald zum Trocknen auszustreuen, denn die meisten auf einem Haufen übereinanderliegenden Vegetabilien gehen sehr bald in Gährung über und verderben.

Die Aufbewahrung der trockenen Vegetabilien geschieht an einem trockenen Orte gewöhnlich in gut verschlossenen Holzkästen. Stark riechende, ätherisches Öl enthaltende Vegetabilien, so wie sämtliche narkotische Pflanzenstoffe werden in gut verschlossenen, der Einwirkung des Lichtes nicht ausgesetzten Flaschen aufbewahrt. Narkotische und kein fettes Öl enthaltende Samen sind auf dieselbe Weise, ölhaltige Samen dagegen in verstopften Holzgefäßen aufzubewahren.

Alle Vegetabilien, welche Behufs der Aufbewahrung in Flaschen gethan werden, müssen die der oben angegebenen Wärme entsprechende Trockenheit besitzen. Trockene Vegetabilien, welche aus der Luft Feuchtigkeit anziehen, verschimmeln bei der Aufbewahrung in verstopften Glasgefäßen.

Die Zeit, bis zu welcher Vegetabilien aufbewahrt werden dürfen, ist nicht genau bestimmt. So lange dieselben ihre volle Heilkraft besitzen, können sie auch aufbewahrt und verwendet werden. Diejenigen einheimischen Vegetabilien, welche jährlich durch frische ersetzt werden können, oder während der Aufbewahrung ihre natürliche Beschaffenheit verändern, namentlich

allzusehr austrocknen, sind jedes Jahr aufs Neue zu sammeln. Länger können solche wirksame Medicinstoffe aufbewahrt werden, welche nur aus harten Massen bestehen, vorausgesetzt, dass sie nicht durch andere Umstände dem Verderben unterworfen sind.

Die Aufbewahrung aller übrigen Stoffe, wie der Salze, Metalle, Harze, trocknen Extrakte, der Flüssigkeiten, besonders aber der Pulver geschieht unter Abschluss des Lichtes in gut verschlossenen Glas- oder Porcellangefäßen. Der gewöhnliche Verschluss sind Korkstopfen; bei Gefäßen, welche mit ätzenden Flüssigkeiten, Jod etc. gefüllt sind, müssen Glasstopfen in Anwendung kommen.

Die Aufbewahrung eines nach homöopathischer Art zubereiteten Medikamentes mit seinen potenzierten Verreibungen und Verdünnungen, von welchen eine jede in einem besonderen Fläschchen enthalten und mit ihrer Nummer versehen ist, geschieht in verschlossenen Schachteln oder Kästchen; dieselben werden aus Holz, Eisenblech oder Zinkblech angefertigt und mit Oelfarbe und Lack überzogen.

Potenzierte Verdünnungen, welche nur wässrige Lösungen sind, können nicht über sechsunddreissig Stunden aufbewahrt werden. Eine Ausnahme machen hiervon die ersten Verdünnungen mehrerer Salze.

Verfahren bei dem Dispensiren der Medikamente.

§ 18. Das homöopathische Dispensirverfahren ist von dem pharmaceutisch-allopathischen Dispensirverfahren nicht verschieden. Die Verordnungen des Arztes sind stets auf das genaueste auszuführen.

Ueber das Besprengen der Zucker- oder Streukügelchen ist folgendes zu bemerken: Die Zuckerkügelchen werden in einem Schälchen von Glas (dem Glase einer Taschenuhr) oder Porcellan mit der vorgeschriebenen potenzierten Verdünnung*), welche höchstrectificirten Weingeist enthält, übergossen. Nach einer Minute wird die Flüssigkeit abgegossen, die Kügelchen auf reinstem Papier ausgebreitet, bei Seite gelegt und eine Viertel- bis halbe Stunde hindurch getrocknet. Fest an einander hängende Kügelchen müssen getrennt werden. Streukügelchen, welche aufbewahrt werden sollen, sind noch länger, ein bis zwei Stunden, auszutrocknen.

Häufig werden diese Streukügelchen in Milchzuckerpulver dispensirt. In diesem Falle wird eine Anzahl ganzer Zuckerkügelchen in den gepulverten Milchzucker hineingezählt, aber nicht mit ihm durch Zusammenreiben vermischt.

Die potenzierten Verreibungen und Pulvermischungen wer-

*) Ist die Zahl der Verdünnung, mit welcher letzterer die Streukügelchen begossen werden sollen, vom Arzte nicht angegeben, so ist stets die dreissigste zu verwenden.

den gewöhnlich in sogenannten homöopathischen Fläschchen und Töpfchen, seltner in weissen Papierkapseln dispensirt.

Der Milchzucker in den potenzierten Verreibungen ist diejenige Substanz, mittelst welcher das Potenziren der Verdünnungen bewirkt wird. Der Milchzucker aber, welcher einer schon potenzierten Verdünnung für den Gebrauch des Kranken zugemischt wird, vermehrt nur das Volumen der Gabe (Dosis). Desshalb wird die Mischung in der kürzesten Zeit und unter geringem Drucke des Pistills vollendet.

Gebräuchlichste Abkürzungen,
welche in den Arzneivorschriften (Recepten) vorkommen.

- § 19. *M.* bedeutet *misce* oder *misceatur*, man mische es.
M. ex „ *misce exacte*, es werde genau gemischt.
Gtt. „ *gutta*, Tropfen.
Gttß „ *gutta dimidia*, ein halber Tropfen.
Gtt.p. „ *gutta parva*, ein kleiner Tropfen
 (= $\frac{1}{4}$ Tropfen).
Gtt.m. „ *gutta minima*, ein sehr kleiner Tropfen
 (= $\frac{1}{100}$ Tropfen).
Gr. „ *granum*, (Gran (= $\frac{1}{60}$ Drachme des M.-G.)
Gr.ß „ *granum dimidium*, ein halber Gran.
Gr.m. „ *granum minus*, ein sehr kleiner Gran, gleich
 der Grösse oder dem Umfange einer halben Linse.
 ℥ „ *scrupulus*, Scrupel des Med.-Gew.
 ʒ „ *drachma*, Drachme des Med.-Gew.
 ʒ „ *uncia*, Unze des Med.-Gew.

Erläuterung einiger Vorschriften.

- §. 20. *℞p.* *Belladonnae 30,*
Sacchari globulorum No. IV,
Sacchari lactis gr. jii.

M. D. S. etc.

Vier Zuckerkügelchen werden in einem Glasschälchen mit einigen Tropfen der dreissigsten Verdünnung (Potenz) von Belladonna (*Essentia Belladonnae*) übergossen und nach einer Minute die nicht aufgesogene Flüssigkeit von den Kügelchen wieder abgegossen. Die (ohne Anwendung von Wärme) getrockneten Kügelchen werden mit Hülfe eines kleinen Spatels mit drei Granen Milhzuckerpulvers überstreut und in einer Papierkapsel oder einem Glaszylinder dispensirt.

℞p. *Tinct. Veratri albi 8, gttß,*
Sacchari lactis gr. V.

M. ex. D. S.

Zehn Gran Milhzuckerpulver werden in einem Mörser mit

Einem Tropfen der achten Verdünnung (Potenz) von Veratrum album (Tinct. Veratri albi) durch ein ungefähr zwei Minuten dauerndes Zusammenreiben vermischt und hierauf in zwei Theile getheilt, von welchen der eine dispensirt, der andere weggeworfen wird.

Rp. *Aconiti* 6, gtt. $\frac{1}{10}$,
Globul. saccharin. No. X.

M. D.

Um den zehnten Theil eines Tropfens abzumessen, werden hundert Zuckerkügelchen mit Einem Tropfen der sechsten Verdünnung (Potenz) von Aconitum (Essentia Aconiti) befeuchtet, von welchen zehn zur Disposition gelangen, die neunzig übrigen weggeworfen werden.

Rp. *Pulsatillae* 10, 3j.

D.

Eine Drachme der zehnten Verdünnung (Potenz) von Essentia Pulsatillae wird in einem Fläschchen dispensirt.

Rp. *Belladonnae* X, *Glob. Viii*,
Aquae destillatae Unc. ij.

S.

Acht Zuckerkügelchen werden in einem Glasschälchen mit einigen Tropfen der dreissigsten Hahnemann'schen Verdünnung (Potenz) (vergl. § 11, Anmerkung) übergossen, nach einer Minute die nicht aufgesogene Flüssigkeit wieder abgegossen, und hierauf die Kügelchen in der vorgeschriebenen Menge kaltem destillirten Wasser durch Umschütteln gelöst.

Rp. *Platinae* X, 3j.

D.

Eine Drachme der dreissigsten Hahnemann'schen Verdünnung (Potenz). Vergl. § 11.

Rp. *Belladonna*,
Glob. saccharin Nr. 10.

M. D.

Hier werden die Streukügelchen mit der dreissigsten Verdünnung der Belladonna befeuchtet, welche Verdünnung immer gemeint ist, wenn der Arzt die Zahl derselben nicht angiebt.

Bemerkung.


Von allen in der Homöopathie angewendeten Arzneimitteln werden sowohl Urstoff und Urtinktur als wie Verreibung und Verdünnung bis zur 30ten Potenz vorrätig gehalten und einzeln ausgewogen, wie auch zu ganzen Apotheken zusammengestellt billigst berechnet in Simon's Apotheke in Berlin (Spanndauer Strasse), in Marggraff's Apotheke in Berlin (Charlottenstrasse 54) und in Otto Schneider's Apotheke in Dresden (Wilsdruffer Strasse).

Homöopathische Etais, Fläschchen, Pulvergläser und Streukügelchencylinder können von der Handlung Warmbrunn, Quilitz & Comp. in Berlin (Rosenthaler Strasse 40) bezogen werden.



eln
und
ein-
er-
an-
ot-
es-

eur-
in,
gen





BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
W POZNANIU



Xp 20080



BG0549554